

Parte 1 - Regresión Lineal: Un flujo se dice turbulento cuando éste exhibe propiedades caóticas o estocásticas, tales como fluctuaciones rápidas de la velocidad o de la presión. En un experimento se procedió a medir localmente las fluctuaciones de la energía cinética normalizada $E(l_o)$ para diferentes escalas de medición caracterizadas por l_o , que se entregan en la tabla a continuación

l_o (m)	0.78	0.39	0.20	0.05	0.03
$E(l_o)$ (m^3/s^2)	14.03	4.41	1.39	0.71	0.16

- (a) (3 pts.) Sabiendo que la energía cinética y la distancia están relacionados por la ecuación $E(l_o) = \alpha \times l_o^\beta$, determine los valores de α y β .
- (b) (2 pts.) De su ajuste calcule el coeficiente de regresión R^2 .
- (c) (1 pts.) Sabiendo que $E(l_o)$ tiene unidades de distancia³/tiempo², calcule las unidades de α . Este coeficiente es de vital importancia en turbulencia, donde $\alpha^{3/2}$ es el flujo de energía por unidad de tiempo y área, ϵ , que controla el transporte turbulento.

Solución

Dada la ecuación entre E y l_o , buscamos una relación lineal entre $Y = \log E$ y $X = \log l_o$ de la forma

$$Y = \beta X + \log \alpha = aX + b.$$

Calculamos entonces la tabla siguiente:

$\log l_o$	-0.108	-0.409	-0.699	-1.301	-1.523
$\log E$	1.147	0.644	0.143	-0.149	-0.796
$\log l_o \cdot \log E$	-0.124	-0.264	-0.100	0.194	1.212
$\log^2 l_o$	0.012	0.167	0.489	1.693	2.319

A partir de esta tabla tenemos: $\sum x_i = -4,040$, $\sum y_i = 0,990$, $\sum x_i y_i = 0,918$, $\sum x_i^2 = 4,679$, con lo cual:

$$a = 1,214,$$

$$b = 1,179,$$

y por lo tanto

$$\alpha = 10^b = 15,09,$$

$$\beta = a = 1,214,$$

Para calcular el coeficiente R^2 , tenemos $\langle y_i \rangle = 1/N \sum y_i = 0,198$ y calculamos la siguiente tabla de valores

$(a \log l_o + b - \log E)^2$	0.010	0.001	0.035	0.063	0.016
$(\log E - \langle y_i \rangle)^2$	0.901	0.199	0.003	0.120	0.988

Con estos valores tenemos $R^2 = 0,943$.

Finalmente, tenemos del modelo lineal: $\log E = \beta \log l_o + \log \alpha$ o equivalentemente:

$$\log \left(\frac{E}{\alpha} \right) = \beta \log l_o,$$

de lo que se deduce que E/α debe tener las mismas unidades que l_o , y β debe ser un número adimensional. Ya que E tiene unidades de distancia³/tiempo² y l_o tiene unidades de distancia, entonces α tiene unidades de velocidad².

Parte 2 - Series de Fourier: Se tiene la siguiente función de período 2π definida por:

$$f(x) = x^2, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

- (a) (4 pts.) Desarrollar la función en serie de Fourier.
- (b) (2 pts.) A partir del resultado obtenido calcular la suma de $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$.

Solución

Por paridad, los coeficientes $B_n = 0$. Calculamos entonces:

$$A_0 = \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{2\pi^2}{3},$$

y

$$A_n = \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos \left(\frac{2\pi nx}{2\pi} \right) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx.$$

Se integra por partes: $u = x^2, du = 2x dx, dv = \cos(nx) dx, v = \sin(nx)/n$:

$$A_n = \frac{1}{\pi} \left[\left(x^2 \frac{\sin(nx)}{n} \right)_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(nx)}{n} 2x dx \right].$$

Integrando nuevamente por partes: $u = x, du = dx, dv = \sin(nx) dx, v = -\cos(nx)/n$:

$$\begin{aligned}
A_n &= -\frac{2}{n\pi} \left[\left(-x \frac{\cos(nx)}{n} \right)_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} dx \right] \\
&= -\frac{2}{n\pi} \left[-\frac{2\pi \cos(n\pi)}{n} + \left(\frac{\sin(nx)}{n^2} \right)_{-\pi}^{\pi} \right] \\
&= \frac{4(-1)^n}{n^2}
\end{aligned}$$

De manera que la serie de Fourier es la siguiente:

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

Evalutando la serie en $x = \pi$ y sabiendo que $f(\pi) = \pi^2$ se tiene:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(n\pi) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

de lo cual

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{4} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi^2}{6}.$$