

MA1101-6 Introducción al Álgebra 2023, Otoño**Profesora:** Leonardo Sánchez.**Auxiliar:** Patricio Yáñez Alarcón**Correo:** pyanez@dim.uchile.cl**Auxiliar 07: Relaciones**

08 de Mayo

P1. Relación cualquiera

Se define en \mathbb{N} la relación \mathcal{T} tal que: $m\mathcal{T}n \iff (m = n) \vee (2|n \wedge 2|m)$. Verifique si es que \mathcal{T} es refleja, simétrica, antisimétrica y transitiva.

- a) Intuición:
- b) Teoría:
- c) Matraca:

P2. Sea E un conjunto no vacío, y $K \in \mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset\}$. Se define en $\mathcal{P}(E)$ la relación \mathcal{R}_K de la siguiente forma: para $A, B \subseteq E$,

$$A\mathcal{R}_K B \iff A \cap K \subseteq B.$$

- a) Demuestre que \mathcal{R}_K es refleja y transitiva.
- b) Demuestre que \mathcal{R}_K es una relación de orden $\iff K = E$.

- a) Intuición:
- b) Teoría:
- c) Matraca:

P3. Sea $K \subseteq \mathbb{Q}$ no vacío y \mathcal{R}_K la relación en K definida por: $x\mathcal{R}_K y \iff y - x \in K$.

- a) Demuestre que \mathcal{R}_K es refleja si y sólo si $0 \in K$.
- b) Demuestre que $\mathcal{R}_{\mathbb{N}}$ es una relación de orden.
- c) Demuestre que $\mathcal{R}_{\mathbb{Z}}$ es una relación de equivalencia y encuentre la clase de equivalencia de $1/2$.

- a) Intuición:
- b) Teoría:
- c) Matraca:

P4. Sea \mathcal{R} en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ dada por $(p, q)\mathcal{R}(p', q')$ si existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que $p - p' = 4r$ y $q - q' = 5s$.

- a) Demuestre que \mathcal{R} es una relación de equivalencia.
- b) Demuestre que el conjunto cociente $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/\mathcal{R}$ tiene 20 elementos y dé representantes para cada clase de equivalencia.

- a) Intuición:
- b) Teoría:
- c) Matraca:

P5. Sea \mathcal{R} en \mathbb{N} dada por: $n\mathcal{R}m \Leftrightarrow (n = m) \vee (n \text{ es par} \wedge m = n + 1) \vee (n \text{ es impar} \wedge m = n - 1)$.

- a) Demuestre que \mathcal{R} es de equivalencia.
- b) Encuentre el conjunto cociente \mathbb{N}/\mathcal{R} .

- a) Intuición:
- b) Teoría:
- c) Matraca:

■ **Resumen**

■ **[Relación]:** Es una tripleta (A, B, \mathcal{R}) que cumple $\mathcal{R} \subset A \times B$. Si $(a, b) \in \mathcal{R}$ denotamos $a\mathcal{R}b$

■ **[Propiedades de relaciones]:** Una relación R en A es:

- **Refleja:** si $\forall x \in A, x\mathcal{R}x$
- **Simétrica:** si $\forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$
- **Antisimétrica:** si $\forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y$
- **Transitiva:** $\forall x, y, z \in A, x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z$

■ **[Ejemplo de relación]:** En \mathbb{Z} se define la relación divisibilidad, que se anota $a|b$ si existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = qa$.

■ **[Relación de orden]:** \mathcal{R} es una relación de orden en A , si es una relación **refleja, antisimétrica y transitiva**.

Observación: \mathcal{R} es un orden total si para todo $x, y \in A$, $x\mathcal{R}y$ o $y\mathcal{R}x$.

■ **[Relación de equivalencia]:** \mathcal{R} es una relación de equivalencia en A , si es una relación **refleja, simétrica y transitiva**.

■ **[Clase de equivalencia]:** Dado un elemento $a \in A$ se define:

$$[a]_{\mathcal{R}} = \{x \in A \mid a\mathcal{R}x\}$$

■ **[Conjunto cociente]:** Al conjunto de las clases de equivalencia de una relación \mathcal{R} se le llama conjunto cociente, definido por:

$$A/\mathcal{R} := \{[a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A\}$$

■ **[Equivalencias relevantes]:** Sea \mathcal{R} relación de equivalencia en A y $x, y \in A$. Son equivalentes:

- I) $[x]_{\mathcal{R}} \subseteq [y]_{\mathcal{R}}$
- II) $[x]_{\mathcal{R}} \cap [y]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$
- III) $x\mathcal{R}y$
- IV) $[x]_{\mathcal{R}} = [y]_{\mathcal{R}}$

Obs.: Con esto se deduce que A/\mathcal{R}

■ **[Congruencia modular]:** Sea $n \in \mathbb{N}$. Se define \mathbb{Z} la relación \equiv_n por:

$$a \equiv_n b \iff n \mid (a - b)$$

■ **[Teorema de División Entera]:** Sean $a, m \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$. Entonces existe un único par $q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $a = q \cdot m + r$ y $0 \leq r < |m|$.

■ **[Corolario]:** \mathbb{Z}_n ($:= \mathbb{Z} / \equiv_n$) tiene n elementos:

$$\mathbb{Z}_n = \{[r]_n \mid 0 \leq r < n\}$$

-MUCHO ÉXITO EN EL ESTUDIO-

“Cero racismo, cero egoísmo, voy pa lante porque creo en mi mismo.”

D.Y