

**Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida  
respecto al tratamiento antirretroviral en adultos con infección  
por el virus de la inmunodeficiencia humana  
(Actualización enero 2015)**

**Panel de expertos de GeSIDA y Plan Nacional sobre el Sida\***





## **Comité de Redacción\***

### **Coordinadores:**

Juan Berenguer (GeSIDA)	<i>Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid</i>
Rosa Polo (PNS)	<i>Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad</i>
Antonio Rivero (GeSIDA)	<i>Hospital Universitario Reina Sofía/IMIBIC. Córdoba</i>

### **Redactores Generales:**

José López Aldeguer	<i>Hospital Universitario La Fe. IISLaFe. Valencia</i>
Fernando Lozano	<i>Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla</i>

### **Redactores y Revisores:**

Koldo Agurrebengoa (GeSIDA)	<i>Hospital Universitario de Cruces. Bilbao</i>
José Ramón Arribas (GeSIDA)	<i>Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ. Madrid</i>
José Ramón Blanco (PNS)	<i>Hospital San Pedro. Logroño.</i>
Vicente Boix (GeSIDA)	<i>Hospital General Universitario de Alicante</i>
José Luis Casado (PNS)	<i>Hospital Ramón y Cajal. IRYCIS. Madrid</i>
Bonaventura Clotet (GeSIDA)	<i>Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona</i>
Manuel Crespo (PNS)	<i>Hospital Vall d'Hebron. Barcelona</i>
Pere Domingo (GeSIDA)	<i>Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona</i>
Vicente Estrada (GeSIDA)	<i>Hospital Clínico San Carlos. Madrid</i>
Federico García (GeSida)	<i>Complejo Hospitalario Universitario de Granada</i>
José María Gatell (GeSIDA)	<i>Hospital Clínic/IDIBAPS. Universidad de Barcelona. Barcelona</i>
Juan González García (GeSIDA)	<i>Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ. Madrid.</i>
Félix Gutiérrez (GeSIDA)	<i>Hospital General Universitario de Elche, Universidad Miguel Hernández, Alicante</i>
José Antonio Iribarren (GeSIDA)	<i>Hospital Universitario Donostia. San Sebastián</i>
Hernando Knobel (GeSIDA)	<i>Hospital del Mar. Barcelona</i>
Josep Maria Llibre (GeSIDA)	<i>Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona</i>
Jaime Locutura (GeSIDA)	<i>Hospital Universitario. Burgos</i>
Juan Carlos López (GeSIDA)	<i>Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid</i>

José M. Miró (GeSIDA)	<i>Hospital Clínic/IDIBAPS. Universidad de Barcelona. Barcelona</i>
Santiago Moreno (GeSIDA)	<i>Hospital Ramón y Cajal. IRYCIS. Madrid</i>
Daniel Podzamczar (GeSIDA)	<i>Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet, Barcelona</i>
Joaquín Portilla (GeSIDA)	<i>Hospital General Universitario. Alicante</i>
Federico Pulido (GeSIDA)	<i>Hospital Universitario 12 de Octubre, i+12, Madrid</i>
Esteban Ribera (GeSIDA)	<i>Hospital Vall d'Hebron. Barcelona</i>
Melchor Riera (GeSIDA)	<i>Hospital Son Espases. Palma de Mallorca</i>
Rafael Rubio (GeSIDA)	<i>Hospital Universitario 12 de Octubre, i+12, Madrid</i>
Jesús Santos (GeSIDA)	<i>Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga</i>
José Sanz Moreno (PNS)	<i>Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid</i>
Jesús Sanz Sanz (PNS)	<i>Hospital Universitario de la Princesa. Madrid</i>
María Jesús Téllez (PNS)	<i>Hospital Clínico San Carlos. Madrid</i>
Montserrat Tuset (PNS)	<i>Hospital Clínic/IDIBAPS. Universidad de Barcelona. Barcelona</i>

### **Agradecimientos**

La Junta Directiva de GeSIDA y el Plan Nacional sobre el Sida agradecen las aportaciones y opiniones de: Esther Cabrero, Manuel Cotarelo, Jorge del Romero, Carlos Dueñas, Pedro Ferrer, Henar Hevia, Luis Fernando López Cortés, Cristina Lorient, Juan Emilio Losa García, José Emilio Martín Herrero, José Antonio Pérez Molina, Felipe Rodríguez Alcántara, Nuria Sánchez, María Eugenia Vispo,

## Índice

Abreviaturas utilizadas	8
<b>1. Introducción</b>	<b>10</b>
1.1. Justificación, objetivos y alcance	10
1.2. Metodología	10
<b>2. Evaluación clínica y de laboratorio para guiar el TAR</b>	<b>11</b>
2.1. Evaluación clínica	11
2.2. Evaluación de laboratorio y otros estudios complementarios	12
2.2.1. <i>Linfocitos CD4+</i>	12
2.2.2. <i>Carga viral plasmática</i>	13
2.2.3. <i>Concentraciones plasmáticas de fármacos antirretrovirales</i>	13
2.2.4. <i>Resistencia del VIH frente a los fármacos antirretrovirales</i>	14
2.2.5. <i>Determinación del alelo HLA-B*5701</i>	15
2.2.6. <i>Determinación del tropismo del VIH</i>	15
<b>3. Tratamiento antirretroviral inicial</b>	<b>17</b>
3.1. Cuándo iniciar el TAR	17
3.2. Qué combinación de TAR debe utilizarse	18
3.2.1. <i>ITIAN</i>	19
3.2.2. <i>ITINN</i>	20
3.2.3. <i>Inhibidores de la proteasa potenciados</i>	22
3.2.4. <i>Inhibidores de la integrasa</i>	24
<b>4. Cambio del TAR en pacientes con Carga viral suprimida</b>	<b>26</b>
4.1. Cambio de fármacos antirretrovirales. Consideraciones	27
4.2. Cambio de FAR de la misma clase	28
A. <i>ITIAN</i>	28
B. <i>ITINN</i>	29
C. <i>IP</i>	30
4.3. Cambio de FAR de distinta clase	31
A. <i>De ITIAN a INI</i>	31
B. <i>De ITINN a INI</i>	31
C. <i>De enfuvirtida a RAL</i>	31
D. <i>De IP/r a ITINN</i>	32
E. <i>De IP/r a INI</i>	33
4.4. Terapia dual con lamivudina y ATV/r o LPV/r	33
4.5. Monoterapia con IP potenciados	33
4.6. Seguimiento posterior a un cambio de régimen de TAR eficaz	34

<b>75. Fracaso del tratamiento antirretroviral</b>	<b>37</b>
5.1. Definiciones	37
5.2. Incidencia y factores determinantes del fracaso virológico	37
5.3. Objetivos del TAR tras el fracaso virológico	37
5.4. Estrategias para mejorar el éxito de los TAR de rescate	37
5.5. Escenarios clínicos de fracaso virológico	38
<i>Fracaso virológico con viremias bajas</i>	38
<i>Fracaso virológico precoz</i>	38
<i>Fracaso virológico avanzado</i>	39
<i>Fracaso virológico en pacientes sin opciones terapéuticas</i>	40
<b>6. Factores que condicionan el éxito del tratamiento antirretroviral</b>	<b>42</b>
6.1. Adherencia	42
6.2. Tolerabilidad y efectos adversos del TAR	44
6.3. Interacciones farmacológicas	47
<b>7. Situaciones especiales</b>	<b>48</b>
7.1. Infección aguda por VIH	48
7.2. Infección por VIH-2	50
7.3. Embarazo	51
7.4. Comorbilidades	52
7.4.1. <i>TAR de inicio en pacientes con infecciones oportunistas no-TB</i>	52
7.4.2. <i>TAR y tuberculosis</i>	54
7.4.3. <i>Uso de FAR en pacientes con insuficiencia renal</i>	56
7.4.4. <i>Hepatopatías (VHB, VHC, cirrosis hepática)</i>	57
7.4.5. <i>Neoplasias</i>	59
<b>8. Coste comparativo de las diferentes combinaciones de antirretrovirales</b>	<b>59</b>
<b>9. Tablas</b>	<b>61</b>
10. Declaración de conflictos de interés	97

## Abreviaturas utilizadas

3TC	Lamivudina
ABC	Abacavir
APV	Amprenavir
ATV	Atazanavir
BID	Pauta de tratamiento administrada dos veces al día
COBI	Cobicistat
CVP	Carga viral plasmática
d4T	Estavudina
ddI	Didanosina
DRV	Darunavir
DTG	Dolutegravir
FGe	Filtrado glomerular estimado
EFV	Efavirenz
EMA	<i>European Medicines Agency</i>
ENF	Enfuvirtida
ERC	Enfermedad renal crónica
ETR	Etravirina
EVG	Elvitegravir
FAR	Fármacos antirretrovirales
FPV	Fosamprenavir
FTC	Emtricitabina
FV	Fracaso virológico
IDV	Indinavir
IF	Inhibidores de la fusión
INI	Inhibidores de la integrasa
IP	Inhibidores de la proteasa
IP/r	Inhibidor de la proteasa (IP) potenciado con ritonavir
ITIAN	Inhibidor transcriptasa inversa análogo de nucleósido o nucleótido
ITINN	Inhbidor transcriptasa inversa no nucleósido
ITS	Infecciones de transmisión sexual



ITT	Análisis por intención de tratamiento
LPV	Lopinavir
MR	Mutaciones de resistencia
MVC	Maraviroc
NVP	Nevirapina
OT	Análisis “en tratamiento”
PPE	Profilaxis post-exposición
PrPE	Profilaxis pre-exposición
QD	Fármaco o pauta de tratamiento administrada una vez al día
RHS	Reacción de hipersensibilidad
RAL	Raltegravir
RPV	Rilpivirina
RTV	Ritonavir
SIRI	Síndrome inflamatorio de reconstitución inmune
SQV	Saquinavir
SNC	Sistema nervioso central
TAMs	Mutaciones asociadas con resistencia a los análogos de la timidina
TAR	Tratamiento antirretroviral; ídem. de alta eficacia
TB	Tuberculosis
TDF	Tenofovir (disoproxil fumarato)
TLOVR	Tiempo hasta la pérdida de la eficacia virológica
TO	Terapia optimizada
TPV	Tipranavir
VIH-1	Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1
VIH-2	Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2
ZDV, AZT	Zidovudina

## 1. INTRODUCCION

### 1.1. Justificación, objetivo y alcance

Desde que se dispone de FAR con los que formar combinaciones potentes, el TAR ha logrado beneficios enormes en reducción de la morbilidad y transmisión de la infección por el VIH-1. Simultáneamente el manejo de estos FAR ha adquirido gran complejidad con la aparición de distintas familias y de múltiples facetas en cuanto a eficacia, toxicidad, resistencias, tropismo, interacciones, uso en situaciones clínicas especiales y como prevención de la transmisión del VIH-1, estudios de coste-eficacia, etc. Por esta complejidad y por la rapidez con que se incrementan los conocimientos se exige no solo la elaboración de guías y recomendaciones sobre TAR sino también su actualización frecuente. A este respecto, el Grupo de Estudio de Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y el Plan Nacional sobre el Sida (PNS) editan conjuntamente desde hace 16 años un documento de consenso sobre TAR en adultos que, al igual que los de otras instituciones y sociedades científicas<sup>1-3</sup>, se ha venido actualizando anualmente. Dichas actualizaciones se publican tanto en la revista *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica* como en las páginas de GeSIDA ([www.gesida-seimc.org](http://www.gesida-seimc.org)) y del PNS ([www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/planNaISida](http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/planNaISida)).

En estas recomendaciones no se detallan determinados aspectos del TAR (adherencia, uso en pacientes coinfectados por los virus de las hepatitis B o C, insuficiencia renal, tratamiento anti-tuberculosos simultáneo, aspectos relativos a la mujer –deseo reproductivo, embarazo, parto, profilaxis de la transmisión vertical y menopausia-, profilaxis post-exposición, etc.) que se han elaborado en colaboración con otras sociedades científicas y a cuyas publicaciones se remite al lector interesado.

Los objetivos de este documento de consenso son facilitar a los profesionales que tratan a adultos con infección por el VIH el estado actual del conocimiento sobre el TAR y proporcionarles recomendaciones basadas en evidencias científicas que puedan guiar sus decisiones terapéuticas.

### 1.2. Metodología

El Panel redactor del documento está integrado por clínicos expertos en la infección por el VIH-1 y el TAR designados por la Junta Directiva de GeSIDA y el PNS, que han aceptado participar voluntariamente y emitir una declaración de conflicto de intereses. Estos expertos se distribuyen en grupos formados por un redactor y varios consultores que se encargan de actualizar una sección del documento. Tres miembros del Panel (presidente y secretario de GeSIDA y la responsable del Área Asistencial del PNS) actúan como coordinadores y otros dos como redactores generales, cuyo cometido ha sido ensamblar todas las secciones del documento y encargarse de la redacción y edición final del mismo. El redactor de cada grupo revisó los datos más relevantes de las publicaciones científicas (*PubMed* y *Embase*; idiomas: español, inglés y francés) y de las comunicaciones a los congresos más recientes hasta el 30 de octubre de 2014.

El texto elaborado por el redactor se somete a la consideración de sus consultores y se incorporan las aportaciones aceptadas por consenso. Una vez ensambladas todas las secciones, el documento se discute y consensua en una reunión presencial del Panel. Tras la incorporación de las modificaciones aprobadas en dicha reunión, el documento se expone durante 15 días en las páginas web de GeSIDA y del PNS para que los profesionales, los pacientes o quien esté interesado pueda hacer sugerencias que, tras su estudio y deliberación, pueden ser integradas en el documento final. El Panel considera que en el caso de aparecer nuevas evidencias relevantes que impliquen cambios en las recomendaciones sobre TAR serán incorporadas al documento en las páginas web y, a ser posible, en la revista.

En este documento la fuerza de la recomendación y gradación de las pruebas que la sustentan se basan en una modificación de los criterios de la *Infectious Diseases Society of America*<sup>4</sup>. Según los cuales cada recomendación debe ofrecerse siempre (A), en general (B) u opcionalmente (C) y ello basado en los resultados obtenidos a partir de uno o más ensayos clínicos aleatorizados de aspectos clínicos o de laboratorio (I), de uno o más ensayos no aleatorizados o datos observacionales de cohortes (II) o en la opinión de expertos (III).

GeSIDA y el PNS seguirán actualizando este documento periódicamente en función de la evolución de los conocimientos sobre el TAR. No obstante se recuerda que, dado que éstos cambian muy rápidamente, es conveniente que los lectores consulten también otras fuentes de información.

Para el control del seguimiento y la evaluación del impacto de estas recomendaciones sobre la respuesta al TAR de los pacientes seguidos en cada centro o profesional, pueden utilizarse algunos de los parámetros específicos incluidos en el documento de indicadores de calidad asistencial en la atención a personas infectadas por el VIH, elaborado por GeSIDA<sup>5</sup>.

## Referencias bibliográficas

1. Gunthard HF, Aberg JA, Eron JJ, Hoy JF, Telenti A, Benson CA, et al. Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection: 2014 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA 2014;312:410-25.
2. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services. Available at <http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf>. (Consultada el 10.11.2014). (Accessed Acceso 10.11.14,
3. Guidelines for the clinical management and treatment of HIV-infected adults in Europe. (Version 7.02 junio 2014). Disponible en: <http://www.eacsociety.org/Guidelines.aspx> (consultada 10.11.2014).
4. Kish MA, Infectious Diseases Society of A. Guide to development of practice guidelines. Clin Infect Dis 2001;32:851-4.
5. von Wichmann MA, Locutura J, Blanco JR, Riera M, Suarez-Lozano I, Saura RM, et al. Indicadores de calidad asistencial de GESIDA para la atención de personas infectadas por el VIH/sida. Enferm Infecc Microbiol Clin 2010;28 Suppl 5:6-88.

## 2. EVALUACIÓN CLÍNICA Y DE LABORATORIO PARA GUIAR EL TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL

### 2.1. Evaluación clínica

Se realizará una historia clínica completa incluyendo una evaluación psicológica y psiquiátrica, riesgo cardiovascular, vacunaciones, viajes, hábitos sexuales, salud sexual de la pareja, uso de drogas y tóxicos, y una evaluación farmacológica exhaustiva para prevenir o detectar posibles interacciones entre los fármacos utilizados para tratar las comorbilidades y el TAR<sup>1,2</sup>. En las mujeres, además, es conveniente investigar aspectos relacionados con el deseo reproductivo, anticoncepción y otros aspectos ginecológicos específicos. También se debe realizar un examen físico general que incluya piel, orofaringe, corazón, pulmón, abdomen, ganglios linfáticos periféricos, músculo-esquelético, neurológico con evaluación neurocognitiva, y anogenital. Esta evaluación se repetirá con periodicidad anual y/o siempre que la situación clínica del paciente lo requiera<sup>1,2</sup>.

### Recomendación

- Se debe realizar historia clínica, evaluación farmacológica y examen físico a todo paciente con infección por el VIH, que se repetirá con periodicidad anual **(A-II)**

## 2.2. Evaluación de laboratorio y otros estudios complementarios

Se efectuarán determinaciones analíticas generales y, además, otras determinaciones específicas relativas al VIH. Los análisis generales incluyen hemograma, bioquímica básica con determinación de creatinina, filtrado glomerular estimado (preferiblemente CKD-EPI, o MDRD), sodio, potasio, enzimas hepáticas, perfil metabólico (glucosa, colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-LDL y triglicéridos), TSH, proteinograma y perfil óseo (calcio, fósforo y vitamina D), análisis elemental y sedimento de orina, con cuantificación de proteinuria y cálculo del cociente proteína/creatinina en orina (si diabetes mellitus o hipertensión arterial, cuantificar también albuminuria y calcular cociente albúmina/creatinina en orina). Se debe efectuar una serología de toxoplasma, citomegalovirus, lúes, VHA, VHB y VHC. En relación a la infección por el propio VIH-1, se efectuará un recuento de linfocitos CD4+, CVP, estudio de resistencias virales, determinación de HLA-B\*5701 y, eventualmente, estudio del tropismo viral. El recuento de linfocitos CD4+ y la CVP son los parámetros que se utilizan, además de la evaluación clínica, para indicar el TAR, monitorizar su efectividad y tomar decisiones respecto a cambios del tratamiento<sup>1,2</sup>. En la Tabla 1 se describen los estudios complementarios recomendados en la evaluación inicial y el seguimiento periódico de los pacientes infectados por el VIH-1. A continuación se comenta con mayor detalle la información relacionada con las determinaciones específicamente relacionadas con el VIH-1.

### Recomendación

- La evaluación inicial de laboratorio debe incluir: hemograma, bioquímica general, serología de toxoplasma, citomegalovirus, lúes, VHA, VHB y VHC; CVP, linfocitos CD4+, mutaciones de resistencias primarias y HLA-B\*5701 **(A-II)**

#### 2.2.1. Linfocitos CD4+

La cifra de linfocitos CD4+ es el principal indicador del estado inmunológico. Usualmente se utiliza el recuento absoluto, pero también puede utilizarse su porcentaje que es más estable y objetivo, particularmente en pacientes con leucopenia. Se utiliza para estadificar la infección por VIH y evaluar la vulnerabilidad a determinadas infecciones oportunistas, la necesidad de su profilaxis primaria<sup>2</sup> y la eventual discontinuación<sup>3</sup>. Hoy día se reconoce la indicación universal de TAR a todos los pacientes, independientemente del recuento de linfocitos CD4+, aunque en función de este valor la fortaleza de la evidencia para justificar la indicación del TAR varía (A-I a B-III). Una vez instaurado este, el aumento de linfocitos CD4+, en los pacientes en que están disminuidos suele ser lento pero constante en el tiempo. Se admite que durante el primer año debería existir un aumento mínimo de 50-100 linfocitos CD4+/ $\mu\text{L}$ <sup>4</sup>, aunque en algunos pacientes muy inmunodeprimidos no se produce a pesar de la supresión virológica.

En los pacientes asintomáticos que no reciben TAR los CD4+ deben medirse cada 3-6 meses y repetirse en cuatro semanas ante un hallazgo que justifique tomar una decisión terapéutica<sup>5</sup>. Una vez iniciado el TAR, se determinarán a las cuatro semanas y posteriormente cada 3-6 meses o siempre que cambios en la situación clínica lo hagan aconsejable. Los controles pueden ser más espaciados (hasta 12 meses) en los pacientes clínicamente estables, con CVP suprimida y cifras de linfocitos CD4+ repetidamente mayores de 300-500 células/ $\mu\text{L}$ <sup>6,7</sup>.

La monitorización debe ser más frecuente en las situaciones clínicas que pueden disminuirlos (tratamiento con interferón, fármacos anti-neoplásicos, uso de corticoides, etc.) por riesgo de desarrollo de infecciones oportunistas.

## Recomendaciones

- Se debe determinar periódicamente el número absoluto y el porcentaje de linfocitos CD4+ antes de iniciar el TAR y, una vez iniciado, como parámetro de monitorización periódica de la respuesta inmunológica al mismo **(A-I)**
- Los controles pueden ser más espaciados (hasta 12 meses) en los pacientes estables, con CVP suprimida y cifras de linfocitos por encima de 300-500 células/ $\mu$ L **(C-II)**

### 2.2.2. Carga viral plasmática del VIH-1

La CVP se ha de determinar antes de iniciar el TAR ya que desciende rápidamente tras su inicio<sup>2,8</sup>. El objetivo de supresión de la CVP es conseguir unas cifras inferiores a 20-50 copias/mL, ya que así no se seleccionan MR<sup>9</sup> y la duración de la respuesta virológica es mayor que con cifras entre 50-500 copias/mL. Los pacientes con CVP muy elevadas pueden tardar hasta 24 semanas en conseguir niveles inferiores a 20-50 copias/mL. En pacientes con CVP habitualmente indetectable no es infrecuente detectar viremia de bajo nivel (*blips*) que vuelve espontáneamente a ser indetectable sin ningún cambio en el TAR. Aunque en la mayoría de estudios no se ha observado que los *blips* aumenten el riesgo de fracaso virológico, en algunos pacientes pueden seleccionar MR<sup>10</sup>.

Se entiende por *respuesta virológica* la reducción de la CVP en más de 1 log a las cuatro semanas del inicio del TAR y ser indetectable (<50 copias/mL) tras 16-24 semanas de tratamiento. Por el contrario hablamos de *fracaso virológico* si se dan cualesquiera de las dos situaciones siguientes: a) CVP detectable tras 24 semanas del inicio del TAR; b) si tras alcanzar la indetectabilidad, la CVP vuelve a ser >50 copias/mL en dos determinaciones consecutivas (separadas por 2-4 semanas).

Es conveniente medir la CVP a las cuatro semanas del inicio del TAR y, posteriormente, cada 3-6 meses, para comprobar la respuesta virológica y como medida indirecta de adherencia al TAR y refuerzo de la misma<sup>11</sup>. En pacientes clínicamente estables con CVP repetidamente suprimida y cifras elevadas de linfocitos CD4+ este intervalo de tiempo puede alargarse incluso hasta 12 meses<sup>12</sup>. Si la medida de la CVP se efectúa tras un proceso infeccioso intercurrente o vacunación puede haber elevaciones transitorias.

## Recomendaciones

- Se debe determinar la CVP antes del inicio del TAR **(A-II)**
- La CVP es el parámetro principal para evaluar la eficacia virológica del TAR y para definir el fracaso virológico **(A-I)**
- Los objetivos de supresión virológica se deben conseguir tanto en pacientes sin TAR previo como en individuos que han experimentado un fracaso previo **(A-II)**
- Debe utilizarse una técnica de determinación de CVP con un límite de cuantificación de al menos 50 copias/mL y usar siempre la misma técnica **(A-II)**
- Si se van a tomar decisiones terapéuticas en función de un resultado de la CVP, se debe confirmar con una segunda determinación **(A-II)**

### 2.2.3. Concentraciones plasmáticas de fármacos antirretrovirales

Aunque sexo, edad, peso, superficie corporal, determinantes genéticos del huésped, interacciones medicamentosas, embarazo e insuficiencia hepática o renal, se han asociado a variaciones importantes en los niveles plasmáticos de FAR<sup>13</sup>, son múltiples las limitaciones para su uso

rutinario en la clínica diaria: resultados no concordantes de su eficacia en estudios prospectivos<sup>14</sup>, desconocimiento de rangos terapéuticos asociados a respuesta o reducción de efectos adversos, variabilidad intra-individual, no disponibilidad para los ITIAN y falta de disponibilidad de la técnica en los laboratorios.

### Recomendaciones

- No se recomienda la medición de concentraciones plasmáticas de FAR para el control habitual del paciente con infección por el VIH **(A-II)**
- La medición de concentraciones plasmáticas de FAR puede estar indicada en algunas situaciones clínicas: riesgo de interacciones farmacológicas, trasplantes de órganos, delgadez extrema u obesidad mórbida, embarazo, insuficiencia hepática o renal, etc., así como para confirmar la sospecha de un cumplimiento terapéutico deficiente **(B-III)**

#### 2.2.4. Resistencia del VIH-1 frente a fármacos antirretrovirales

El VIH-1 tiene una gran tendencia a producir mutantes resistentes. Las cuasiespecies de VIH-1 con mutaciones de resistencia en general tienen menor capacidad replicativa (*fitness*)<sup>15</sup>. Las resistencias pueden investigarse mediante técnicas genotípicas, que detectan cambios específicos en el genoma de las enzimas diana de los FAR (transcriptasa inversa, proteasa, integrasa) o fenotípicas, que determinan la respuesta de la población viral mayoritaria a concentraciones crecientes de los FAR<sup>15</sup>. Ambas comparten limitaciones en especificidad (no detectan poblaciones por debajo del 20%) y sensibilidad (CVP<500-1.000 copias/mL)<sup>16</sup>, aunque existen técnicas que soslayan estos inconvenientes. Las técnicas genotípicas son las que se utilizan en la asistencia clínica dado que son más sencillas, rápidas y accesibles.

En los pacientes con fracaso virológico es imperativo efectuar un estudio de resistencias para adecuar el nuevo TAR al perfil de mutaciones del VIH<sup>15,16</sup>, incluyendo resistencias en la integrasa viral si el paciente ha fracasado a fármacos de esta familia. Debido a la capacidad de reversión de las mutaciones a las cepas sensibles, es necesario efectuar el estudio manteniendo el TAR activo.

Los pacientes con diagnóstico nuevo pueden haberse infectado por cepas de VIH-1 resistentes a algunos FAR (resistencia primaria) por lo que es necesario efectuar un estudio de resistencias en el momento del diagnóstico. Sin embargo, las cepas con mutaciones pueden revertir o convertirse en minoritarias a los pocos meses (menor *fitness*). Si se difiere el inicio del TAR en un paciente recientemente diagnosticado, es conveniente un nuevo estudio de resistencias antes de iniciarlo<sup>17</sup>.

La transmisión de resistencias primarias en países occidentales se ha estabilizado<sup>18</sup> y la última actualización en la cohorte de la Red de SIDA (CoRIS) para el periodo 2013-2014 ha estimado una prevalencia global de resistencias primarias a inhibidores de la transcriptasa inversa y de la proteasa del 8.7%<sup>19</sup>. La transmisión de resistencias en la integrasa es excepcional<sup>20</sup> por lo que su determinación en pacientes sin TAR previo se reserva sólo para aquéllos en los que existe alta sospecha de transmisión (multirresistencia en proteasa y/o transcriptasa inversa o caso índice tratado con INIs).

En relación a las variantes minoritarias, la información disponible sugiere que pueden estar implicadas en algunos fracasos virológicos<sup>21</sup> y cada vez se les concede un mayor interés, especialmente si el TAR se inicia con ITINN.

Para la interpretación de las mutaciones asociadas con resistencia a FAR se utilizan algoritmos que se actualizan periódicamente, como el de la Red de Sida ([www.retic-ris.net](http://www.retic-ris.net)).

## Recomendaciones

- Se recomienda realizar un estudio genotípico de resistencias del VIH en los genes de la transcriptasa inversa y proteasa en todos los pacientes, tanto al diagnóstico de la infección como antes de iniciar el TAR si se difiere **(A-II)**
- Sólo se recomienda estudiar resistencias en la integrasa si existe alta sospecha de transmisión de resistencias a esta familia **(C-III)**
- Se recomienda la realización de un estudio genotípico de resistencias del VIH en todos los pacientes con fracaso virológico confirmado **(A-I)**

### 2.2.5. Determinación del alelo HLA-B\*5701

Los portadores del alelo HLA-B\*5701 tienen mayor riesgo de presentar una RHS a ABC. La RHS a ABC es un síndrome multiorgánico que puede manifestarse con una combinación variable de exantema, fiebre, mialgias y síntomas respiratorios o gastrointestinales que puede llegar a ser fatal si se continua tomando ABC o se reintroduce este FAR después de haberlo suspendido. Suele aparecer durante las primeras seis semanas de TAR y se presenta en el 5-8% de los pacientes que toman ABC<sup>22</sup>. Ensayos clínicos en diferentes poblaciones (caucásica y raza negra, en la que la prevalencia de este alelo es menor) han demostrado fehacientemente que cuando no se prescribe ABC a los pacientes que son portadores de HLA-B\*5701 disminuye significativamente la incidencia de RHS<sup>23,24</sup>. ABC no debe utilizarse por tanto en personas portadoras de HLA-B\*5701. Una prueba de HLA-B\*5701 negativa no descarta completamente la posibilidad de RHS por ABC, por lo cual se debe informar a los pacientes acerca de la RHS cuando se inicia un tratamiento con ABC y evaluar los síntomas que eventualmente puedan presentar.

## Recomendaciones

- Se debe determinar el HLA-B\*5701 en todos los pacientes antes de iniciar un régimen de TAR que contenga ABC **(A-I)**
- No se debe prescribir ABC si la prueba del HLA-B\*5701 es positiva **(A-I)**

### 2.2.6. Determinación del tropismo del VIH-1

La disponibilidad de MVC, FAR antagonista del correceptor CCR5, requiere conocer el tropismo del VIH para ser usado. MVC se debe prescribir exclusivamente en los pacientes con infección por cepas R5 de VIH. El tropismo del VIH se determina mediante métodos genotípicos, que determinan la secuencia de la región V3 de la gp120. Esta es la técnica de referencia actual ya que se puede realizar en cualquier laboratorio que realice estudios de resistencias, es rápida, no precisa una CVP elevada para obtener resultados fiables y reproducibles y su coste es aceptable<sup>25</sup>. Existen métodos fenotípicos, como *Trofile*ESTA®, pero son técnicas complejas y caras.

Diferentes grupos de consenso nacionales<sup>26</sup> y europeos<sup>27</sup> recomiendan determinar el tropismo en los pacientes que hayan fracasado a cualquier línea de tratamiento y vayan a iniciar un tratamiento de rescate que contemple el uso de antagonistas de CCR5, y en pacientes sin TAR previo en las que un FAR antagonista del receptor CCR5 pueda considerarse una buena opción terapéutica.

## Recomendación

- Se debe determinar el tropismo viral antes de iniciar el tratamiento con un FAR inhibidor del receptor CCR5 **(A-I)**



## Referencias bibliográficas

1. Aberg JA, Gallant JE, Ghanem KG, Emmanuel P, Zingman BS, Horberg MA, et al. Primary care guidelines for the management of persons infected with HIV: 2013 update by the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2014;58:e1-34.
2. Asboe D, Aitken C, Boffito M, Booth C, Cane P, Fakoya A, et al. British HIV Association guidelines for the routine investigation and monitoring of adult HIV-1-infected individuals 2011. *HIV Med* 2012;13:1-44.
3. Lopez Bernaldo de Quiros JC, Miro JM, Pena JM, Podzamczar D, Alberdi JC, Martinez E, et al. A randomized trial of the discontinuation of primary and secondary prophylaxis against *Pneumocystis carinii* pneumonia after highly active antiretroviral therapy in patients with HIV infection. *Grupo de Estudio del SIDA 04/98. N Engl J Med* 2001;344:159-67.
4. Mocroft A, Phillips AN, Gatell J, Ledergerber B, Fisher M, Clumeck N, et al. Normalisation of CD4 counts in patients with HIV-1 infection and maximum virological suppression who are taking combination antiretroviral therapy: an observational cohort study. *Lancet* 2007;370:407-13.
5. Kimmel AD, Goldie SJ, Walensky RP, Losina E, Weinstein MC, Paltiel AD, et al. Optimal frequency of CD4 cell count and HIV RNA monitoring prior to initiation of antiretroviral therapy in HIV-infected patients. *Antivir Ther* 2005;10:41-52.
6. Sayana S, Javanbakht M, Weinstein M, Khanlou H. Clinical impact and cost of laboratory monitoring need review even in resource-rich setting. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2011;56:e97-8.
7. Gale HB, Gitterman SR, Hoffman HJ, Gordin FM, Benator DA, Labriola AM, et al. Is frequent CD4+ T-lymphocyte count monitoring necessary for persons with counts  $\geq 300$  cells/ $\mu$ L and HIV-1 suppression? *Clin Infect Dis* 2013;56:1340-3.
8. Huang W, De Gruttola V, Fischl M, Hammer S, Richman D, Havlir D, et al. Patterns of plasma human immunodeficiency virus type 1 RNA response to antiretroviral therapy. *J Infect Dis* 2001;183:1455-65.
9. Nettles RE, Kieffer TL, Simmons RP, Cofrancesco J, Jr., Moore RD, Gallant JE, et al. Genotypic resistance in HIV-1-infected patients with persistently detectable low-level viremia while receiving highly active antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 2004;39:1030-7.
10. Garcia-Gasco P, Maida I, Blanco F, Barreiro P, Martin-Carbonero L, Vispo E, et al. Episodes of low-level viral rebound in HIV-infected patients on antiretroviral therapy: frequency, predictors and outcome. *J Antimicrob Chemother* 2008;61:699-704.
11. Bonner K, Mezocho A, Roberts T, Ford N, Cohn J. Viral load monitoring as a tool to reinforce adherence: a systematic review. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2013;64:74-8.
12. Kieffer TL, Finucane MM, Nettles RE, Quinn TC, Broman KW, Ray SC, et al. Genotypic analysis of HIV-1 drug resistance at the limit of detection: virus production without evolution in treated adults with undetectable HIV loads. *J Infect Dis* 2004;189:1452-65.
13. Nettles RE, Kieffer TL, Parsons T, Johnson J, Cofrancesco J, Jr., Gallant JE, et al. Marked intraindividual variability in antiretroviral concentrations may limit the utility of therapeutic drug monitoring. *Clin Infect Dis* 2006;42:1189-96.
14. Wertheimer BZ, Freedberg KA, Walensky RP, Yazdanapah Y, Losina E. Therapeutic drug monitoring in HIV treatment: a literature review. *HIV Clin Trials* 2006;7:59-69.
15. Tang MW, Shafer RW. HIV-1 antiretroviral resistance: scientific principles and clinical applications. *Drugs* 2012;72:e1-25.
16. Wensing AM, Calvez V, Gunthard HF, Johnson VA, Paredes R, Pillay D, et al. 2014 update of the drug resistance mutations in HIV-1. *Top Antivir Med* 2014;22:642-50.
17. Wittkop L, Gunthard HF, de Wolf F, Dunn D, Cozzi-Lepri A, de Luca A, et al. Effect of transmitted drug resistance on virological and immunological response to initial combination antiretroviral therapy for HIV (EuroCoord-CHAIN joint project): a European multicohort study. *Lancet Infect Dis* 2011;11:363-71.
18. U. K. Collaborative Group on HIV Drug Resistance, Dolling D, Sabin C, Delpech V, Smit E, Pozniak A, et al. Time trends in drug resistant HIV-1 infections in the United Kingdom up to 2009: multicentre observational study. *BMJ* 2012;345:e5253.
19. Alvarez Estévez M, Camacho-Luque R, Chueca N, Pérez-Elias MJ, Vidal C, Viciano I, et al. Transmisión de cepas con mutaciones y resistencia a fármacos de primera línea en los pacientes VIH *naïve* en CoRIS. Actualización 2013-2014. VI Congreso Nacional de GeSIDA, 25-28 de noviembre 2014, Málaga. Abstract P-119.
20. Alvarez Estévez M, Monge S, Fernandez-Caballero J, Chueca N, Díez M, Viciano P, et al. Vigilancia epidemiológica de transmisión de resistencias en la integrasa. VI Congreso Nacional de GeSIDA, 25-28 de noviembre 2014, Málaga. Abstract PO-35.
21. Li JZ, Paredes R, Ribaud HJ, Svarovskaia ES, Metzner KJ, Kozal MJ, et al. Low-frequency HIV-1 drug resistance mutations and risk of NNRTI-based antiretroviral treatment failure: a systematic review and pooled analysis. *JAMA* 2011;305:1327-35.
22. Hughes CA, Foisy MM, Dewhurst N, Higgins N, Robinson L, Kelly DV, et al. Abacavir hypersensitivity reaction: an update. *Ann Pharmacother* 2008;42:387-96.
23. Mallal S, Phillips E, Carosi G, Molina JM, Workman C, Tomazic J, et al. HLA-B\*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. *N Engl J Med* 2008;358:568-79.
24. Saag M, Balu R, Phillips E, Brachman P, Martorell C, Burman W, et al. High sensitivity of human leukocyte antigen-B\*5701 as a marker for immunologically



confirmed abacavir hypersensitivity in white and black patients. Clin Infect Dis 2008;46:1111-8.

25. Prosperi MC, Bracciale L, Fabbiani M, Di Giambenedetto S, Razzolini F, Meini G, et al. Comparative determination of HIV-1 co-receptor tropism by Enhanced Sensitivity Trofile, gp120 V3-loop RNA and DNA genotyping. Retrovirology 2010;7:56.

26. Poveda E, Alcamí J, Paredes R, Córdoba J, Gutiérrez F, Llibre JM, et al. Genotypic determination of HIV

tropism - clinical and methodological recommendations to guide the therapeutic use of CCR5 antagonists. AIDS Rev 2010;12:135-48.

27. Vandekerckhove LP, Wensing AM, Kaiser R, Brun-Vezinet F, Clotet B, De Luca A, et al. European guidelines on the clinical management of HIV-1 tropism testing. Lancet Infect Dis 2011;11:394-407.

### 3. TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL INICIAL

Los principales motivos para iniciar el TAR son la reducción de la morbilidad y mortalidad asociada a la infección por VIH, la recuperación y preservación de la función inmunológica, evitar el efecto nocivo de la replicación del VIH sobre posibles comorbilidades existentes y la prevención de la transmisión del VIH. Es importante valorar de forma individual el momento de inicio del TAR y de los FAR que deben formar parte del régimen inicial, sopesando las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones. La disposición y la motivación del paciente es un factor crítico a la hora de tomar la decisión de cuándo empezarlo.

#### 3.1. Cuándo iniciar el TAR

No existe ninguna duda sobre la necesidad de tratar a todos los pacientes con sintomatología relacionada con la infección por el VIH (eventos clínicos B o C de la clasificación de los CDC de 2003, incluyendo la nefropatía por VIH), puesto que el tratamiento se relaciona con mejora de la supervivencia.

En pacientes asintomáticos, los resultados de diferentes ensayos clínicos indican que el riesgo de progresión y/o muerte es mayor cuando se inicia el TAR con cifras de linfocitos CD4+ inferiores a 350 células/ $\mu$ L que cuando se inicia con cifras por encima de ésta<sup>1,2</sup>. La mejora en la seguridad de los tratamientos y la acumulación de datos que indican una mayor morbimortalidad por causas no relacionadas con el sida en pacientes asintomáticos con menos de 350 linfocitos CD4+/ $\mu$ L en diferentes estudios observacionales y de sub-análisis de algunos ensayos clínicos<sup>1,3</sup> han modificado la recomendación de inicio del TAR en este grupo de pacientes

En la *ART Cohort Collaboration*<sup>4</sup> el riesgo de progresión y/o muerte fue mayor cuando se inició el TAR entre 250-350 linfocitos CD4+/ $\mu$ L que con 350-450/ $\mu$ L; sin embargo, el inicio con cifras de linfocitos CD4+ entre 450-550/ $\mu$ L no se relacionó con un descenso adicional del riesgo de progresión o muerte. En la cohorte HIV-CAUSAL<sup>5</sup> el riesgo de progresión a sida o muerte fue mayor cuando se inició el TAR con menos de 350 linfocitos CD4+/ $\mu$ L que cuando se inició entre 350 y 500 / $\mu$ L. En la *CASCADE Collaboration*<sup>6</sup> iniciar TAR entre 350 y 500 linfocitos CD4+/ $\mu$ L también disminuyó la mortalidad en comparación con la de los pacientes que lo iniciaron con cifras de CD4+ inferiores a 350/ $\mu$ L; sin embargo, empezar TAR entre 500 y 799 CD4+/ $\mu$ L no disminuyó el riesgo de progresión a sida o muerte con respecto al grupo que lo inició entre 350 y 500 CD4+/ $\mu$ L. Por el contrario, los datos de la cohorte NA-ACCORD<sup>7</sup> muestran un mayor riesgo de muerte en los pacientes en los que se demora el inicio del TAR hasta recuentos de linfocitos CD4+ inferiores a 500/ $\mu$ L, comparado con los que lo inician más precozmente.

En un pequeño sub-estudio del ensayo SMART<sup>2</sup>, los pacientes que iniciaron TAR con cifras de linfocitos CD4+ mayores de 350/ $\mu$ L (mediana: 437/ $\mu$ L) presentaron menos complicaciones graves asociadas o no al sida que los que lo hicieron con menos de 250 células/ $\mu$ L. Por último, en el estudio HPTN 052<sup>3</sup> iniciar TAR entre 350-550 CD4+/ $\mu$ L disminuyó el riesgo de progresión

clínica, pero no la mortalidad, con respecto a los que lo iniciaron con menos de 250 CD4+/μL.

Todos estos datos favorecen la recomendación de iniciar TAR con menos de 500 CD4+/μL. El debate actual se centra en torno a si es necesario iniciar TAR con más de 500 linfocitos CD4+/μL. No existen de momento datos concluyentes, aunque la simplicidad y tolerabilidad de los regímenes actuales tampoco justifica la demora para iniciar el TAR. Además, el incremento de la población tratada se ha relacionado con una disminución de las tasas de transmisión y por tanto, de la disminución de nuevas infecciones<sup>8,9</sup>. Por todo ello, la recomendación de iniciar el TAR en toda persona con infección es compartida por un número creciente de expertos. En cualquier caso, el TAR debería recomendarse en aquellos grupos de pacientes con un mayor riesgo de progresión, como los que presentan CVP superior a 10<sup>5</sup> copias/mL y una edad igual o mayor de 55 años. También se recomienda iniciar TAR en pacientes con comorbilidades cuya progresión se ve facilitada por la propia infección por VIH, como la cirrosis hepática, la hepatitis crónica por VHC, la existencia de RCV elevado, los tumores no relacionados con el sida y los trastornos neurocognitivos.

Por último, existen determinadas circunstancias en las que el TAR debe recomendarse con independencia de la situación inmunológica, como es el caso de las mujeres embarazadas (para disminuir el riesgo de transmisión materno-fetal), la coinfección por hepatitis B subsidiaria de tratamiento antiviral, o las parejas serodiscordantes que deseen disminuir al máximo el riesgo de transmisión del VIH.

Como excepción se consideran los pacientes que mantienen CVP indetectable de forma mantenida sin TAR (controladores de élite). En este caso no existe información que permita valorar el efecto beneficioso del TAR, por lo que no se puede establecer una recomendación al respecto.

### **Recomendaciones**

- Se recomienda la administración de TAR a todos los pacientes con infección por el VIH para evitar la progresión de la enfermedad, disminuir la transmisión del virus y limitar el efecto nocivo sobre posibles comorbilidades coexistentes. La fuerza de la recomendación varía según las circunstancias, como se detalla en la tabla 2
- El inicio del TAR debe valorarse siempre individualmente. Antes de tomar la decisión de iniciarlo deben confirmarse las cifras de linfocitos CD4+ y CVP. Además, debe prepararse al paciente, ofertando las distintas opciones, adaptando el esquema terapéutico al estilo de vida, comorbilidades, posibles interacciones y valorando el riesgo de mala adherencia **(A-III)**

### **3.2. Qué combinación de antirretrovirales debe utilizarse**

Las pautas recomendadas para el tratamiento inicial de la infección por el VIH-1 en el momento actual consisten en una combinación de tres fármacos que incluyan dos ITIAN asociado a un INI, o un ITINN, o un IP/r (Tabla 3). Con estas combinaciones se puede conseguir una CVP inferior a 50 copias/mL en más del 75% de los casos a las 48 semanas.

Sólo en el caso de que no puedan utilizarse TDF o ABC, se pueden recomendar combinaciones de dos FAR que excluyen uno o ambos ITIAN, pero en el momento actual ninguna puede ser considerada preferente para el inicio del TAR.

### **Recomendación**

- Pueden utilizarse las combinaciones de 2 ITIAN + 1 ITINN, 2 ITIAN + 1 IP/r o 2 ITIAN + 1 INI como TAR de inicio (los FAR preferentes se detallan más adelante, Tabla 3) **(A-I)**

### *3.2.1. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos*

En España están comercializados seis ITIAN: ZDV, ddl, d4T, 3TC, FTC y ABC. También se dispone de un análogo de nucleótido (TDF). A efectos prácticos, la abreviatura ITIAN incluye también al TDF en esta guía.

Se consideran como combinaciones de ITIAN de elección las formadas por TDF/FTC y por ABC/3TC, que deberían administrarse siempre que sea posible en preparados coformulados. No existe en la actualidad suficiente información que permita considerar como equivalentes terapéuticos a FTC y 3TC, por lo que el uso de uno u otro ITIAN en los regímenes seleccionados depende fundamentalmente de la experiencia disponible en su uso conjunto con los otros FAR de la combinación.

La mayor toxicidad relacionada con el uso de ZDV, ddl y d4T no permite recomendar su uso en ninguna pauta de inicio.

### *Combinaciones con TDF/FTC frente a combinaciones con ABC/3TC*

En el ensayo clínico ACTG 5202<sup>10</sup> se comparó de forma ciega el inicio de TAR con ABC/3TC o TDF/FTC en 1.857 pacientes. Los participantes fueron aleatorizados además a recibir ATV/r o EFV de forma abierta. Entre los pacientes con CVP basal igual o mayor de 100.000 copias/mL, tanto el tiempo hasta el fracaso virológico como el tiempo hasta el primer efecto adverso de grado 3-4 fueron significativamente más cortos en el brazo de ABC/3TC que en el brazo de TDF/FTC, lo que ocasionó la interrupción del estudio para los pacientes en este estrato de CVP. En los pacientes con CVP menor de 100.000 copias/mL no hubo diferencias en eficacia virológica entre ABC/3TC y TDF/FTC, independientemente de que se administraran con ATV/r o EFV<sup>11,12</sup>.

El estudio ASSERT<sup>13</sup> es un ensayo clínico abierto en el que se compararon los perfiles de seguridad de TDF/FTC y ABC/3TC (ambos administrados con EFV) en pacientes HLA-B\*5701-negativos. Aunque no fue diseñado para comparar eficacia, se observó que la proporción de pacientes con CVP inferior a 50 copias/mL a las 48 semanas fue significativamente superior con TDF/FTC que con ABC/3TC.

A diferencia de lo observado en el estudio ACTG 5202, en el estudio HEAT<sup>14</sup> (doble ciego de 96 semanas de duración) no se observaron diferencias en la eficacia virológica ni en la respuesta inmunológica de ABC/3TC comparado con TDF/FTC cuando se combinan con LPV/r, con independencia de la CVP de partida.

Tres estudios en fase III diseñados para comparar el TAR de inicio con DTG, frente a otros FAR recomendados (EFV en el estudio SINGLE<sup>15</sup>, RAL en el estudio SPRING2<sup>16</sup> o DRV/r en el estudio FLAMINGO<sup>17</sup>, han mostrado una eficacia similar de ABC/3TC o TDF/FTC. Sin embargo, dichos ensayos clínicos no permiten establecer comparaciones formales puesto que, o bien la elección de ITIAN no fue aleatorizada, quedando a criterio del investigador<sup>16,17</sup>, o las distintas combinaciones de ITIAN iban asociadas a un tercer fármaco también distinto<sup>15</sup>.

Finalmente, en un meta-análisis de ensayos clínicos no se observaron diferencias en la eficacia virológica de los tratamientos basados en ABC o TDF, aunque sí una mayor frecuencia de discontinuaciones debidas a efectos adversos con ABC<sup>18</sup>.

En el caso de seleccionar un régimen basado en ABC, se debe realizar siempre previamente la determinación del HLAB\*5701 del paciente, que de ser positivo contraindicaría su uso.

### **Recomendaciones**

- Las combinaciones de ITIAN de elección para regímenes de inicio son TDF/FTC o ABC/3TC (A-I). Se recomienda su uso en coformulaciones **(A-II)**

- La combinación TDF/FTC debe evitarse en pacientes con insuficiencia renal **(A-II)**
- La combinación ABC/3TC se debe evitar en pacientes con CVP elevada (más de 100.000 copias/mL) cuando se combina con un ITINN o un IP/r distinto de LPV/r **(A-II)**

### 3.2.2. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (ITINN)

En España hay cuatro ITINN comercializados (NVP, EFV, ETR y RPV). Son inductores de algunos isoenzimas del citocromo P450 pudiendo interaccionar con otros fármacos. EFV se administra QD (un comprimido de 600 mg/día, existiendo una presentación coformulada con TDF/FTC en un solo comprimido). Su principal limitación es la frecuente aparición de síntomas relacionados con el SNC, que aparecen al empezar su toma y que aunque suelen ser leves y transitorios pueden dar lugar a discontinuaciones del TAR. Esto hace que sea un fármaco a evitar en algunas circunstancias, tales como trabajos de riesgo que requieran concentración, turnos laborales cambiantes o trastornos psiquiátricos no controlados. En un análisis de cuatro grandes ensayos clínicos independientes se ha encontrado un mayor riesgo de intentos de suicidio y de suicidios consumados en los pacientes que recibían EFV (2,90 por 1.000 personas-año, vs. 1,22 por 1.000 personas-año)<sup>19</sup>. Con EFV también existe riesgo de exantema durante las primeras semanas, lo que se debe advertir al paciente. EFV debe evitarse en mujeres gestantes o con deseo de gestación por el potencial riesgo de teratogenicidad.

RPV se administra QD (un comprimido de 25 mg/día, existiendo también una presentación coformulada con TDF/FTC en un solo comprimido); debe administrarse con una comida y está contraindicado el uso de inhibidores de la bomba de protones. NVP se puede administrar tanto QD (400 mg/d, en comprimido de liberación retardada) o como BID (200 mg/ 12 horas), aunque durante los primeros 14 días se administra un comprimido de 200 mg al día. Está contraindicada en mujeres con más de 250 CD4+/μL y en varones con más de 400 CD4+/μL por presentar mayor riesgo de RHS. ETR (1 comprimido de 200 mg/12 h), no está aprobada por la EMA para el TAR de inicio.

EFV se ha comparado en ensayos clínicos con otros ITINN. Tres ensayos clínicos han comparado el uso de EFV frente a RPV, ambos combinados con dos ITIAN<sup>20-22</sup>. Los estudios ECHO<sup>20</sup> y THRIVE<sup>21</sup> incluyeron a pacientes adultos sin TAR previo y sin MR en el estudio genotípico basal. Los participantes fueron aleatorizados a recibir de forma ciega RPV o EFV junto a dos ITIAN (TDF/FTC coformulado en el estudio ECHO y una pareja de ITIAN seleccionada por los investigadores en el estudio THRIVE, que en el 60% de los casos era también TDF/FTC). El análisis combinado de ambos estudios a las 96 semanas demostró la no-inferioridad de RPV con respecto a EFV. La tasa de fracaso virológico fue sin embargo superior con RPV en el subgrupo de pacientes con CVP al inicio del TAR mayor de 100.000 copias/mL (17,6 vs. 7,6%), por lo que no se recomienda el uso de RPV/TDF/FTC en estos pacientes. El fallo virológico con RPV se asoció con mayor frecuencia a resistencia genotípica a otros ITINN y a ITIAN (especialmente por selección de la mutación M184I y M184V). La tolerabilidad fue mejor con RPV, con un menor número de discontinuaciones por efectos adversos y menos efectos adversos relacionados con el SNC<sup>22</sup>.

En el tercer ensayo clínico (STaR)<sup>23</sup> se compararon de forma abierta dos pautas de TAR basadas en regímenes de un solo comprimido en pacientes sin TAR previo: RPV/TDF/FTC frente a EFV/TDF/FTC. Se demostró la no-inferioridad de RPV/TDF/FTC frente a EFV/TDF/FTC en la población total tanto a las 48 como a las 96 semanas<sup>23</sup>. En el análisis de subgrupos RPV/TDF/FTC fue superior a EFV/TDF/FTC en los pacientes con CV igual o menor de 100.000 copias/mL, no inferior en los pacientes con CVP superior a 100.000 copias/mL e inferior en pacientes con CVP mayor de 500.000 copias/mL. Los pacientes tratados con RPV en relación a los tratados con EFV tuvieron una menor frecuencia de retirada del tratamiento por efectos adversos, una menor incidencia de efectos adversos del SNC y una menor frecuencia de efectos adversos psi-

quiátricos. No se dispone de comparaciones de RPV con otros FAR en el TAR de inicio.

NVP se ha comparado con EFV en el estudio 2NN<sup>24</sup>, en el que no logró demostrar la no-inferioridad. Además el uso de NVP se asoció con mayor toxicidad.

EFV ha demostrado una eficacia superior frente a LPV/r<sup>25</sup>, SQV/r<sup>26</sup> o APV/r<sup>27</sup>. El único IP/r que hasta el momento ha mostrado una eficacia equiparable a EFV es ATV/r. En el estudio ACTG 5202<sup>10</sup>, la eficacia virológica resultó similar en los tratados con ATV/r que en los tratados con EFV independientemente que recibieran ABC/3TC o TDF/FTC. Entre los pacientes que experimentaron fracaso virológico, la emergencia de cepas con MR fue significativamente menor en los pacientes tratados con ATV/r que entre los tratados con EFV. El tiempo hasta el primer evento de seguridad y el primer evento de tolerabilidad fue significativamente más largo para los pacientes con ATV/r que para los pacientes con EFV cuando la pareja de ITIAN era ABC/3TC, pero no hubo diferencias en seguridad ni tolerabilidad entre ATV/r y EFV cuando la pareja de ITIAN era TDF/FTC.

Es en la comparación con los INI donde se ha empezado a poner de manifiesto que es posible superar la eficacia demostrada con EFV. El estudio STARTMRK<sup>28</sup> comparó el uso de EFV frente a RAL, asociados con TDF/FTC. El estudio mantuvo el diseño ciego durante los cinco años de seguimiento. RAL resultó no-inferior a EFV durante los tres primeros años de tratamiento, pero se mostró superior a partir del cuarto año. Además, se observó una mayor rapidez en la supresión virológica con RAL, efecto que posteriormente se ha observado con todas las pautas que incluyen un INI, pero los datos de seguimiento no permiten afirmar que esta circunstancia tenga relevancia en la evolución clínica.

La combinación de EFV/FTC/TDF también ha sido evaluada en el estudio GS-US-236-0102<sup>29</sup>, un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego que comparó dos regímenes administrados en un único comprimido: EVG/COBI/FTC/TDF y EFV/FTC/TDF. Se han comunicado datos a tres años que confirman la no-inferioridad de la pauta con EVG/COBI/FTC/TDF frente a EFV/FTC/TDF. No hubo diferencias significativas en lo que respecta a retirada del TAR por efectos adversos entre ambos brazos de tratamiento. El incremento en la creatinina sérica en la semana 48 fue mayor en los tratados con EVG/COBI/FTC/TDF que en los tratados con EFV/FTC/TDF, lo que se ha relacionado con cambios en la secreción tubular de creatinina y no a un efecto directo sobre el FG. Cabe remarcar que en este estudio se excluyeron los pacientes con un FGe inferior a 70 mL/min y también la baja proporción de pacientes en fase avanzada (12% con menos de 200 CD4+/μL), lo que limita la generalización de los resultados a estos subgrupos.

En el estudio SINGLE<sup>15,30</sup> se compararon de forma ciega EFV/FTC/TDF y DTG+ABC/3TC. Las tasas de respuesta en la semana 48 (CVP inferior a 50 copias/mL por un análisis ITT, según el algoritmo *snapshot* de la FDA) fueron del 88% de los tratados con DTG + ABC/3TC y el 81% de los tratados con EFV/FTC/TDF (diferencia: 7,4%; IC 95%: 2,5-12,3%), y en la semana 144 fueron del 71% y 63% respectivamente (diferencia: 8,3%; IC 95%: 2,0-14,6%), confirmandose la superioridad de DTG+ABC/3TC sobre EFV/FTC/TDF. La proporción de fracasos virológicos fue similar en ambos brazos (9 y 8% al tercer año). La proporción de interrupciones del tratamiento por efectos adversos fue, sin embargo, mayor en el brazo de EFV/FTC/TDF (14%) que en el brazo de DTG + ABC/3TC (4%). La detección de mutantes resistentes tras el fracaso virológico fue muy baja en ambos brazos de tratamiento, particularmente en el brazo de DTG + ABC/3TC, en el que no se detectaron MR al INI en ningún caso. Al igual que el estudio anterior, la proporción de pacientes en fase avanzada fue baja (14%), por lo que tiene la misma limitación que aquél.

NVP se ha comparado con ATV/r, ambos combinados con TDF/FTC, en el ensayo ARTEN<sup>31</sup>, demostrándose la no-inferioridad de NVP frente a ATV/r a las 48 semanas. La frecuencia de efectos adversos graves fue similar en ambos brazos, aunque las retiradas motivadas por efectos adversos resultaron más frecuentes con NVP que con ATV/r. Ninguno de los 28 pacientes con

fracaso virológico del brazo de ATV/r seleccionó cepas de VIH con MR mientras que ello ocurrió en 29 de los 44 pacientes con fracaso virológico del brazo de NVP.

### Recomendaciones

- La combinación de EFV/TDF/FTC se considera una opción alternativa de tratamiento **(A-I)**
- La combinación de EFV + ABC/3TC debe evitarse en pacientes con CVP mayor de 100.000 copias/mL **(B-I)**
- EFV está contraindicado durante el primer trimestre de la gestación. Se recomienda considerar otras opciones en mujeres que no utilicen métodos anticonceptivos eficaces. Se debe evitar en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas no estabilizadas y en pacientes que realicen tareas peligrosas si presentan síntomas de somnolencia, mareos o trastornos de la concentración **(A-III)**
- NVP está contraindicado en mujeres con cifras de linfocitos CD4+ superiores a 250 células/ $\mu$ L y en varones con cifras superiores a 400 células/ $\mu$ L **(A-II)**
- RPV no debe utilizarse en pacientes con CVP mayor de 100.000 copias/mL **(A-II)**
- En pacientes con CVP inferior a 100.000 la combinación RPV/TDF/FTC se considera un régimen de elección **(A-I)**

### 3.2.3. Inhibidores de la proteasa potenciados

En el TAR de inicio sólo se pueden usar IP cuando van potenciados con dosis bajas de RTV o COBI. En la actualidad los IP potenciados disponibles en la clínica son 6: ATV, DRV, LPV, FPV, SQV y TPV, aunque este último está aprobado por la EMA solamente para pacientes pre-tratados. Los IP son inductores e inhibidores del citocromo P450 y frecuentemente pueden originar interacciones farmacológicas. La elección final del IP se basará en datos de eficacia, tolerabilidad, posología y farmacocinética. LPV se administra en comprimidos coformulados con RTV. COBI se ha autorizado por la EMA para potenciar ATV o DRV, habiéndose aprobado recientemente la utilización de DRV/COBI en un único comprimido coformulado.

Los IP se caracterizan por una elevada barrera genética que dificulta la selección de MR aún en situaciones desfavorables como la baja adherencia. Por otra parte son los FAR con peor perfil metabólico, asociándose a hiperlipidemia, aunque en menor medida en el caso de ATV y DRV.

LPV fue el primer IP desarrollado para utilizar potenciado y ha sido el referente de esta familia durante años. El resto de IP se han comparado con LPV/r en diversos ensayos clínicos demostrando la no-inferioridad de FPV/r<sup>32</sup>, SQV/r<sup>33</sup>, ATV/r<sup>34</sup> y DRV/r<sup>35</sup>. SQV/r y FPV/r tienen en la actualidad un uso muy limitado debido a que no aportan ventajas significativas en cuanto a simplicidad o tolerabilidad con los otros FAR de la familia.

DRV/r se utiliza en el TAR de inicio en dosis QD (un comprimido de 800 mg/día potenciado con 100 mg de RTV o 150 mg de COBI). El estudio ARTEMIS<sup>35</sup> comparó DRV/r (800/100 mg, QD) frente a LPV/r en 689 pacientes que recibieron además TDF/FTC coformulados. A las 48 semanas DRV/r resultó no-inferior a LPV/r. Los pacientes tratados con DRV/r presentaron menos diarrea de grado 2-4 y menores elevaciones de colesterol y triglicéridos que los tratados con LPV/r. A las 96 semanas, DRV/r resultó superior a LPV/r (en el análisis TLOVR, no en el *snapshot*). Un 4% de los pacientes de la rama de DRV/r y un 9% de los la rama de LPV/r abandonaron el tratamiento asignado. DRV/r se ha comparado también con ATV/r y con RAL (los tres administrados junto a TDF/FTC) en el estudio ACTG5257<sup>36</sup>, que incluyó 1809 pacientes. Tras 96 semanas, los 3 regímenes fueron equivalentes en eficacia virológica (DRV/r 85%, ATV/r 87% y RAL 90%), pero tanto en el análisis conjunto de la respuesta virológica y la tolerabilidad, como en el análisis *snapshot* DRV/r fue inferior a RAL y superior a ATV/r (DRV/r 73%, ATV/r 63%, RAL



89%). DRV/r se ha comparado con DTG en un ensayo clínico de TAR de inicio (FLAMINGO)<sup>17</sup>, en el que se observó menor eficacia a 48 semanas del DRV/r, hecho motivado fundamentalmente por una mayor tasa de discontinuaciones por causas no relacionadas con el fármaco y efectos adversos.

ATV/r, se ha comparado también con LPV/r y con EVG/COBI en el TAR de inicio. El estudio CASTLE<sup>34</sup> comparó la combinación TDF/FTC+ATV/r QD con la combinación TDF/FTC + LPV/r BID, demostrando la no-inferioridad de ATV/r frente a LPV/r a 48 y a 96 semanas. ATV/r mostró mejor perfil lipídico (colesterol total, triglicéridos y colesterol no-HDL). La ictericia e hiperbilirrubinemia fueron más frecuentes en el grupo de ATV/r mientras que la diarrea y las náuseas lo fueron en el grupo de LPV/r. No hubo diferencias significativas en abandonos entre los dos brazos de tratamiento. El estudio GS-US-236-0103<sup>37</sup>, un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego, comparó EVG/COBI/FTC/TDF (coformulados en un solo comprimido) y ATV/r+FTC/TDF, confirmando la no-inferioridad de EVG/COBI/FTC/TDF frente a ATV/r+FTC/TDF. En el grupo de EVG/COBI/FTC/TDF se efectuó genotipificación del VIH tras el fracaso virológico en 12 pacientes, en cinco de los cuales se objetivaron mutaciones, que conferirían resistencia a los INI en cuatro de ellos (Q148R en 2, N155H en 2, T66I en 1 y E92Q en 1). En el grupo de ATV/r+FTC/TDF se realizó un estudio genotípico del VIH en 8 pacientes con fracaso virológico, en ninguno de los cuales se detectaron mutaciones de resistencia. Ambos regímenes se toleraron bien y las interrupciones del tratamiento por efectos adversos fueron escasas en ambos brazos.

La utilización de COBI como potenciador de los IP se valoró en el estudio 114<sup>38</sup> en el que se comparó de forma ciega COBI frente a RTV como potenciador de ATV + TDF/FTC, en 692 pacientes sin TAR previo y con un FGe igual o superior a 70 mL/min. Se demostró la no-inferioridad del tratamiento potenciado con COBI, aunque el estudio no fue capaz de demostrar ventajas significativas de tolerabilidad con el nuevo potenciador. COBI ha sido aprobado por la EMA como potenciador de ATV o DRV a dosis de 150 mg/día.

En tratamientos dobles con un IP/r junto a otro fármaco en el tratamiento de inicio (biterapia), los mejores resultados hasta este momento se han publicado con la combinación LPV/r + 3TC, que ha demostrado la no-inferioridad frente a LPV/r + 2 ITIAN<sup>39</sup> independientemente de la CVP, por lo que podría considerarse una alternativa a la triple terapia convencional cuando no se pueda utilizar TDF ni ABC. La combinación LPV/r + RAL ha demostrado la no-inferioridad sobre LPV/r + TDF/FTC<sup>40</sup>, pero los pacientes incluidos en el estudio tenían CVP muy bajas y no es posible generalizar sus resultados. DRV/r+RAL también ha demostrado la no-inferioridad con respecto a la triple terapia (DRV/r + TDF/FTC)<sup>41</sup> en un estudio independiente con 805 pacientes, pero en el subgrupo de pacientes con cifras de linfocitos CD4+ inferiores a 200 células/ $\mu$ L la doble terapia presentó menor eficacia que la triple terapia convencional.

### Recomendaciones

- Los regímenes basados en IP recomendados son DRV/r (o DRV/COBI) QD + TDF/FTC y ATV/r (o ATV/COBI) QD + TDF/FTC **(A-I)**. La combinación de ATV/r (o ATV/COBI) + ABC/3TC también se recomienda, pero se debe evitar en pacientes con CVP superior a 100.000 copias/mL **(A-I)**
- Otras pautas con IP incluyen LPV/r, BID o QD, + TDF/FTC o ABC/3TC **(B-I)**. Es posible utilizar también la combinación DRV/r (o DRV/COBI) + ABC/3TC, aunque no ha sido formalmente investigada en ningún ensayo clínico **(B-III)**
- ATV y DRV pueden ser potenciados indistintamente con 100 mg de RTV o 150 mg de COBI **(B-II)**
- LPV/r + 3TC, LPV/r + RAL y DRV/r + RAL pueden ser una alternativa a la triple terapia convencional cuando no se pueda utilizar TDF ni ABC **(B-I)**. Las pautas dobles sin ITIAN (DRV/r

o LPV/r + RAL) no deben utilizarse como tratamiento de inicio en pacientes en fase avanzada (cifra de linfocitos CD4+ inferior a 200 células/ $\mu$ L y/o CVP superior a 100.000 copias/mL) **(A-I)**

### 3.2.4. Inhibidores de la integrasa

Los INI aprobados por la EMA para el TAR de inicio son: RAL, EVG y DTG.

RAL fue el primer INI comercializado y con el que se tiene la mayor experiencia. Se utiliza en una pauta administrada dos veces al día (400 mg BID), puesto que la administración de los dos comprimidos juntos una única vez al día demostró una menor eficacia en un ensayo clínico de pacientes sin TAR previo<sup>42</sup>. Combinado con TDF/FTC, RAL BID ha demostrado ser superior a DRV/r<sup>36</sup> y a ATV/r<sup>36</sup>, y no-inferior a EFV, alcanzando eficacia superior al cuarto y quinto año de seguimiento<sup>28</sup>. EVG requiere potenciación farmacológica. Se ha comercializado coformulado con COBI (que hace la función de potenciador) +TDF/FTC en un solo comprimido. EVG/COBI/TDF/FTC ha demostrado la no-inferioridad con respecto a EFV/TDF/FTC<sup>29</sup> y a ATV/r + TDF/FTC<sup>37</sup> (véanse los apartados de ITINN e IP) en estudios con una duración de tres años. Esta combinación está contraindicada en pacientes con un FGe inferior a 70 mL/min y debe utilizarse con precaución en aquellos con un FGe entre 70 y 90 mL/min.

DTG se administra como un comprimido de 50 mg una vez al día (en algunas circunstancias se debe administrar dos veces al día) y no necesita potenciación. Se ha comparado en estudios en fase III con FAR de las tres familias que en algún momento han sido recomendados en el TAR de inicio, mostrando una eficacia superior a EFV<sup>15,30</sup> y a DRV/r<sup>17</sup> (véanse los apartados de ITINN e IP). La comparación con RAL se realizó en un estudio doble ciego (SPRING-2), que confirmó la no-inferioridad de DTG. Cabe destacar que no se ha seleccionado ninguna mutación de resistencia a DTG en ninguno de los tres ensayos clínicos en fase III de inicio de TAR, lo que hace pensar que DTG presenta una barrera genética superior a la de otros INI, aunque se deberá confirmar cuando se disponga de mayor experiencia y seguimiento.

### Recomendaciones

- DTG combinado con TDF/FTC (A-I) o ABC/3TC **(A-I)** o RAL combinado con TDF/FTC se consideran pautas preferentes como tratamiento de inicio.
- La combinación EVG/COBI/TDF/FTC pueden utilizarse como TAR de inicio, pero no debe usarse en pacientes con FGe menor de 70 mL/min) **(A-I)**
- La combinación de RAL con ABC/3TC se considera una alternativa en el tratamiento de inicio, dispone de menor evidencia **(A-I)**

### Referencias bibliográficas

1. Emery S, Neuhaus JA, Phillips AN, Babiker A, Cohen CJ, Gatell JM, et al. Major clinical outcomes in antiretroviral therapy (ART)-naïve participants and in those not receiving ART at baseline in the SMART study. *J Infect Dis* 2008;197:1133-44.
2. Severe P, Juste MA, Ambroise A, Eliacin L, Marchand C, Apollon S, et al. Early versus standard antiretroviral therapy for HIV-infected adults in Haiti. *N Engl J Med* 2010;363:257-65.
3. Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, Gamble T, Hosseinipour MC, Kumarasamy N, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. *N Engl J Med* 2011;365:493-505.
4. Sterne JA, May M, Costagliola D, de Wolf F, Phillips AN, Harris R, et al. Timing of initiation of antiretroviral therapy in AIDS-free HIV-1-infected patients: a collaborative analysis of 18 HIV cohort studies. *Lancet* 2009;373:1352-63.
5. Cain LE, Logan R, Robins JM, Sterne JA, Sabin C, Bansi L, et al. When to initiate combined antiretroviral therapy to reduce mortality and AIDS-defining illness in HIV-infected persons in developed countries: an observational study. *Ann Intern Med* 2011;154:509-15.
6. CASCADE collaboration. Determinants of survival following HIV-1 seroconversion after the introduction of HAART. *Lancet* 2003;362:1267-74.



7. Kitahata MM, Gange SJ, Abraham AG, Merriman B, Saag MS, Justice AC, et al. Effect of early versus deferred antiretroviral therapy for HIV on survival. *N Engl J Med* 2009;360:1815-26.
8. Montaner JS, Lima VD, Barrios R, Yip B, Wood E, Kerr T, et al. Association of highly active antiretroviral therapy coverage, population viral load, and yearly new HIV diagnoses in British Columbia, Canada: a population-based study. *Lancet* 2010;376:532-9.
9. Wood E, Kerr T, Marshall BD, Li K, Zhang R, Hogg RS, et al. Longitudinal community plasma HIV-1 RNA concentrations and incidence of HIV-1 among injecting drug users: prospective cohort study. *BMJ* 2009;338:b1649.
10. Sax PE, Tierney C, Collier AC, Fischl MA, Mollan K, Peeples L, et al. Abacavir-lamivudine versus tenofovir-emtricitabine for initial HIV-1 therapy. *N Engl J Med* 2009;361:2230-40.
11. Sax PE, Tierney C, Collier AC, Daar ES, Mollan K, Budhathoki C, et al. Abacavir/lamivudine versus tenofovir DF/emtricitabine as part of combination regimens for initial treatment of HIV: final results. *J Infect Dis* 2011;204:1191-201.
12. Daar ES, Tierney C, Fischl MA, Sax PE, Mollan K, Budhathoki C, et al. Atazanavir Plus Ritonavir or Efavirenz as Part of a 3-Drug Regimen for Initial Treatment of HIV-1. *Ann Intern Med* 2011;154:445-56.
13. Post FA, Moyle GJ, Stellbrink HJ, Domingo P, Podzamczak D, Fisher M, et al. Randomized comparison of renal effects, efficacy, and safety with once-daily abacavir/lamivudine versus tenofovir/emtricitabine, administered with efavirenz, in antiretroviral-naïve, HIV-1-infected adults: 48-week results from the ASSERT study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010;55:49-57.
14. Smith KY, Patel P, Fine D, Bellos N, Sloan L, Lackey P, et al. Randomized, double-blind, placebo-matched, multicenter trial of abacavir/lamivudine or tenofovir/emtricitabine with lopinavir/ritonavir for initial HIV treatment. *AIDS* 2009;23:1547-56.
15. Walmsley SL, Antela A, Clumeck N, Duiculescu D, Eberhard A, Gutierrez F, et al. Dolutegravir plus abacavir-lamivudine for the treatment of HIV-1 infection. *N Engl J Med* 2013;369:1807-18.
16. Raffi F, Rachlis A, Stellbrink HJ, Hardy WD, Torti C, Orkin C, et al. Once-daily dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection: 48 week results from the randomised, double-blind, non-inferiority SPRING-2 study. *Lancet* 2013;381:735-43.
17. Clotet B, Feinberg J, van Lunzen J, Khuong-Josses MA, Antinori A, Dumitru I, et al. Once-daily dolutegravir versus darunavir plus ritonavir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection (FLAMINGO): 48 week results from the randomised open-label phase 3b study. *Lancet* 2014;383:2222-31.
18. Cruciani M, Mengoli C, Malena M, Parisi S, Bosco O, Moyle G. Comparative virologic efficacy of Abacavir/Lamivudine (ABC/3TC) and Tenofovir/Emtricitabine (TDF/FTC): systematic review and metaregression of randomized clinical trials. 14th European AIDS Conference, 16-19 October 2013, Brussels Abstract PE7/2.
19. Mollan KR, Smurzynski M, Eron JJ, Daar ES, Campbell TB, Sax PE, et al. Association between efavirenz as initial therapy for HIV-1 infection and increased risk for suicidal ideation or attempted or completed suicide: An analysis of trial data. *Ann Intern Med* 2014;161:1-10.
20. Molina JM, Cahn P, Grinsztejn B, Lazzarin A, Mills A, Saag M, et al. Rilpivirine versus efavirenz with tenofovir and emtricitabine in treatment-naïve adults infected with HIV-1 (ECHO): a phase 3 randomised double-blind active-controlled trial. *Lancet* 2011;378:238-46.
21. Cohen CJ, Andrade-Villanueva J, Clotet B, Fourie J, Johnson MA, Ruxrungtham K, et al. Rilpivirine versus efavirenz with two background nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors in treatment-naïve adults infected with HIV-1 (THRIVE): a phase 3, randomised, non-inferiority trial. *Lancet* 2011;378:229-37.
22. Nelson MR, Elion RA, Cohen CJ, Mills A, Hodder SL, Segal-Maurer S, et al. Rilpivirine versus efavirenz in HIV-1-infected subjects receiving emtricitabine/tenofovir DF: pooled 96-week data from ECHO and THRIVE Studies. *HIV Clin Trials* 2013;14:81-91.
23. Cohen C, Wohl D, Arribas JR, Henry K, Van Lunzen J, Bloch M, et al. Week 48 results from a randomized clinical trial of rilpivirine/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate vs. efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate in treatment-naïve HIV-1-infected adults. *AIDS* 2014;28:989-97.
24. van Leth F, Phanuphak P, Stroes E, Gazzard B, Cahn P, Raffi F, et al. Nevirapine and efavirenz elicit different changes in lipid profiles in antiretroviral-therapy-naïve patients infected with HIV-1. *PLoS Med* 2004;1:e19.
25. Riddler SA, Haubrich R, DiRienzo AG, Peeples L, Powderly WG, Klingman KL, et al. Class-sparing regimens for initial treatment of HIV-1 infection. *N Engl J Med* 2008;358:2095-106.
26. Montaner JS, Schutz M, Schwartz R, Jayaweera DT, Burnside AF, Walmsley S, et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of once-daily saquinavir soft-gelatin capsule/ritonavir in antiretroviral-naïve, HIV-infected patients. *MedGenMed* 2006;8:36.
27. Bartlett JA, Johnson J, Herrera G, Sosa N, Rodriguez A, Liao Q, et al. Long-term results of initial therapy with abacavir and Lamivudine combined with Efavirenz, Amprenavir/Ritonavir, or Stavudine. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006;43:284-92.
28. Rockstroh JK, DeJesus E, Lennox JL, Yazdanpanah Y, Saag MS, Wan H, et al. Durable efficacy and safety of raltegravir versus efavirenz when combined with tenofovir/emtricitabine in treatment-naïve HIV-1-infected patients: final 5-year results from STARTMRK. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2013;63:77-85.

29. Wohl DA, Cohen C, Gallant JE, Mills A, Sax PE, DeJesus E, et al. A randomized, double-blind comparison of single-tablet regimen elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir DF versus single-tablet regimen efavirenz/emtricitabine/tenofovir DF for initial treatment of HIV-1 infection: analysis of week 144 results. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2014;65:e118-20.
30. Pappa K, Baumgarten A, Felizarta F, Florence E, Portilla J, Walmsley S, et al. Abacavir/lamivudine is superior to efavirenz/tenofovir/emtricitabine in treatment-naïve HIV subjects: 144-week results-SINGLE (ING114467). 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC). Washington DC, USA.
31. Soriano V, Arasteh K, Migrone H, Lutz T, Opravil M, Andrade-Villanueva J, et al. Nevirapine versus atazanavir/ritonavir, each combined with tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine, in antiretroviral-naïve HIV-1 patients: the ARTEN Trial. *Antivir Ther* 2011;16:339-48.
32. Eron J, Jr., Yeni P, Gathe J, Jr., Estrada V, DeJesus E, Staszewski S, et al. The KLEAN study of fosamprenavir-ritonavir versus lopinavir-ritonavir, each in combination with abacavir-lamivudine, for initial treatment of HIV infection over 48 weeks: a randomised non-inferiority trial. *Lancet* 2006;368:476-82.
33. Walmsley S, Avihingsanon A, Slim J, Ward DJ, Ruxrungtham K, Brunetta J, et al. Gemini: a noninferiority study of saquinavir/ritonavir versus lopinavir/ritonavir as initial HIV-1 therapy in adults. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009;50:367-74.
34. Molina J-M, Andrade-Villanueva J, Echevarria J, Chetchotisakd P, Corral J, David N, et al. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naïve HIV-1-infected patients: 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study. *Lancet* 2008;372:646-55.
35. Orkin C, DeJesus E, Khanlou H, Stoeckl A, Supparatpinoy K, Lathouwers E, et al. Final 192-week efficacy and safety of once-daily darunavir/ritonavir compared with lopinavir/ritonavir in HIV-1-infected treatment-naïve patients in the ARTEMIS trial. *HIV Med* 2013;14:49-59.
36. Lennox JL, Landovitz RJ, Ribaldo HJ, Ofotokun I, Na LH, Godfrey C, et al. Efficacy and tolerability of 3 nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-sparing antiretroviral regimens for treatment-naïve volunteers infected with HIV-1: A randomized, controlled equivalence trial. *Ann Intern Med* 2014;161:461-71.
37. Clumeck N, Molina JM, Henry K, Gathe J, Rockstroh JK, DeJesus E, et al. A randomized, double-blind comparison of single-tablet regimen elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir DF vs ritonavir-boosted atazanavir plus emtricitabine/tenofovir DF for initial treatment of HIV-1 infection: analysis of week 144 results. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2014;65:e121-4.
38. Gallant JE, Koenig E, Andrade-Villanueva J, Chetchotisakd P, DeJesus E, Antunes F, et al. Cobicistat versus ritonavir as a pharmacoenhancer of atazanavir plus emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate in treatment-naïve HIV type 1-infected patients: week 48 results. *J Infect Dis* 2013;208:32-9.
39. Cahn P, Andrade-Villanueva J, Arribas JR, Gatell JM, Lama JR, Norton M, et al. Dual therapy with lopinavir and ritonavir plus lamivudine versus triple therapy with lopinavir and ritonavir plus two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in antiretroviral-therapy-naïve adults with HIV-1 infection: 48 week results of the randomised, open label, non-inferiority GARDEL trial. *Lancet Infect Dis* 2014;14:572-80.
40. Reynes J, Trinh R, Pulido F, Soto-Malave R, Gathe J, Qaqish R, et al. Lopinavir/ritonavir combined with raltegravir or tenofovir/emtricitabine in antiretroviral-naïve subjects: 96-week results of the PROGRESS study. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2013;29:256-65.
41. Raffi F, Babiker AG, Richert L, Molina JM, George EC, Antinori A, et al. Ritonavir-boosted darunavir combined with raltegravir or tenofovir-emtricitabine in antiretroviral-naïve adults infected with HIV-1: 96 week results from the NEAT001/ANRS143 randomised non-inferiority trial. *Lancet* 2014;384:1942-51.
42. Eron JJ, Jr., Rockstroh JK, Reynes J, Andrade-Villanueva J, Ramalho-Madruga JV, Bekker LG, et al. Raltegravir once daily or twice daily in previously untreated patients with HIV-1: a randomised, active-controlled, phase 3 non-inferiority trial. *Lancet Infect Dis* 2011;11:907-15.

#### 4. CAMBIO DEL TAR EN PACIENTES CON CARGA VIRAL SUPRIMIDA

En este capítulo se revisan las opciones de cambio de un tratamiento antirretroviral en pacientes que tienen la CVP suprimida

##### Motivos para cambiar un TAR eficaz

Existen muchos motivos para cambiar un TAR eficaz: toxicidad, nuevas comorbilidades, interacciones farmacológicas, disminución del número de pastillas o dosis diarias, requerimientos

dietéticos, embarazo y coste del propio TAR. El cambio puede ser *proactivo* cuando se realiza preventivamente o *reactivo* cuando el régimen actual ha dejado de ser el ideal para el paciente debido a alguno de los motivos reseñados.

### **Definición de carga viral suprimida**

Consideramos que la CVP está suprimida cuando es menor de 50 copias/mL y está confirmada. La mayoría de los ensayos clínicos de cambio de TAR han incluido pacientes que habían mantenido este nivel de supresión virológica durante al menos 6 meses, por lo que sus resultados son aplicables preferiblemente a pacientes con un tiempo de supresión similar. Como norma general cuanto más prolongado sea el período de supresión virológica, es menos probable que el cambio de TAR se asocie a fracaso virológico.

### **Objetivo del cambio del TAR eficaz**

El objetivo es mantener la supresión virológica y optimizar el TAR de acuerdo a las características y los deseos del paciente individual.

### **Circunstancias que obligan a cambiar el TAR eficaz**

El cambio proactivo es obligado cuando evidencias sólidas avalan que el paciente tiene más riesgo de presentar un efecto adverso grave o irrecuperable si se mantiene el TAR actual que si se cambia. Un ejemplo paradigmático es la lipoatrofia causada por análogos timidínicos.

El cambio reactivo es obligado si el efecto adverso va a desaparecer tras el cambio de TAR como por ejemplo los efectos adversos del SNC causados por EFV.

Los efectos adversos que ocasionan el cambio precoz del TAR inicial en un paciente *naïve* son de tal intensidad que el cambio se realiza frecuentemente antes de haberse alcanzado la supresión de la replicación viral. Es obvio que si un paciente tiene carga viral suprimida es porque es capaz de continuar tomando un TAR eficaz. El clínico no debe olvidar que en ocasiones ese nivel de adherencia se consigue gracias al sacrificio del paciente, que es capaz de sobrellevar efectos adversos que pueden ser erróneamente entendidos como inevitables. El médico no debe asumir que un TAR es óptimo para su paciente sólo porque la carga viral está suprimida. Este comité recomienda que en todas las revisiones el clínico pregunte con detalle sobre el esfuerzo que necesita el paciente para adherirse al TAR pautado.

## **4.1. CAMBIO DE ANTIRRETROVIRALES**

### **Consideraciones virológicas**

Tras el cambio del TAR (independientemente de las clases de antirretrovirales implicadas) el mantenimiento de la supresión virológica es la norma en los pacientes sin historia de fracasos virológicos. Cambiar el TAR es más complicado en pacientes con fracasos virológicos previos que pueden haber causado MR ya archivadas. En esta situación el clínico debe diseñar una nueva pauta cuya barrera genética no sea inferior a la previa. Esta precaución es crítica cuando se cambia un TAR que incluye inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir. En esta situación el clínico debe diseñar una pauta que tenga en cuenta una eventual resistencia archivada bien sea confirmada o bien sea sospechada.

### **Recomendación**

- El cambio desde un pauta con dos ITIAN más un IP/r a dos ITIAN más un ITINN, RAL, EVG/COBI o ATV no potenciado con ritonavir solo debe hacerse si se puede garantizar la actividad antiviral de los dos ITIAN y la del tercer fármaco acompañante **(A-I)**. Sin olvidar que el objetivo prioritario es mantener la supresión virológica, el clínico debe realizar una

evaluación minuciosa del perfil de toxicidades, interacciones, restricciones dietéticas y actividad sobre el VHB (si fuera necesario) del nuevo régimen.

### Consideraciones sobre la gradación de la evidencia

Se considera que existen datos suficientes para hacer una recomendación fuerte de cambio de antirretrovirales (Tabla 4) para:

- Cambio proactivo de análogos timidínicos por ABC o TDF. En esta situación hay evidencia de alta calidad que avala que los beneficios del cambio superan ampliamente al riesgo de aparición o empeoramiento de lipoatrofia, si se continúa el tratamiento con análogos timidínicos.
- Cambio reactivo de EFV en pacientes con efectos adversos del SNC.
- Cambio reactivo de IP potenciados con ritonavir si existe diarrea que interfiere con la calidad de vida del paciente
- Cambio reactivo de TDF en pacientes con disminución del filtrado glomerular estimado (FGe) o disfunción tubular no explicable por otras causas. No hay datos para precisar un umbral de FGe o parámetros de tubulopatía a partir del cual el cambio sea obligado. Recomendamos emplear el juicio clínico teniendo en cuenta función renal/tubular antes del inicio de TDF, edad y existencia de otros factores que puedan empeorar la función renal.
- Cambio reactivo de TDF en pacientes con osteoporosis u osteomalacia no explicable por otros motivos. No hay datos para precisar un umbral de densidad mineral ósea a partir del cual el cambio sea obligado. Es preciso descartar múltiples causas secundarias, por ejemplo hipovitaminosis D, antes de atribuir la disminución de la densidad mineral ósea exclusivamente a TDF.

Este panel distingue entre la fuerza de la recomendación para cambiar el TAR o para priorizar una pauta alternativa. Recomendamos que el clínico consulte la Tabla 1 para intentar responder a la pregunta ¿Debo cambiar el TAR? y una vez establecida la necesidad de cambio, las tablas 2 y 3 gradúan la evidencia para recomendar una nueva pauta.

La recomendación para avalar el cambio de TAR puede ser débil pero una vez que el cambio se ha decidido la recomendación sobre la pauta a la que cambiar puede ser fuerte. Un ejemplo apropiado es el cambio desde múltiples pastillas a una pastilla única simplemente con el objetivo de simplificación. Aunque hay evidencia preliminar de que el TAR con pastilla única podría aumentar la adherencia y disminuir las hospitalizaciones<sup>1</sup>, en este momento el comité no considera que exista evidencia definitiva para hacer una recomendación fuerte que respalde este cambio en la mayoría de los pacientes. Sin embargo si el clínico ha decidido que en un paciente la simplificación posológica está indicada, entonces el comité hace una recomendación fuerte sobre las pautas más apropiadas.

## 4.2. CAMBIO ENTRE ANTIRRETROVIRALES DE LA MISMA CLASE (Tabla 5)

### A. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido

#### *Cambio de d4T o AZT por TDF o ABC*

**Fundamento.** Varios ensayos clínicos aleatorizados<sup>2-5</sup> han demostrado que el cambio de d4T o AZT por ABC o TDF, es seguro virológicamente y produce una mejoría subclínica o estabilización de la pérdida de grasa subcutánea. En pacientes cuyo HLA B\*5701 sea negativo no parecen existir diferencias entre ABC y TDF en cuanto al mantenimiento de la supresión virológica.

### Recomendación

- El cambio proactivo de d4T o AZT a TDF o ABC es adecuado para prevenir o tratar de revertir la lipoatrofia asociada al tratamiento con análogos timidínicos **(A-I)**

### Cambio de ABC/3TC a TDF/FTC

**Fundamento.** Tres ensayos clínicos aleatorizados<sup>6-8</sup> han demostrado que el cambio de ABC/3TC a TDF/FTC es seguro virológicamente y produce disminuciones de colesterol total (CT), colesterol LDL (C-LDL) y triglicéridos (TG) sin cambios en el cociente CT/C-HDL. La caída del filtrado glomerular estimado es mayor en los pacientes que cambian a TDF/FTC especialmente si el tercer fármaco es un inhibidor de la proteasa.

### Recomendación

- La asociación de ABC con un incremento en la incidencia de eventos cardiovasculares es muy controvertida. Este comité no puede hacer una recomendación en el momento actual sobre fuerza de la evidencia para realizar un cambio de ABC/3TC a TDF/FTC

### Cambio de TDF a ABC

**Fundamento.** TDF se ha asociado con una disminución de la densidad mineral ósea independiente de la presencia o no de otros factores de riesgo de osteoporosis que es mayor que con ABC<sup>9,10</sup>. En un pequeño ensayo clínico aleatorizado en pacientes con osteopenia u osteoporosis el cambio de TDF a ABC se siguió de un incremento de la densidad mineral ósea en fémur pero no en columna vertebral<sup>11</sup>.

### Recomendación

- El cambio de TDF a ABC es una opción en pacientes con osteopenia u osteoporosis asociada al uso de TDF **(A-II)**

## B. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos

### Cambio de TDF/FTC/EFV a TDF/FTC/RPV

**Fundamento.** Dos ensayos clínicos no aleatorizados<sup>12,13</sup> sugieren que el cambio es virológicamente seguro y puede mejorar la toxicidad persistente del SNC causada por el EFV así como los niveles de lípidos plasmáticos. La larga vida media de EFV y su capacidad de inducción enzimática sobre el CYP3A4 origina una disminución de las concentraciones plasmáticas de RPV que parece no tener trascendencia en pacientes que ya han alcanzado la supresión virológica. No hay datos de que este cambio se pueda realizar en pacientes con replicación de VIH activa.

### Recomendación

- En pacientes con efectos adversos del SNC causados por TDF/FTC/EFV el cambio a TDF/FTC/RPV es una de las opciones que puede mejorar los síntomas neuropsicológicos asociados a EFV **(A-II)**. No hay datos para recomendar un cambio proactivo en pacientes sin síntomas del SNC. No hay datos comparativos de este cambio frente al cambio por otros antirretrovirales que tampoco causan síntomas del SNC.

### Cambio de EFV a ETV

**Fundamento.** El cambio es seguro virológicamente y puede mejorar la toxicidad persistente del SNC causada por EFV<sup>14</sup>. En pacientes estables sin efectos adversos del SNC causados por EFV no hubo cambios apreciables en sintomatología del SNC<sup>15</sup>.

## Recomendación

- En pacientes con efectos adversos del SNC causados por EFV, el cambio a ETV es una opción que puede mejorar los síntomas neuropsicológicos asociados al EFV **(A-II)**  
No hay datos para recomendar un cambio proactivo en pacientes sin síntomas del SNC. No hay datos comparativos de este cambio frente al cambio por otros antirretrovirales que tampoco causan síntomas del SNC

## Cambio de EFV a NVP

**Fundamento.** Un pequeño ensayo clínico aleatorizado y un subanálisis *post-hoc* de un ensayo clínico sugieren que el cambio es virológicamente seguro y puede mejorar la toxicidad persistente del SNC y la elevación de C-LDL causada por EFV. EFV y NVP son inductores del CYP3A4. Debido a su larga vida media y a su efecto inductor enzimático EFV, aunque se discontinúe, podría inducir niveles infraterapéuticos de NVP si ésta se inicia a dosis de 200 mg una vez al día. Cuando se realiza el cambio a NVP puede utilizarse a dosis completa (400 mg al día) sin necesidad de escalada de dosis durante dos semanas<sup>16-18</sup>.

En pacientes con carga viral suprimida no se aplica la limitación de uso de NVP según niveles de CD4 que se emplea en pacientes *naïve*. Múltiples estudios han demostrado que el riesgo de hepatotoxicidad de NVP no parece estar incrementado en pacientes con replicación viral suprimida independientemente de la cifra de células CD4<sup>19-21</sup>.

## Recomendación

- En pacientes con efectos adversos del SNC causados por EFV el cambio a NVP es una opción que puede mejorar los síntomas neuropsicológicos **(A-II)**. No hay datos para recomendar un cambio proactivo en pacientes sin síntomas del SNC. No hay datos comparativos de este cambio frente al cambio por otros antirretrovirales que tampoco causan síntomas del SNC. El cambio también es una opción en pacientes con elevación de C-LDL causada por EFV **(A-II)**

## Cambio de 2 ITIAN más EFV o NVP a TDF/FTC/EFV

**Fundamento.** Un ensayo clínico abierto ha demostrado que en pacientes tratados con dos ITIAN y EFV o NVP el cambio a TDF/FTC/EFV es seguro virológicamente<sup>22</sup>.

## Recomendación

- El cambio a TDF/FTC/EFV es una opción en pacientes que reciben TAR con EFV y NVP y desean disminuir el número de comprimidos diarios **(A-II)**

## C. Inhibidores de la proteasa

### Cambio de ABC/3TC+ATV/r a ABC/3TC+ATV no potenciado

**Fundamento.** Este cambio solo se puede realizar si ABC/3TC es completamente activo. Un ensayo clínico ha demostrado que el cambio es virológicamente seguro y se asocia a una disminución de los niveles de bilirrubina, CT, C-LDL y TG<sup>23</sup>.

## Recomendación

- En pacientes que reciben tratamiento con ABC/3TC+ATV/r el cambio a ABC/3TC+ATV no potenciado es una opción de simplificación para pacientes en quienes no sea deseable continuar con RTV debido a que potencia la toxicidad de ATV (hiperbilirrubinemia), toxicidad (dislipidemia, diarrea) o riesgo de interacciones **(A-I)**

### **Cambio de TDF/FTC+ATV/r a ABC/3TC+ATV no potenciado**

**Fundamento.** Un ensayo clínico aleatorizado ha demostrado que el cambio de TDF/FTC+ATV/r a ABC/3TC+ATV no potenciado es virológicamente seguro y se asocia a disminución de bilirrubina plasmática, mejoría de los biomarcadores de disfunción tubular renal y óseos. Se desconoce la relevancia clínica de los cambios de estos biomarcadores<sup>24</sup>.

#### **Recomendación**

- En pacientes que reciben tratamiento con TDF/FTC+ATV/r el cambio a ABC/3TC+ATV no potenciado es una opción para pacientes en quienes se quiera evitar el uso tanto de TDF como de ritonavir **(A-II)**

### **4.3. CAMBIO A ANTIRRETROVIRALES DE DISTINTA CLASE**

#### **A. De inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido a inhibidores de la integrasa**

##### **Cambio de tenofovir a raltegravir**

**Fundamento.** Un pequeño ensayo clínico de brazo único en pacientes tratados con un IP/r más TDF/FTC y que presentaban disminución de la densidad mineral ósea (T score de al menos -1) ha demostrado que el cambio de TDF a RAL (con o sin FTC) es seguro virológicamente y se asocia a una mejoría significativa de la densidad mineral ósea en fémur y cadera y los marcadores de remodelación ósea<sup>25</sup>.

#### **Recomendación**

- El cambio de TDF a RAL (en pacientes que además reciben un IP/r) es una opción en pacientes con disminución de la densidad mineral ósea **(A-II)**

#### **B. De inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos a inhibidores de la integrasa**

##### **Cambio de efavirenz a raltegravir**

**Fundamento.** En pacientes que toleran EFV un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego ha demostrado que el cambio de EFV a RAL mejora los niveles de lípidos (CT, C-LDL, TG) y en algunos pacientes mejora los *scores* de ansiedad y de stress, manteniendo la supresión virológica<sup>26</sup>.

#### **Recomendación**

- El cambio de EFV a RAL es una opción en pacientes con efectos adversos del SNC causados por EFV **(A-II)**  
No hay datos para recomendar un cambio proactivo en pacientes sin síntomas del SNC. No hay datos comparativos de este cambio frente al cambio por otros antirretrovirales que tampoco causan síntomas del SNC.
- El cambio de EFV a RAL es una opción en pacientes con dislipidemia causada por EFV **(A-I)**

### **Cambio de TDF/FTC + EFV o NVP a TDF/FTC/COBI/EVG**

**Fundamento.** Un ensayo clínico aleatorizado y abierto ha demostrado que el cambio de TDF/FTC más un ITINN (en su amplia mayoría pacientes en su primer TAR fundamentalmente basado en EFV) a TDF/FTC/COBI/EVG es seguro virológicamente. Los pacientes que discontinuaron EFV en este ensayo mejoraron significativamente los resultados en escalas de sueños anormales, insomnio, mareo y ansiedad. Sin embargo, algunos efectos adversos como fatiga, tos, dolor de cabeza y náuseas aparecieron de manera más frecuente en el brazo de TDF/FTC/COBI/EVG<sup>27</sup>.



## **Recomendación**

- El cambio de TDF/FTC+EFV o NVP a TDF/FTC/COB/EVG coformulados es seguro virológicamente. Este cambio es una opción para los pacientes que quieran simplificar su régimen actual y puede mejorar los síntomas del SNC causados por EFV. No hay datos para recomendar un cambio proactivo en pacientes sin síntomas del SNC. No hay datos comparativos de este cambio frente al cambio por otros antirretrovirales que tampoco causan síntomas del SNC **(A-I)**

## **C. Inhibidores de la fusión a inhibidores de la integrasa**

### ***Cambio de ENF a RAL***

**Fundamento.** Un ensayo clínico aleatorizado ha demostrado que el cambio de ENF a RAL es seguro virológicamente y los pacientes pueden evitar la administración parenteral<sup>28</sup>.

## **Recomendación**

- El cambio de ENF a RAL es una opción segura que evita las complicaciones de la administración parenteral de enfuvirtida **(A-I)**

## **D. De inhibidores de la proteasa a inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos**

### ***Cambio de IP/r a TDF/FTC/EFV***

**Fundamento.** Un ensayo clínico abierto ha demostrado que en pacientes tratados con dos ITIAN y un IP/r el cambio a TDF/FTC/EFV es seguro virológicamente y se asocia con una mejoría de TG y C-HDL pero con más efectos adversos del SNC<sup>22</sup>.

## **Recomendación**

- El cambio a TDF/FTC/EFV es una opción en pacientes que reciben TAR con IP/r y desean disminuir el número de pastillas diarias pero es posible que los pacientes experimenten efectos adversos del EFV sobre el SNC **(B-I)**

### ***Cambio de inhibidores de la proteasa a NVP***

**Fundamento.** Múltiples estudios han demostrado que el cambio de inhibidores de la proteasa (mayoritariamente no potenciados con RTV) a NVP es seguro virológicamente, aunque se asocia a una mayor incidencia de efectos adversos hepáticos. No hay datos relevantes para el cambio desde un IP/r<sup>29-31</sup>

## **Recomendación**

- El cambio de un inhibidor de la proteasa a NVP podría ser una opción en pacientes que reciben un IP/r cuando se quieran evitar los efectos adversos de RTV **(B-III)**

### ***Cambio de IP/r a TDF/FTC/RPV***

**Fundamento.** Un ensayo clínico abierto ha demostrado que el cambio desde dos ITIAN más un IP/r a TDF/FTC/RPV coformulados es seguro virológicamente y se asocia a una mejoría en los niveles de CT, C-LDL, cociente CT/C-HDL y TG y a una mejoría en los efectos adversos gastrointestinales causados por los IP/r<sup>32</sup>.

## **Recomendación**

- El cambio de dos ITIAN más un IP/r a TDF/FTC/RPV coformulados es una opción en pacientes con deseos de disminuir el número de pastillas diarias, alteraciones gastrointestinales o dislipidemia **(A-I)**



## **E. De inhibidor de la proteasa potenciado a inhibidores de la integrasa**

### ***Cambio de IP/r a RAL***

**Fundamento.** Tres ensayos clínicos han demostrado que el cambio de IP/r a RAL es seguro virológicamente si los dos ITIAN son completamente activos. El cambio se asocia en una mejoría de los niveles de CT, C-LDL, cociente CT/C-HDL y TG<sup>33,34</sup>. Los resultados del estudio SPIRAL<sup>34</sup> sugieren que si el tiempo de supresión viral es muy prolongado, el riesgo de fracaso virológico es menor independientemente de la actividad de los ITIAN.

### **Recomendación**

- El cambio a dos ITIAN activos más RAL es una opción para pacientes con dislipidemia que reciben TAR con dos ITIAN más un IP/r **(A-I)**

### ***Cambio de TDF/EFC + IP/r a TDF/EFC /COBI/EVG***

**Fundamento.** Un ensayo clínico aleatorizado y abierto con pacientes con carga viral suprimida y sin historia de fracasos virológicos ha demostrado que el cambio de TDF/FTC más un IP/r (fundamentalmente ATV/r, DRV/r o LPV/r) a TDF/FTC/COBI/EVG coformulados es mejor virológicamente. Los pacientes que cambiaron de tratamiento mejoraron significativamente los resultados en escalas de diarrea y plenitud abdominal; sin embargo se reportaron más náuseas. Hubo una ligera mejoría en los niveles lipídicos, fundamentalmente en los pacientes que continuaron LPV/r<sup>35</sup>.

### **Recomendación**

- El cambio de TDF/FTC+ATV/r o DRV/r o LPV/r a TDF/FTC/COBI/EVG es mejor virológicamente. Este cambio es una opción para los pacientes que quieran simplificar su régimen actual y puede mejorar en algunos pacientes los síntomas digestivos asociados a RTV **(A-I)**

## **4. 4. TERAPIA DUAL CON 3TC Y ATV/r O LPV/r**

### ***Cambio de dos ITIAN y ATV/r o LPV/r a 3TC más ATV/r o 3TC más LPV/r***

**Fundamento.** Dos ensayos clínicos aleatorizados y abiertos han demostrado que el cambio de 2 ITIAN + ATV/r a terapia dual con 3TC+ATV/r<sup>36</sup> o de 2 ITIAN y LPV/r a terapia dual con 3TC+LPV/r<sup>37</sup> no es inferior a la triple terapia.

### **Recomendación**

- El cambio de 2 ITIAN + ATV/r o LPV/r a terapia dual con 3TC+ATV/r o 3TC+LPV/r es una opción si el clínico quiere evitar o prevenir los efectos adversos causados por los ITIAN. Esta opción requiere que el paciente cumpla los siguientes criterios: (1) ausencia de hepatitis crónica B, (2) CVP < 50 copias/mL durante al menos 6 meses y (3) ausencia de mutaciones en el gen de la proteasa o fracasos virológicos previos a IP/r o 3TC **(A-I)**

## **4. 5. MONOTERAPIA CON INHIBIDORES DE LA PROTEASA**

**Fundamento.** La monoterapia con DRV/r QD<sup>38</sup> o LPV/r BID<sup>39,40</sup> no ha demostrado a largo plazo la no-inferioridad frente a la terapia triple en los análisis por ITT si se considera el cambio de terapia aleatorizada igual a fracaso. La no inferioridad sí se ha demostrado en los análisis puros por intención de tratar (ignorando los cambios de tratamiento, fundamentalmente las reinducciones con ITIAN). No existe acuerdo sobre cuál de estos análisis es más relevante clínicamente.

En los ensayos clínicos de monoterapia con DRV/r o LPV/r con seguimiento virológico adecuado no se ha demostrado un incremento en el riesgo de selección de MR a la proteasa<sup>40,41</sup>. En pacientes tratados con monoterapia tampoco se ha demostrado un aumento del riesgo de deterioro neurocognitivo asociado al VIH<sup>40,42</sup>, replicación viral discordante en líquido cefalorraquídeo, aumento de los biomarcadores de inflamación<sup>43</sup> o incremento del DNA celular de VIH integrado<sup>44</sup>.

Comparada con la TAR triple, la monoterapia con DRV/r o LPV/r no ha demostrado beneficios a largo plazo aparte del ahorro económico. Sin embargo tampoco hay datos empíricos que justifiquen que si un paciente es capaz de mantener la supresión virológica con DRV/r o LPV/r en monoterapia sea necesario utilizar además dos ITIAN.

Este panel considera que no existe evidencia suficiente para recomendar el cambio proactivo a monoterapia con DRV/r o LPV/r en los pacientes que cumplan los criterios para el uso de esta estrategia. Sin embargo el panel considera que tampoco existen evidencias para oponerse al uso de monoterapia con DRV/r o LPV/r si el clínico quiere evitar o prevenir los efectos adversos causados por los ITIAN. Los factores que predicen éxito de la monoterapia son: alta adherencia, supresión virológica prolongada y profunda<sup>45</sup> y nadir de células CD4 mayor de 100 células/ $\mu$ L<sup>46</sup>.

La monoterapia con ATV/r o la combinación ATV/r y RAL no se recomienda debido a los peores resultados obtenidos en ensayos clínicos<sup>47-49</sup>

### Recomendación

- Este comité considera que la monoterapia con DRV/r QD o con LPV/r BID es una opción si el clínico quiere evitar o prevenir los efectos adversos causados por los ITIAN y el paciente cumple los siguientes criterios: (1) No hay hepatitis crónica B, (2) Carga viral menor de 50 copias/mL durante al menos 6 meses y (3) ausencia de mutaciones en el gen de la proteasa o fracaso virológico previo a IP/r **(B-I)**

### Seguimiento después de un cambio de TAR en pacientes con carga viral suprimida

Tras el cambio de un TAR el clínico debe evaluar en un plazo de 3-6 semanas el mantenimiento de la supresión virológica y las determinaciones de laboratorio pertinentes que dependerán del motivo del cambio (lipidograma, función renal, etc). Una vez demostrada la continuación de la supresión virológica el paciente puede volver a la rutina de visitas cada 4 o 6 meses

### Referencias bibliográficas

1. Sax PE, Meyers JL, Mugavero M, Davis KL. Adherence to antiretroviral treatment and correlation with risk of hospitalization among commercially insured HIV patients in the United States. *PLoS One* 2012;7:e31591.
2. Moyle GJ, Sabin CA, Cartledge J, Johnson M, Wilkins E, Churchill D, et al. A randomized comparative trial of tenofovir DF or abacavir as replacement for a thymidine analogue in persons with lipoatrophy. *AIDS* 2006;20:2043-50.
3. Fisher M, Moyle GJ, Shahmanesh M, Orkin C, Kingston M, Wilkins E, et al. A randomized comparative trial of continued zidovudine/lamivudine or replacement with tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine in efavirenz-treated HIV-1-infected individuals. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009;51:562-8.
4. Martin A, Bloch M, Amin J, Baker D, Cooper DA, Emery S, et al. Simplification of antiretroviral therapy with tenofovir-emtricitabine or abacavir-Lamivudine: a randomized, 96-week trial. *Clin Infect Dis* 2009;49:1591-601.
5. Martinez E, Arranz JA, Podzamczar D, Lonca M, Sanz J, Barragan P, et al. A simplification trial switching from nucleoside reverse transcriptase inhibitors to once-daily fixed-dose abacavir/lamivudine or tenofovir/emtricitabine in HIV-1-infected patients with virological suppression. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009;51:290-7.
6. Moyle G, Orkin C, Fisher M, Dhar J, Anderson J, Ewan J, et al. Switching to Atripla (EFV/FTC/TDF) from Kivexa (ABC/3TC) + efavirenz improves lipid levels towards NCEP recommendations: results of a 24-week randomized study. XVIII International AIDS

Conference, July 18-23, 2010, Vienna, Austria Abstract THPE0133.

7. Campo R, DeJesus E, Bredeek UF, Henry K, Khanlou H, Logue K, et al. SWIFT: prospective 48-week study to evaluate efficacy and safety of switching to emtricitabine/tenofovir from lamivudine/abacavir in virologically suppressed HIV-1 infected patients on a boosted protease inhibitor containing antiretroviral regimen. *Clin Infect Dis* 2013;56:1637-45.

8. Behrens G, Maserati R, Rieger A, Domingo P, Abel F, Wang H, et al. Switching to tenofovir/emtricitabine from abacavir/lamivudine in HIV-infected adults with raised cholesterol: effect on lipid profiles. *Antivir Ther* 2012;17:1011-20.

9. McComsey GA, Kitch D, Daar ES, Tierney C, Jahed NC, Tebas P, et al. Bone mineral density and fractures in antiretroviral-naïve persons randomized to receive abacavir-lamivudine or tenofovir disoproxil fumarate-emtricitabine along with efavirenz or atazanavir-ritonavir: Aids Clinical Trials Group A5224s, a substudy of ACTG A5202. *J Infect Dis* 2011;203:1791-801.

10. Stellbrink HJ, Orkin C, Arribas JR, Compston J, Gerstoft J, Van Wijngaerden E, et al. Comparison of changes in bone density and turnover with abacavir-lamivudine versus tenofovir-emtricitabine in HIV-infected adults: 48-week results from the ASSERT study. *Clin Infect Dis* 2010;51:963-72.

11. Negredo E, Domingo P, Perez-Alvarez N, Gutierrez M, Mateo G, Puig J, et al. Improvement in bone mineral density after switching from tenofovir to abacavir in HIV-1-infected patients with low bone mineral density: two-centre randomized pilot study (OsteoTDF study). *J Antimicrob Chemother* 2014;69:3368-71.

12. Mills A, Cohen C, DeJesus E, Brinson C, Yale K, Ramanathan S, et al. Virologic suppression is maintained in virologically suppressed HIV-1 infected subjects switching from efavirenz/emtricitabine/tenofovir (EFV/FTC/TDF) single-tablet regimen (STR) to emtricitabine/rilpivirine/tenofovir (FTC/RPV/TDF) STR: week-24 results of GS-111. 18th Annual Conference of the British HIV Association (BHIVA), 18-20 April 2012, Birmingham, UK. Abstract P186.

13. Nelson M, Winston A, Waters L, Higgs C, Roche M, Mora-Peris B, et al. Multicentre open-label study of switching from Atripla to Eviplera for possible efavirenz associated CNS toxicity. 53rd ICAAC, September 10-13, 2013, Denver. Abstract H-672b.

14. Waters L, Fisher M, Winston A, Higgs C, Hadley W, Garvey L, et al. A phase IV, double-blind, multicentre, randomized, placebo-controlled, pilot study to assess the feasibility of switching individuals receiving efavirenz with continuing central nervous system adverse events to etravirine. *AIDS* 2011;25:65-71.

15. Nguyen A, Calmy A, Delhumeau C, Mercier IK, Cavassini M, Fayet-Mello A, et al. A randomized crossover study to compare efavirenz and etravirine treatment. *AIDS* 2011;25:57-63.

16. Laureillard D, Prak N, Fernandez M, Ngeth C, Moeung S, Riel V, et al. Efavirenz replacement by

immediate full-dose nevirapine is safe in HIV-1-infected patients in Cambodia. *HIV Med* 2008;9:514-8.

17. Parienti JJ, Peytavin G, Reliquet V, Verdon R, Coquerel A. Pharmacokinetics of the treatment switch from efavirenz to nevirapine. *Clin Infect Dis* 2010;50:1547-8.

18. Winston A, Pozniak A, Smith N, Fletcher C, Mandalia S, Parmar D, et al. Dose escalation or immediate full dose when switching from efavirenz to nevirapine-based highly active antiretroviral therapy in HIV-1-infected individuals? *AIDS* 2004;18:572-4.

19. De Lazzari E, Leon A, Arnaiz JA, Martinez E, Knobel H, Negredo E, et al. Hepatotoxicity of nevirapine in virologically suppressed patients according to gender and CD4 cell counts. *HIV Med* 2008;9:221-6.

20. Wit FW, Kesselring AM, Gras L, Richter C, van der Ende ME, Brinkman K, et al. Discontinuation of nevirapine because of hypersensitivity reactions in patients with prior treatment experience, compared with treatment-naïve patients: the ATHENA cohort study. *Clin Infect Dis* 2008;46:933-40.

21. Kesselring AM, Wit FW, Sabin CA, Lundgren JD, Gill MJ, Gatell JM, et al. Risk factors for treatment-limiting toxicities in patients starting nevirapine-containing antiretroviral therapy. *AIDS* 2009;23:1689-99.

22. DeJesus E, Young B, Morales-Ramirez JO, Sloan L, Ward DJ, Flaherty JF, et al. Simplification of antiretroviral therapy to a single-tablet regimen consisting of efavirenz, emtricitabine, and tenofovir disoproxil fumarate versus unmodified antiretroviral therapy in virologically suppressed HIV-1-infected patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009;51:163-74.

23. Squires KE, Young B, DeJesus E, Bellos N, Murphy D, Zhao HH, et al. Similar efficacy and tolerability of atazanavir compared with atazanavir/ritonavir, each with abacavir/lamivudine after initial suppression with abacavir/lamivudine plus ritonavir-boosted atazanavir in HIV-infected patients. *AIDS* 2010;24:2019-27.

24. Wohl DA, Bhatti L, Small CB, Edelstein H, Zhao HH, Margolis DA, et al. Simplification to abacavir/lamivudine + atazanavir maintains viral suppression and improves bone and renal biomarkers in ASSURE, a randomized, open label, non-inferiority trial. *PLoS One* 2014;9:e96187.

25. Bloch M, Tong WW, Hoy J, Baker D, Lee FJ, Richardson R, et al. Switch from tenofovir to raltegravir increases low bone mineral density and decreases markers of bone turnover over 48 weeks. *HIV Med* 2014;15:373-80.

26. Nguyen A, Calmy A, Delhumeau C, Mercier I, Cavassini M, Mello AF, et al. A randomized cross-over study to compare raltegravir and efavirenz (SWITCH-ER study). *AIDS* 2011;25:1481-7.

27. Pozniak A, Markowitz M, Mills A, Stellbrink H-J, Antela A, Domingo P, et al. Switching to coformulated elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir versus continuation of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor with emtricitabine and tenofovir in virologically suppressed adults with HIV (STRATEGY-NNRTI): 48 week results of a randomised,

- open-label, phase 3b non-inferiority trial. *Lancet Infect Dis* 2014;14:590-9.
28. De Castro N, Braun J, Charreau I, Pialoux G, Cotte L, Katlama C, et al. Switch from enfuvirtide to raltegravir in virologically suppressed multidrug-resistant HIV-1-infected patients: a randomized open-label trial. *Clin Infect Dis* 2009;49:1259-67.
  29. Ena J, Leach A, Nguyen P. Switching from suppressive protease inhibitor-based regimens to nevirapine-based regimens: a meta-analysis of randomized controlled trials. *HIV Med* 2008;9:747-56.
  30. Martinez E, Arnaiz JA, Podzamczar D, Dalmau D, Ribera E, Domingo P, et al. Substitution of nevirapine, efavirenz, or abacavir for protease inhibitors in patients with human immunodeficiency virus infection. *N Engl J Med* 2003;349:1036-46.
  31. Fisac C, Fumero E, Crespo M, Roson B, Ferrer E, Virgili N, et al. Metabolic benefits 24 months after replacing a protease inhibitor with abacavir, efavirenz or nevirapine. *AIDS* 2005;19:917-25.
  32. Palella FJ, Jr., Fisher M, Tebas P, Gazzard B, Ruane P, Van Lunzen J, et al. Simplification to rilpivirine/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate from ritonavir-boosted protease inhibitor antiretroviral therapy in a randomized trial of HIV-1 RNA-suppressed participants. *AIDS* 2014;28:335-44.
  33. Eron JJ, Young B, Cooper DA, Youle M, Dejesus E, Andrade-Villanueva J, et al. Switch to a raltegravir-based regimen versus continuation of a lopinavir-ritonavir-based regimen in stable HIV-infected patients with suppressed viraemia (SWITCHMRK 1 and 2): two multicentre, double-blind, randomised controlled trials. *Lancet* 2010;375:396-407.
  34. Martinez E, Larrousse M, Llibre JM, Gutierrez F, Saumoy M, Antela A, et al. Substitution of raltegravir for ritonavir-boosted protease inhibitors in HIV-infected patients: the SPIRAL study. *AIDS* 2010;24:1697-707.
  35. Arribas JR, Pialoux G, Gathe J, Di Perri G, Reynes J, Tebas P, et al. Simplification to coformulated elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir versus continuation of ritonavir-boosted protease inhibitor with emtricitabine and tenofovir in adults with virologically suppressed HIV (STRATEGY-PI): 48 week results of a randomised, open-label, phase 3b, non-inferiority trial. *Lancet Infect Dis* 2014;14:581-9.
  36. Perez-Molina J, Rubio R, Rivero A, Pascual J, Suárez I, Riera M, et al. Switching to dual therapy atazanavir/ritonavir+lamivudine) vs. standard triple therapy (atazanavir/ritonavir+2 nucleos(t)ides) is safe and effective in virologically suppressed patients: 48-week results of a randomized clinical trial (SALT study). 20th International AIDS Conference, July 20-25, 2014 Melbourne, Australia. Abstract LBPE18.
  37. Gatell J, Arribas J, Girard P, Landman R, Pich J, Mallolas J, et al. Non-inferiority of dual-therapy (DT) with lopinavir/ritonavir (LPV/r) plus lamivudine (3TC) vs triple-therapy (TT) with LPV/r plus two nucleos(t)ides (NRTIs) for maintenance of HIV-1 viral suppression: 48-week results of the OLE study. 20th International AIDS Conference, Melbourne, Australia, July 20-25, 2014. Abstract LBPE17.
  38. Arribas JR, Clumeck N, Nelson M, Hill A, van Delft Y, Moecklinghoff C. The MONET trial: week 144 analysis of the efficacy of darunavir/ritonavir (DRV/r) monotherapy versus DRV/r plus two nucleoside reverse transcriptase inhibitors, for patients with viral load < 50 HIV-1 RNA copies/mL at baseline. *HIV Med* 2012;13:398-405.
  39. Arribas JR, Delgado R, Arranz A, Munoz R, Portilla J, Pasquau J, et al. Lopinavir-ritonavir monotherapy versus lopinavir-ritonavir and 2 nucleosides for maintenance therapy of HIV: 96-week analysis. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009;51:147-52.
  40. Paton N, Stöhr W, Arenas-Pinto A, Dunn D, the PIVOT Trial Group. Randomised controlled trial of a PI monotherapy switch strategy for long-term HIV management (The PIVOT trial). 21th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), March 3- 6, 2014, Boston, MA. Abstract 550.
  41. Pulido F, Arribas J, Hill A, Moecklinghoff C. No evidence for evolution of protease inhibitor resistance from standard genotyping, after three years of treatment with darunavir/ritonavir, with or without nucleoside analogues. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2012;28:1167-9.
  42. Perez-Valero I, Gonzalez-Baeza A, Estebanez M, Monge S, Montes-Ramirez ML, Bayon C, et al. A prospective cohort study of neurocognitive function in aviremic HIV-infected patients treated with 1 or 3 antiretrovirals. *Clin Infect Dis* 2014;59:1627-34.
  43. Arribas J, Hill A, Xi N, van Delft Y, Moecklinghoff C. Interleukin-6 and C-reactive protein levels after 3 years of treatment with darunavir/ritonavir monotherapy or darunavir/ritonavir + two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in the MONET trial. *J Antimicrob Chemother* 2012;67:1804-6.
  44. Geretti AM, Arribas JR, Lathouwers E, Foster GM, Yakob R, Kinloch S, et al. Dynamics of cellular HIV-1 DNA levels over 144 weeks of darunavir/ritonavir monotherapy versus triple therapy in the MONET trial. *HIV Clin Trials* 2013;14:45-50.
  45. Lambert-Niclot S, Flandre P, Valantin MA, Peytavin G, Duvivier C, Haim-Boukobza S, et al. Factors associated with virological failure in HIV-1-infected patients receiving darunavir/ritonavir monotherapy. *J Infect Dis* 2011;204:1211-6.
  46. Pulido F, Perez-Valero I, Delgado R, Arranz A, Pasquau J, Portilla J, et al. Risk factors for loss of virological suppression in patients receiving lopinavir/ritonavir monotherapy for maintenance of HIV suppression. *Antivir Ther* 2009;14:195-201.
  47. Castagna A, Spagnuolo V, Galli L, Vinci C, Nozza S, Carini E, et al. Simplification to atazanavir/ritonavir monotherapy for HIV-1 treated individuals on virological suppression: 48-week efficacy and safety results. *AIDS* 2014;28:2269-79.
  48. Pulido F, Serrano O, Rivero A, Montes M, Rubio R, Loópez Bernaldo de Quiros J, et al. Atazanavir/ritonavir monotherapy for maintenance of

virologic suppression: 48-week primary analysis of the 96-week multicentre, open-label, single-arm, pilot OREY study. 12th European AIDS Conference, November 11-14, 2009, Cologne. Abstract PS4/6.  
49. van Lunzen J, Pozniak A, Gatell J, Antinori A, Klauk I, Serrano O, et al. HARNES study: ritonavir-boosted

atazanavir (ATV/r)+raltegravir (RAL) switch study in virologically suppressed, HIV-1-infected patients. Program and abstracts of the 20th International AIDS Conference Melbourne, Australia, July 20-25, 2014 Abstract LBPE19.

## 5. FRACASO DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

### 5.1. Definiciones

- *Fracaso virológico (FV)*: dos determinaciones consecutivas de CVP >50copias/mL, a las 24 semanas del inicio del TAR. El FV puede ocurrir con o sin selección de mutaciones de resistencia (MR). Si la CVP basal es elevada, puede precisarse más de 24 semanas para alcanzar la CVP<50 copias/mL, particularmente en regímenes sin INI.
- *Repuntes virológicos transitorios (“blips”)*: valores de CVP aislados y transitorios entre 50 y 200 copias/mL. Los “blips” no se asocian a mayor riesgo de FV, aunque algunos autores lo han reportado así como aparición de MR cuando son frecuentes<sup>1</sup>. En presencia de blips se recomienda evaluar la adherencia y la barrera genética del TAR.
- *Fracaso inmunológico*: incapacidad de obtener un recuento adecuado de linfocitos CD4+ a pesar de mantener una CVP <50 copias/mL. No se recomienda modificar el TAR, salvo que incluya fármacos o combinaciones como ZDV o TDF+ddl.

### 5.2. Incidencia y factores determinantes del fracaso virológico

En los estudios de registro de las pautas preferentes del TAR de inicio las tasas de FV a las 48 semanas oscilan entre 4 y 12% (véase capítulo 3). En pacientes que inician TDF/FTC + ITINN o IP/r, la incidencia de FV en estudios de cohortes españoles es del 13%<sup>2</sup>. No existen datos de incidencia o prevalencia de FV en pacientes expuestos a dos o más regímenes de TAR diferentes.

Los factores que influyen en el fracaso terapéutico son a) Dependientes del paciente: adherencia al tratamiento, dificultad de acceso o seguimiento; b) Dependientes del fármaco: errores de dosificación, potencia del TAR en pacientes con CVP alta, concentraciones plasmáticas inadecuadas o interacciones medicamentosas; y c) Dependientes del virus: pre-existencia de MR transmitidas o adquiridas.

### 5.3. Objetivo del tratamiento tras fracaso virológico

El objetivo del nuevo TAR es conseguir de nuevo supresión viral mantenida (<50 copias/mL). Para ello, debe instaurarse un tratamiento con tres, o al menos dos, FAR activos, incluyendo preferentemente al menos un fármaco de una nueva familia. El TAR de rescate no debe retrasarse para evitar el acúmulo de MR y la elevación de la CVP.

### 5.4. Estrategias para mejorar el éxito de los tratamientos de rescate

*Facilitar la adherencia y tolerabilidad al TAR.* Identificar causas de mala adherencia e intentar corregirlas; pautar un TAR cómodo, bien tolerado, de escasa toxicidad y valorando las posibles co-morbilidades del paciente.

*Pruebas de resistencia.* Los test de resistencia mejoran la eficacia del TAR de rescate<sup>3</sup>, especialmente cuando la prueba se realiza mientras el paciente recibe el TAR que ha fracasado. Cuando se dispone de estudios genotípicos previos, deben valorarse todas las MR acumuladas en los sucesivos FV. Para algunos IP/r y ETR se ha elaborado un índice ponderado de resistencia genotípica que cuantifica el peso de cada MR y establece un índice de respuesta al fármaco<sup>4</sup>. Los test ultrasensibles de secuenciación genotípica detectan poblaciones virales resistentes minoritarias y en algunos casos podrían mejorar el resultado del TAR de rescate<sup>5</sup>.

La ausencia de MR durante un FV orienta a falta de adherencia, o realización inadecuada del test genotípico (>4 semanas sin TAR).

*Tropismo viral.* Debe determinarse en cada FV, excepto si se sabe que existen cepas no-R5.

*Revisar historial terapéutico.* Identificar FAR que no se toleraron o tratamientos que fracasaron con fármacos de barrera genética baja que hubieran podido seleccionar MR no detectadas en el test genotípico.

*Monitorización concentraciones plasmáticas de fármacos.* No ha demostrado que esta monitorización mejore la eficacia del TAR de rescate. Debe reservarse para situaciones especiales, incluyendo sospecha de mala adherencia.

## 5.5. Escenarios clínicos de fracaso virológico

### Fracaso virológico con viremias bajas

Bajo este epígrafe se consideran 2 situaciones:

CVP de 50-200 copias/mL. En esta situación la CVP puede volver a quedar indetectable o mantenerse en niveles bajos sin necesidad de cambiar el TAR. Los test que utilizan técnicas de PCR en tiempo real (TaqMan® o Abbott RealTime®) presentan mayor sensibilidad para detectar viremias bajas (50-250 copias/mL)<sup>6,7</sup>. Si la CVP se mantiene entre 50-200 copias, la probabilidad de amplificar el ARN viral y detectar MR es muy baja<sup>8</sup>. Los pacientes suelen mantener recuentos de linfocitos CD4+ estables y no presentan progresión clínica. Algunos estudios han demostrado selección de nuevas MR<sup>9</sup>, fracaso virológico<sup>10</sup> y asociación a traslocación bacteriana e inflamación sistémica<sup>11</sup>. En general, no se recomienda modificar el TAR, aunque el régimen debe ser de alta barrera genética.

CVP: 200-1000 copias/mL. Este grado de viremia se asocia a selección de MR frente a ITIAN, ITINN e INI<sup>7</sup>. Debe realizarse un test de resistencias que son factibles a partir de CVP >200 copias/mL. Si el historial terapéutico o el test genotípico permiten administrar un TAR potencialmente eficaz, debe considerarse cambiar el tratamiento.

En ambas situaciones está contraindicada la intensificación terapéutica añadiendo un solo fármaco activo. Debe valorarse la potencia del TAR, la adherencia, errores de prescripción, y posibles interacciones medicamentosas o alimentarias.

### Fracaso virológico precoz

Se habla de fracaso virológico precoz cuando fracasa la primera línea de TAR. La selección de MR y las pautas de segunda línea difieren dependiendo de la pauta de inicio utilizada.

*Fracaso virológico a 2 ITIAN+ITINN.* Las MR seleccionadas con mayor frecuencia tras FV con EFV o NVP son K103N, L100I o Y181C. La K103N aislada mantiene sensibilidad a RPV y ETR. El FV con RPV selecciona la E138K, Y181C que generan resistencia a todos los ITINN. El FV a ITINN puede acompañarse de MR a ITIAN, especialmente M184V y con menor frecuencia K65R.

*Fracaso virológico a 2 ITIAN+IP/r.* La probabilidad de seleccionar MR a IP es muy baja. Los IP/r protegen de la selección de MR a ITIAN, siendo infrecuentes y limitándose sólo a M184V.

*Fracaso virológico a 2 ITIAN+INI.* El FV a RAL o EVG selecciona MR cruzadas entre ambos fármacos: T66K, E92Q, Q148H/K/R y N155H y con frecuencia se acompañan de MR a ITIAN. Los ensayos clínicos en pacientes *naïve* han demostrado que DTG es un INI de barrera genética alta, siendo excepcional detectar MR en el gen de la integrasa o de la transcriptasa inversa tras un FV con DTG.

Existen pocos EC aleatorizados que evalúen la eficacia de diferentes combinaciones de FAR en pacientes con FV a alguno de los TAR de primera línea (Tabla7). En general, se recomienda la utilización de un IP/r con dos fármacos, preferentemente ITIAN, que conserven actividad anti-viral.

DRV/r es el IP/r de elección en cualquiera de las líneas de rescate analizadas. El estudio ODIN<sup>12</sup>, demostró que DRV/r QD (800/100) + 2 ITIAN era no inferior a DRV/r (600/100) BID, en pacientes con FV y sin MR a DRV. El estudio TITAN<sup>13</sup> demostró que en pacientes con exposición limitada a FAR (experiencia previa a ITIAN, ITINN e IP) pero *naïve* a LPV/r, DRV/r 600/100 BID era superior a LPV/r, ambos con TO.

En pacientes que fracasan a un primer TAR basado en ITINN (NVP, EFV), LPV/r + TDF/FTC es claramente superior a LPV/r en monoterapia (estudio HIV STAR)<sup>14</sup>. En el mismo escenario, una pauta de biterapia (LPV/r + RAL) resulta no inferior a LPV/r + 2 o 3 ITIAN (estudio SECOND-LINE)<sup>15</sup>. Esta pauta puede ser una opción en pacientes que no pueden recibir TDF o ABC.

### Fracaso virológico avanzado

En este escenario, la mayoría de los enfermos han experimentado FV con las tres familias de FAR más utilizadas: ITIAN, ITINN e IP y pueden detectarse MR a las tres familias.

Varios ensayos clínicos han evaluado diferentes pautas de tratamientos de rescate (Tabla 7). Estos estudios no son comparables entre sí por la heterogeneidad de la población, tratamientos previos, criterios de eficacia, tiempo de seguimiento y TO utilizada. Tanto ENF, como TPV/r, DRV/r, ETR, MVC y RAL han demostrado superioridad frente a placebo en combinación con la TO disponible cuando se realizaron los estudios.

DRV/r es superior a otros IP/r en este escenario (estudios POWER<sup>16</sup>, TITAN<sup>13</sup>). Cuando existe alguna mutación mayor de resistencia a DRV, pero el virus es sensible al fármaco, se recomienda utilizar DRV/r 600/100 mg BID; en ausencia de MR es suficiente DRV/r 800/100mg QD<sup>17</sup>. La combinación DRV/r + ETR + TO es significativamente superior a DRV/r + TO en pacientes con  $\geq 1$  mutación a ITINN y  $\geq 3$  mutaciones a IP (estudios DUET)<sup>18</sup>.

En cualquier línea de rescate, añadir un FAR de una nueva familia aumenta de forma significativa la eficacia del TAR. Así en pacientes con CVP  $>5.000$  copias/mL, tropismo R5 y resistencia a FAR de tres familias (ITIAN, ITINN e IP), MVC en pauta BID o QD + 1IP/r + TO mejoró la eficacia del TAR (estudios MOTIVATE)<sup>19</sup>. RAL + TO en pacientes con CVP  $>1.000$  copias/mL, con MR al menos a un FAR de cada una de las tres familias, aumentó significativamente la proporción de pacientes que alcanzaron CVP  $<50$  copias/mL a las 48 semanas (estudio BENCHMRK)<sup>20</sup>. El estudio TRIO<sup>21</sup>, abierto y no comparativo, evaluó la eficacia y seguridad de un TAR que contenía DRV/r + ETR + RAL. Incluyó pacientes con CVP  $>1.000$  copias/mL e infección por VIH-1 multirresistente. En la semana 48, 89 pacientes (86%; IC 95%, 80 a 93%) lograron una CVP  $<50$  copias/mL. EVG se comparó con RAL ambos con TO (IP/r + 1FAR activo) en pacientes con CVP  $>1000$  copias/mL y experiencia o resistencia a  $\geq 2$  familias de FAR. EVG resultó no inferior a RAL en la semana 48 (estudio GS-US-183-0145)<sup>22</sup>.

DTG 50mg QD resulta superior a RAL, ambos con TO, en pacientes *naïve* a INI, con CVP  $>1000$



copias/mL y resistencia a  $\geq 2$  familias de FAR (estudio SAILING)<sup>23</sup>. El estudio VIKING<sup>24</sup> analizó la eficacia de DTG 50 mg QD (cohorte I) y 50 mg BID (cohorte II) en 51 pacientes con resistencia previa a RAL. En la semana 24, el 41% de los pacientes de la cohorte I tenían CVP <50 copias/mL y el 75% en la cohorte II. El estudio VIKING-3<sup>25</sup>, un ensayo clínico abierto y no aleatorizado, analizó la eficacia de DTG 50 mg BID en 183 pacientes con fracaso previo a RAL o EVG. El 69% de los pacientes consiguieron una CVP <50 copias/mL en la semana 24. La presencia de la mutación Q148H/R en el gen de la integrasa más otras adicionales, se relacionaron con menor eficacia de DTG.

TPV y ENF presentan elevada toxicidad y solo se aconsejan cuando no es posible confeccionar un tratamiento óptimo con otros FAR activos.

### Fracaso virológico en pacientes sin opciones terapéuticas

En este escenario resulta imposible diseñar un TAR con al menos dos FAR plenamente activos. El FV en el paciente multitratado no siempre conduce de forma rápida a inmunodeficiencia y progresión clínica. La mayoría de pacientes continúan con recuentos de CD4+ relativamente estables, especialmente si continúan con TAR y la CVP se mantiene entre 10.000-20.000 copias/mL. En esta situación se recomienda:

- a) remitir al paciente a un centro especializado con experiencia y acceso a nuevos FAR mediante ensayos o accesos expandidos;
- b) mantener un TAR no supresor que sea cómodo, poco tóxico, que disminuya la capacidad replicativa viral y no acumule mutaciones que comprometan la respuesta a futuros fármacos; se recomienda el uso de 2 o 3 ITIAN, que incluyan 3TC o FTC, y simultáneamente AZT o TDF; 3TC y FTC inducen la mutación M184V que compromete la capacidad replicativa del VIH-1 y puede resultar útil en esta situación<sup>26</sup>. En cuanto sea posible este tratamiento debe cambiarse a un TAR supresor con 2-3 FAR activos; y
- c) No debe interrumpirse el TAR ya que el descenso de CD4+ es mayor que si se continúa con un TAR no supresor.

### Recomendaciones

- El objetivo del TAR de rescate es conseguir una CVP <50 copias/mL **(A-II)**
- El cambio del TAR por FV debe efectuarse precozmente para evitar la acumulación de mutaciones y facilitar la respuesta al nuevo tratamiento **(A-III)**
- El nuevo TAR debe contener tres FAR totalmente activos y al menos uno de una nueva familia. Si no es posible, se recomienda la combinación de dos FAR plenamente activos y otros que conserven actividad virológica parcial **(A-I)**
- Se debe realizar estudio de resistencias y de tropismo viral para confeccionar el mejor régimen alternativo. La prueba debe realizarse mientras el paciente está recibiendo el tratamiento que ha fallado o lo antes posible tras la suspensión. Si se dispone de pruebas genotípicas previas, deben valorarse todas las MR detectadas **(A-I)**
- Deben analizarse las causas que motivaron el fracaso: adherencia, interacciones medicamentosas o alimentarias, historia farmacológica y toxicidades previas. El nuevo TAR debe ser lo más cómodo y bien tolerado posible **(A-III)**
- En pacientes con FV, DRV/r es el IP/r que ha demostrado mayor eficacia en todas las líneas de rescate. En presencia de MR mayores a DRV se recomienda dosis de 600/100mg BID **(A-I)**



- DTG es el INI de elección en pacientes con FV y *naive* a INI (**A-I**). Si ha habido fracaso previo a RAL o EVG, la dosis de DTG debe ser 50mg BID acompañado de TO (**A-II**)
- El uso de TPV/r, ENF o análogos de la timidina queda restringido a pacientes sin otras posibilidades terapéuticas (**A-III**)
- En general no se recomienda modificar el TAR en pacientes con FV de bajo grado (50-200 copias) y que reciben un TAR de alta barrera genética. En pacientes con viremias superiores (>200 copias/mL) se recomienda realizar un test genotípico en un laboratorio de referencia y pautar un nuevo régimen de TAR en base a las MR o al historial terapéutico del paciente. No se recomienda la intensificación del TAR con un solo fármaco (**A-III**)
- No se recomienda suspender el TAR en pacientes con FV avanzado y sin opciones terapéuticas. En esta situación se recomienda usar fármacos que disminuyan la capacidad replicativa viral y que no seleccionen nuevas MR que comprometan futuros tratamientos (**A-III**).
- En pacientes sin posibilidades terapéuticas se recomienda vigilar la evolución del recuento de linfocitos CD4 y CVP, y consultar con clínicos y virólogos con experiencia en resistencias, tratamientos de rescate y con acceso a fármacos de uso restringido (**B-III**)

## Referencias bibliográficas

1. Lee PK, Kieffer TL, Siliciano RF, Nettles RE. HIV-1 viral load blips are of limited clinical significance. *J Antimicrob Chemother* 2006;57:803-5.
2. Jarrin I, Hernandez-Novoa B, Alejos B, Riera M, Navarro G, Bernardino JI, et al. Persistence of novel first-line antiretroviral regimens in a cohort of HIV-positive subjects, CoRIS 2008-2010. *Antivir Ther* 2013;18:161-70.
3. Palella FJ, Jr., Armon C, Buchacz K, Cole SR, Chmiel JS, Novak RM, et al. The association of HIV susceptibility testing with survival among HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy: a cohort study. *Ann Intern Med* 2009;151:73-84.
4. Rhee SY, Fessel WJ, Liu TF, Marlowe NM, Rowland CM, Rode RA, et al. Predictive value of HIV-1 genotypic resistance test interpretation algorithms. *J Infect Dis* 2009;200:453-63.
5. Pou C, Noguera-Julian M, Perez-Alvarez S, Garcia F, Delgado R, Dalmau D, et al. Improved prediction of salvage antiretroviral therapy outcomes using ultrasensitive HIV-1 drug resistance testing. *Clin Infect Dis* 2014;59:578-88.
6. Brumme CJ, Swenson LC, Wynhoven B, Yip B, Skinner S, Lima VD, et al. Technical and regulatory shortcomings of the TaqMan version 1 HIV viral load assay. *PLoS One* 2012;7:e43882.
7. Ryscavage P, Kelly S, Li JZ, Harrigan PR, Taiwo B. Significance and clinical management of persistent low-level viremia and very-low-level viremia in HIV-1-infected patients. *Antimicrob Agents Chemother* 2014;58:3585-98.
8. Parra-Ruiz J, Alvarez M, Chueca N, Pena A, Pasquau J, Lopez-Ruz MA, et al. Resistencias genotípicas en pacientes con VIH-1 y grados de viremia persistentemente bajos. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2009;27:75-80.
9. Taiwo B, Gallien S, Aga E, Ribaudo H, Haubrich R, Kuritzkes DR, et al. Antiretroviral drug resistance in HIV-1-infected patients experiencing persistent low-level viremia during first-line therapy. *J Infect Dis* 2011;204:515-20.
10. Laprise C, de Pokomandy A, Baril JG, Dufresne S, Trottier H. Virologic failure following persistent low-level viremia in a cohort of HIV-positive patients: results from 12 years of observation. *Clin Infect Dis* 2013;57:1489-96.
11. Reus S, Portilla J, Sanchez-Paya J, Giner L, Frances R, Such J, et al. Low-level HIV viremia is associated with microbial translocation and inflammation. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2013;62:129-34.
12. Cahn P, Fourie J, Grinsztejn B, Hodder S, Molina JM, Ruxrungtham K, et al. Week 48 analysis of once-daily vs. twice-daily darunavir/ritonavir in treatment-experienced HIV-1-infected patients. *AIDS* 2011;25:929-39.
13. Madruga JV, Berger D, McMurchie M, Suter F, Banhegyi D, Ruxrungtham K, et al. Efficacy and safety of darunavir-ritonavir compared with that of lopinavir-ritonavir at 48 weeks in treatment-experienced, HIV-infected patients in TITAN: a randomised controlled phase III trial. *Lancet* 2007;370:49-58.
14. Bunupuradah T, Chetchotisakd P, Ananworanich J, Munsakul W, Jirajariyavej S, Kantipong P, et al. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy versus tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI regimens: the HIV STAR study. *Antivir Ther* 2012;17:1351-61.
15. Group S-LS, Boyd MA, Kumarasamy N, Moore CL, Nwizu C, Losso MH, et al. Ritonavir-boosted lopinavir plus nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors versus ritonavir-boosted lopinavir plus raltegravir for treatment of HIV-1 infection in adults

with virological failure of a standard first-line ART regimen (SECOND-LINE): a randomised, open-label, non-inferiority study. *Lancet* 2013;381:2091-9.

16. Clotet B, Bellos N, Molina JM, Cooper D, Goffard JC, Lazzarin A, et al. Efficacy and safety of darunavir-ritonavir at week 48 in treatment-experienced patients with HIV-1 infection in POWER 1 and 2: a pooled subgroup analysis of data from two randomised trials. *Lancet* 2007;369:1169-78.

17. Sension M, Cahn P, Domingo P, Hodder S, Opsomer M, Lathouwers E, et al. Subgroup analysis of virological response rates with once- and twice-daily darunavir/ritonavir in treatment-experienced patients without darunavir resistance-associated mutations in the ODIN trial. *HIV Med* 2013;14:437-44.

18. Katlama C, Haubrich R, Lalezari J, Lazzarin A, Madruga JV, Molina JM, et al. Efficacy and safety of etravirine in treatment-experienced, HIV-1 patients: pooled 48 week analysis of two randomized, controlled trials. *AIDS* 2009;23:2289-300.

19. Gulick RM, Lalezari J, Goodrich J, Clumeck N, DeJesus E, Horban A, et al. Maraviroc for previously treated patients with R5 HIV-1 infection. *N Engl J Med* 2008;359:1429-41.

20. Steigbigel RT, Cooper DA, Kumar PN, Eron JE, Schechter M, Markowitz M, et al. Raltegravir with optimized background therapy for resistant HIV-1 infection. *N Engl J Med* 2008;359:339-54.

21. Yazdanpanah Y, Fagard C, Descamps D, Taburet AM, Colin C, Roquebert B, et al. High rate of virologic suppression with raltegravir plus etravirine and darunavir/ritonavir among treatment-experienced

patients infected with multidrug-resistant HIV: results of the ANRS 139 TRIO trial. *Clin Infect Dis* 2009;49:1441-9.

22. Molina JM, Lamarca A, Andrade-Villanueva J, Clotet B, Clumeck N, Liu YP, et al. Efficacy and safety of once daily elvitegravir versus twice daily raltegravir in treatment-experienced patients with HIV-1 receiving a ritonavir-boosted protease inhibitor: randomised, double-blind, phase 3, non-inferiority study. *Lancet Infect Dis* 2012;12:27-35.

23. Cahn P, Pozniak AL, Mingrone H, Shuldyakov A, Brites C, Andrade-Villanueva JF, et al. Dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naïve adults with HIV: week 48 results from the randomised, double-blind, non-inferiority SAILING study. *Lancet* 2013;382:700-8.

24. Eron JJ, Clotet B, Durant J, Katlama C, Kumar P, Lazzarin A, et al. Safety and efficacy of dolutegravir in treatment-experienced subjects with raltegravir-resistant HIV type 1 infection: 24-week results of the VIKING Study. *J Infect Dis* 2013;207:740-8.

25. Castagna A, Maggiolo F, Penco G, Wright D, Mills A, Grossberg R, et al. Dolutegravir in Antiretroviral-Experienced Patients With Raltegravir- and/or Elvitegravir-Resistant HIV-1: 24-Week Results of the Phase III VIKING-3 Study. *J Infect Dis* 2014;210:354-62.

26. Castagna A, Danise A, Menzo S, Galli L, Gianotti N, Carini E, et al. Lamivudine monotherapy in HIV-1-infected patients harbouring a lamivudine-resistant virus: a randomized pilot study (E-184V study). *AIDS* 2006;20:795-803.

## 6. FACTORES QUE CONDICIONAN EL ÉXITO DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

### 6.1. Adherencia

Se entiende por adherencia al TAR la capacidad del paciente para implicarse correctamente en la elección, inicio y cumplimiento del mismo a fin de conseguir una supresión adecuada de la replicación viral. La adherencia incorrecta es la primera causa de fracaso terapéutico. Entre los factores asociados con una adherencia incorrecta destacan: mala relación médico-paciente, consumo de drogas, enfermedad mental, deterioro neurocognitivo, bajo nivel educativo, barrera idiomática, falta de apoyo social, complejidad y efectos secundarios del tratamiento<sup>1-4</sup>. Por el contrario, el apoyo emocional, la capacidad para incluir la medicación en las actividades de la vida diaria y la comprensión de la importancia de la adherencia son factores que predicen una adherencia correcta. La adherencia, describe la calidad en la ejecución del tratamiento prescrito; aspectos vinculados, como el acceso y el mantenimiento del TAR son esenciales para el éxito del mismo<sup>5</sup>.

Antes de iniciar el TAR conviene preparar al paciente, identificar las situaciones que puedan dificultar la adherencia e intentar corregirlas. Durante el TAR es fundamental evaluar periódicamente la adherencia. Se recomienda utilizar más de un método, como la entrevista, los cuestionarios estructurados, el recuento de medicación sobrante y el registro de dispensación por farmacia.

Cuando existen niveles sub-terapéuticos de FAR el VIH puede replicarse y desarrollar resistencias. Debe destacarse que no sólo es importante el porcentaje de dosis omitidas sino también los patrones de adhesión sub-óptima: las interrupciones de tratamiento tienen una mayor repercusión en la respuesta virológica que la omisión ocasional de dosis.

El grado de adherencia necesario para lograr el éxito terapéutico no se conoce con certeza. La relación entre la adherencia al tratamiento, el control virológico, y el desarrollo de resistencia varía entre las diferentes clases de FAR y la situación clínica del paciente (viremia plasmática, tiempo de indetectabilidad). Así, con los IP/r la aparición de resistencias es mucho más difícil con cualquier nivel de adherencia debido a su elevada barrera genética<sup>6</sup>. El INI dolutegravir, también tiene una alta barrera genética, pero la experiencia en práctica clínica es aún escasa. Por tanto, ante un paciente en el que se prevé una adhesión incorrecta, es mejor iniciar TAR con pautas basadas en IP/r (o dolutegravir), que evitan el riesgo de seleccionar mutaciones de resistencia en caso de incumplimiento.

Si se detecta falta de adherencia debe intervenir de forma activa para corregirla. En ocasiones los pacientes presentan falta de adherencia selectiva, es decir a alguno de los componentes del TAR y esta falta de adherencia se relaciona con fracaso virológico<sup>7</sup>. La coformulación de FAR simplifica el TAR y puede prevenir este problema, mejorando la adherencia global<sup>8</sup>. En este sentido, el uso de regímenes completos en comprimido único constituye la estrategia más eficiente para prevenir la mala adherencia selectiva de fármacos. Además de mejorar la adherencia, el uso de regímenes en comprimido único se ha asociado con menores tasas de hospitalización y de costes en cuidados médicos<sup>9</sup>.

Las estrategias para mejorar la adherencia son múltiples. Probablemente la intervención que ha demostrado una mayor eficacia ha sido el soporte interpersonal estructurado, en el que personal sanitario entrenado emplea estrategias individualizadas<sup>10</sup>.

El tratamiento directamente observado (TDO) ha demostrado, en un meta-análisis, un discreto aumento en la probabilidad de conseguir CVP indetectable, mayor incremento de linfocitos CD4+ y adherencia superior al 95%, mientras se mantiene el TDO.

GeSIDA y el PNS, conjuntamente con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, han revisado los factores que influyen en la adherencia, los métodos de evaluación y las posibles estrategias de intervención<sup>11</sup>. Remitimos a los lectores a este documento (<http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/recomendacionesAdherenciaTrtoAntirretroviral062008.pdf>) para profundizar en el tema de la adherencia al TAR.

### Recomendaciones

- Antes de iniciar el TAR se debe preparar al paciente, identificar y corregir las causas potenciales de adherencia incorrecta **(A-III)**
- Una vez iniciado el TAR se recomienda efectuar un control a las 2-4 semanas para comprobar la adherencia y eventualmente corregirla **(A-III)**
- La adherencia debe monitorizarse y reforzarse coincidiendo con las visitas clínicas **(A-III)**
- El control de la adherencia debe realizarse por un equipo multidisciplinar, adaptado a la disponibilidad de cada centro, que incluya a médicos, personal de enfermería, profesionales de apoyo psicológico y farmacia hospitalaria **(A-III)**
- En pacientes con cumplimiento irregular es preferible utilizar pautas basadas en IP/r (y probablemente dolutegravir) para prevenir la selección de resistencias **(A-III)**. A pesar de la poca experiencia clínica disponible, los datos iniciales parecen apoyar que las pautas basadas en dolutegravir pueden ser también útiles en este tipo de pacientes **(B-III)**

- La combinación a dosis fijas de FAR simplifica el TAR y, por tanto, facilita el cumplimiento mantenido. El uso de regímenes completos en comprimido único constituye la estrategia más eficiente para prevenir la mala adherencia selectiva de fármacos **(A-II)**

## Referencias bibliográficas

1. Mills EJ, Nachega JB, Bangsberg DR, Singh S, Rachlis B, Wu P, et al. Adherence to HAART: a systematic review of developed and developing nation patient-reported barriers and facilitators. *PLoS Med* 2006;3:e438.
2. Grierson J, Koelmeyer RL, Smith A, Pitts M. Adherence to antiretroviral therapy: factors independently associated with reported difficulty taking antiretroviral therapy in a national sample of HIV-positive Australians. *HIV Med* 2011;12:562-9.
3. Andrade AS, Deutsch R, S AC, Duarte NA, Marcotte TD, Umlauf A, et al. Relationships among neurocognitive status, medication adherence measured by pharmacy refill records, and virologic suppression in HIV-infected persons. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2013;62:282-92.
4. Al-Dakkak I, Patel S, McCann E, Gadkari A, Prajapati G, Maiese EM. The impact of specific HIV treatment-related adverse events on adherence to antiretroviral therapy: a systematic review and meta-analysis. *AIDS Care* 2013;25:400-14.
5. Thompson MA, Mugavero MJ, Amico KR, Cargill VA, Chang LW, Gross R, et al. Guidelines for improving entry into and retention in care and antiretroviral adherence for persons with HIV: evidence-based recommendations from an International Association of Physicians in AIDS Care panel. *Ann Intern Med* 2012;156:817-33.
6. Bangsberg DR, Kroetz DL, Deeks SG. Adherence-resistance relationships to combination HIV antiretroviral therapy. *Current HIV/AIDS reports* 2007;4:65-72.
7. Gardner EM, Sharma S, Peng G, Hullsiek KH, Burman WJ, Macarthur RD, et al. Differential adherence to combination antiretroviral therapy is associated with virological failure with resistance. *AIDS* 2008;22:75-82.
8. Llibre JM, Arribas JR, Domingo P, Gatell JM, Lozano F, Santos JR, et al. Clinical implications of fixed-dose coformulations of antiretrovirals on the outcome of HIV-1 therapy. *AIDS* 2011;25:1683-90.
9. Cohen CJ, Meyers JL, Davis KL. Association between daily antiretroviral pill burden and treatment adherence, hospitalisation risk, and other healthcare utilisation and costs in a US medicaid population with HIV. *BMJ Open* 2013;3.
10. Gross R, Bellamy SL, Chapman J, Han X, O'Duor J, Palmer SC, et al. Managed problem solving for antiretroviral therapy adherence: a randomized trial. *JAMA Inter Med* 2013;173:300-6.
11. Hart JE, Jeon CY, Ivers LC, Behforouz HL, Caldas A, Drobac PC, et al. Effect of directly observed therapy for highly active antiretroviral therapy on virologic, immunologic, and adherence outcomes: a meta-analysis and systematic review. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010;54:167-79.

## 6.2. Tolerabilidad y efectos adversos

### 6.2.1. Factores asociados a la tolerabilidad del tratamiento antirretroviral

La tolerabilidad depende de aspectos relacionados con la toma del FAR (número y tamaño de los comprimidos, requisitos de administración incidencia e intensidad de efectos secundarios inmediatos), pero también de factores del paciente (edad, sexo, peso, situación clínica y expectativas respecto al tratamiento). En el último decenio tanto los FAR como su galénica han mejorado notablemente, lo cual ha favorecido su tolerabilidad y aceptación por los pacientes.

### 6.2.2. Clasificación cronológica de los efectos adversos

Los efectos adversos de los FAR pueden ser inmediatos (a corto plazo) o tardíos (a largo plazo). Los efectos inmediatos se producen en los primeros días o semanas de tratamiento, mientras que los tardíos aparecen al cabo de meses o años después del inicio de éste.

### 6.2.3. Efectos adversos inmediatos

Los efectos adversos inmediatos están bien definidos, en algunos casos pueden anticiparse y suelen ser fáciles de controlar. Afectan principalmente a la esfera digestiva, cutánea, o neuropsicológica y su incidencia y factores asociados son conocidos.

Entre los FAR actualmente recomendados: los IP/r pueden producir efectos digestivos<sup>1,2</sup>; los ITINN de primera generación (particularmente NVP) hepáticos y RHS<sup>3</sup>; ABC produce RHS en

pacientes con HLA-B\*5701 positivo<sup>4</sup>; DRV exantema<sup>2</sup>; y EFV puede producir efectos neuropsicológicos<sup>3</sup>.

### Recomendaciones

- Se debe evitar el uso de FAR cuyos efectos adversos inmediatos sean similares a manifestaciones clínicas o alteraciones de laboratorio ya presentes en un determinado paciente (**A-II**). La determinación del alelo HLA-B\*5701 es obligada antes de prescribir ABC ya que tiene un valor predictivo positivo de casi el 100% para el riesgo de RHS a este fármaco (**A-I**).
- Se debe explicar al paciente cómo tomar correctamente una pauta de TAR y la posibilidad de que ocurran determinados efectos adversos inmediatos. Al iniciar un régimen de TAR se debe explicar qué actitud debe tomar el paciente si ocurre un determinado efecto adverso y, en cualquier caso, se debe facilitar siempre la posibilidad de comunicación directa con el médico. Los efectos adversos inmediatos leves se pueden tratar sintomáticamente valorando la evolución de la tolerabilidad del paciente. Si el efecto adverso tiene gran intensidad o duración prolongada o no es asumible por el paciente, se debe cambiar el o los FAR potencialmente implicados (**A-I**).

#### 6.2.5. Efectos adversos tardíos

Los efectos adversos tardíos se conocen peor que los inmediatos y son más difíciles de prever y controlar. Potencian los síntomas de las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento y afectan al funcionamiento de órganos y sistemas.

El perfil de órganos y sistemas al que pueden afectar los diversos FAR así como los factores de riesgo asociados a tal afectación no se conoce en su totalidad, particularmente en lo que concierne a los FAR más recientes. La tabla 8 resume los efectos secundarios tardíos más característicos de los FAR actuales<sup>1,5-22</sup>.

El peso relativo que suelen tener los FAR en la producción o desarrollo de enfermedades crónicas es en general pequeño y mucho menor que el de otros factores de riesgo clásicos, ya conocidos en la población general, que en algunos casos están sobrerrepresentados en pacientes con infección por el VIH, como son el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, una dieta inadecuada, o la ausencia de ejercicio físico.

En general, el riesgo absoluto de efectos secundarios tardíos con los FAR actualmente recomendados es muy pequeño y el beneficio en términos de salud global de una pauta de TAR efectiva respecto a no tratar está fuera de duda. Sin embargo, en pacientes en alto riesgo o con enfermedades crónicas ya diagnosticadas, el efecto de determinados FAR puede contribuir por sí mismo a desencadenar o hacer progresar, respectivamente, tales enfermedades crónicas.

### Recomendaciones

- Se debe individualizar el TAR evaluando el riesgo o la presencia de enfermedades crónicas de manera que la pauta elegida no contenga FAR que puedan favorecer la aparición o progresión de las mismas (**A-II**).
- La retirada de algunos FAR implicados en efectos adversos tardíos puede mejorar, al menos parcialmente, la alteración clínica subyacente, aunque se desconoce si tal modificación puede alterar la historia natural de la enfermedad crónica en cuestión o la supervivencia. Los FAR contribuyen de forma colateral al riesgo o progresión de determinadas enferme-

dades crónicas pero hay otros factores que generalmente son más importantes, se recomienda priorizar la intervención sobre dichos factores (**A-II**).

## Referencias bibliográficas

1. Molina J-M, Andrade-Villanueva J, Echevarria J, Chetchotisakd P, Corral J, David N, et al. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naïve HIV-1-infected patients: 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study. *Lancet* 2008;372:646-55.
2. Ortiz R, DeJesus E, Khanlou H, Voronin E, van L, Andrade-Villanueva J, et al. Efficacy and safety of once-daily darunavir/ritonavir versus lopinavir/ritonavir in treatment-naïve HIV-1-infected patients at week 48. *AIDS* 2008;22:1389-97.
3. Shubber Z, Calmy A, Andrieux-Meyer I, Vitoria M, Renaud-Thery F, Shaffer N, et al. Adverse events associated with nevirapine and efavirenz-based first-line antiretroviral therapy: a systematic review and meta-analysis. *AIDS* 2013;27:1403-12.
4. Mallal S, Phillips E, Carosi G, Molina JM, Workman C, Tomazic J, et al. HLA-B\*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. *N Engl J Med* 2008;358:568-79.
5. Morlat P, Vivot A, Vandenhende MA, Dauchy FA, Asselineau J, Deti E, et al. Role of traditional risk factors and antiretroviral drugs in the incidence of chronic kidney disease, ANRS CO3 Aquitaine cohort, France, 2004-2012. *PLoS One* 2013;8:e66223.
6. Kalayjian RC, Lau B, Mehekano RN, Crane HM, Rodriguez B, Salata RA, et al. Risk factors for chronic kidney disease in a large cohort of HIV-1 infected individuals initiating antiretroviral therapy in routine care. *AIDS* 2012;26:1907-15.
7. Huang JS, Hughes MD, Riddler SA, Haubrich RH, Aids Clinical Trials Group AST. Bone mineral density effects of randomized regimen and nucleoside reverse transcriptase inhibitor selection from ACTG A5142. *HIV Clin Trials* 2013;14:224-34.
8. Bedimo R, Maalouf NM, Zhang S, Drechsler H, Tebas P. Osteoporotic fracture risk associated with cumulative exposure to tenofovir and other antiretroviral agents. *AIDS* 2012;26:825-31.
9. Bedimo RJ, Westfall AO, Drechsler H, Vidiella G, Tebas P. Abacavir use and risk of acute myocardial infarction and cerebrovascular events in the highly active antiretroviral therapy era. *Clin Infect Dis* 2011;53:84-91.
10. Ding X, Andraca-Carrera E, Cooper C, Miele P, Kornegay C, Soukup M, et al. No association of abacavir use with myocardial infarction: findings of an FDA meta-analysis. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2012;61:441-7.
11. De Pablo C, Orden S, Peris JE, Barrachina MD, Esplugues JV, Alvarez A. Profile of leukocyte-endothelial cell interactions induced in venules and arterioles by nucleoside reverse-transcriptase inhibitors in vivo. *J Infect Dis* 2013;208:1448-53.
12. Martinez E, Larrousse M, Gatell JM. Cardiovascular disease and HIV infection: host, virus, or drugs? *Curr Opin Infect Dis* 2009;22:28-34.
13. Rakotonandravelo S, Poinson Y, Borsa-Lebas F, de la Blanchardiere A, Michau C, Jantzen H, et al. Complicated atazanavir-associated cholelithiasis: a report of 14 cases. *Clin Infect Dis* 2012;55:1270-2.
14. Ryom L, Mocroft A, Kirk O, Worm SW, Kamara DA, Reiss P, et al. Association between antiretroviral exposure and renal impairment among HIV-positive persons with normal baseline renal function: the D:A:D study. *J Infect Dis* 2013;207:1359-69.
15. Hamada Y, Nishijima T, Watanabe K, Komatsu H, Tsukada K, Teruya K, et al. High incidence of renal stones among HIV-infected patients on ritonavir-boosted atazanavir than in those receiving other protease inhibitor-containing antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 2012;55:1262-9.
16. de Lastours V, Ferrari Rafael De Silva E, Daudon M, Porcher R, Loze B, Sauvageon H, et al. High levels of atazanavir and darunavir in urine and crystalluria in asymptomatic patients. *J Antimicrob Chemother* 2013;68:1850-6.
17. Scourfield A, Zheng J, Chinthapalli S, Waters L, Martin T, Mandalia S, et al. Discontinuation of Atripla as first-line therapy in HIV-1 infected individuals. *AIDS* 2012;26:1399-401.
18. Ciccarelli N, Fabbiani M, Di Giambenedetto S, Fanti I, Baldonero E, Bracciale L, et al. Efavirenz associated with cognitive disorders in otherwise asymptomatic HIV-infected patients. *Neurology* 2011;76:1403-9.
19. Allavena C, Delpierre C, Cuzin L, Rey D, Viget N, Bernard J, et al. High frequency of vitamin D deficiency in HIV-infected patients: effects of HIV-related factors and antiretroviral drugs. *J Antimicrob Chemother* 2012;67:2222-30.
20. Deepinder F, Braunstein GD. Drug-induced gynecomastia: an evidence-based review. *Expert Opin Drug Saf* 2012;11:779-95.
21. Colbers A, Greupink R, Burger D. Pharmacological considerations on the use of antiretrovirals in pregnancy. *Curr Opin Infect Dis* 2013;26:575-88.
22. Monteiro P, Perez I, Pich J, Gatell JM, Martinez E. Creatine kinase elevation in HIV-1-infected patients receiving raltegravir-containing antiretroviral therapy: a cohort study. *J Antimicrob Chemother* 2013;68:404-8.



### 6.3. Interacciones farmacológicas

Un número significativo de pacientes con infección por el VIH reciben diversos medicamentos además de los FAR. Ocasionalmente toman productos de herboristería, suplementos dietéticos o medicinas alternativas. Las interacciones de los FAR entre sí o con otros medicamentos pueden tener una repercusión clínica importante. En un estudio con 1.497 pacientes de la Cohorte Suiza se estimó que 35% de los pacientes menores de 50 años y 51% de los mayores de esta edad podían presentar interacciones potencialmente importantes (asociaciones contraindicadas o que requerían ajuste de dosis que no había sido realizado)<sup>1</sup>.

Las interacciones más relevantes suelen ser las farmacocinéticas (dan lugar a una modificación de concentraciones), en especial las que afectan al metabolismo. Los FAR son sustratos de uno o varios sistemas enzimáticos y a la vez puede comportarse como inductores y/o inhibidores de los mismos. La inducción producirá una disminución de las concentraciones del otro fármaco (sustrato), pudiendo disminuir su eficacia. La inhibición ocasionará un aumento de las concentraciones con mayor riesgo de toxicidad. En general, la inducción es un proceso lento (días o semanas), mientras que la inhibición se produce rápidamente (horas). Algunos FAR pueden ser inhibidores e inductores al mismo tiempo, predominando uno u otro efecto.

El sistema metabólico más importante es el citocromo P450 (CYP) y su principal isoenzima el CYP3A4. Muchos FAR, especialmente los IP e ITINN, y muchos otros medicamentos que a menudo reciben los pacientes, son sustratos, inhibidores o inductores del CYP. La potente inhibición enzimática que producen RTV y COBI se utiliza para potenciar otros FAR. COBI, a diferencia de RTV, no presenta actividad antirretroviral.

Otra vía metabólica es la conjugación de los FAR o de sus metabolitos con otros productos, por ejemplo la glucuronidación (UDPGT). Diversos FAR son inductores o inhibidores de UDPGT. RTV inhibe varias subfamilias del CYP y es inductor de UDPGT, mientras que ATV inhibe tanto CYP como UDPGT.

Ciertos transportadores, como la glicoproteína-P (P-gp), pueden alterar la biodisponibilidad de algunos FAR y su distribución por el organismo. Estos transportadores pueden ser también inducidos o inhibidos por diversos fármacos.

En la tabla 9 se detallan las características de los FAR como sustratos, inductores o inhibidores del CYP. Esta clasificación nos permite determinar posibles interacciones teóricas para una combinación determinada. Se indican también en ella las asociaciones contraindicadas. Los ITIAN tienen pocas interacciones metabólicas, por lo que no se han incluido.

Existen diversas páginas web que permiten consultar posibles interacciones<sup>2-4</sup>. Debido a que la información científica relacionada con los FAR se renueva constantemente, se recomienda consultar también la ficha técnica y la información actualizada por las compañías farmacéuticas y las autoridades sanitarias<sup>5,6</sup>.

Algunas interacciones farmacodinámicas (modificación del efecto a nivel de receptor, sin cambios en las concentraciones) tienen interés clínico. Dan lugar a adición, sinergia o antagonismo, ya sea reduciendo o aumentando la eficacia o la toxicidad. Algunos ejemplos son el incremento del riesgo de toxicidad mitocondrial al asociar ribavirina con ddl, de toxicidad renal al asociar TDF a otros nefrotóxicos, o de anemia al asociar ZDV con los IP del VHC boceprevir y telaprevir más interferón y ribavirina.

Se han descrito interacciones importantes entre los IP del VHC y los FAR, que pueden consultarse en una página web específica<sup>7</sup>, así como en las recomendaciones elaboradas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios<sup>8</sup>.

## Recomendaciones:

- Se debe reseñar en la historia clínica todos los medicamentos, productos naturales y medicinas alternativas que toma el paciente para evaluar posibles interacciones entre ellos **(A-III)**
- Se debe tener en cuenta las contraindicaciones y realizar ajustes de dosis cuando sea necesario **(A-I)**
- Se debe considerar la monitorización de los niveles plasmáticos cuando se administren dos o más fármacos con posibles interacciones farmacocinéticas relevantes, para evitar toxicidad o ineficacia terapéutica **(A-II)**

## Referencias bibliográficas

1. Marzolini C, Back D, Weber R, Furrer H, Cavassini M, Calmy A, et al. Ageing with HIV: medication use and risk for potential drug-drug interactions. *J Antimicrob Chemother* 2011;66:2107-11.
2. Guía de interacciones farmacológicas en VIH. Disponible en: <http://www.interaccionesvih.com> (Consultada el 20.11.2014).
3. HIV drug interactions website. Disponible en: <http://www.hiv-druginteractions.org> (Consultada el 20.11.2014).
4. Drug interaction tables. Immunodeficiency Clinic, Toronto General Hospital. Disponible en: [http://www.hivclinic.ca/main/drugs\\_interact.html](http://www.hivclinic.ca/main/drugs_interact.html) (Consultada el 20.11.2014).
5. European Medicines Agency (EMA). European public assessment reports (EPAR) for human medicines. Disponible en: [http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar\\_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124](http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124) (Acceso 20.11.2014).
6. U.S. Food and Drug Administration. FDA approved drug products. Disponible en: <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/> (Consultada el 20.11.2014).
7. University of Liverpool. Disponible en: <http://www.hep-druginteractions.org/> (Consultada el 20.11.2014).
8. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Informes de posicionamiento terapéutico. Infección por el virus de la hepatitis C. <http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/home.htm> (Consultada el 20.11.2014).

## 7. SITUACIONES ESPECIALES

### 7.1. Infección aguda por el VIH-1

La infección aguda por VIH se caracteriza en más de la mitad de los casos por un síndrome febril agudo autolimitado similar a la gripe o a la mononucleosis infecciosa<sup>1,2</sup>. Las pruebas de ELISA de cuarta generación, que incluyen la determinación simultánea de anticuerpos y del antígeno p24 del VIH, acortan el periodo ventana y permiten el diagnóstico en el 80-90% de casos. La infección aguda (primeros 30 días) no debe confundirse con la infección reciente, que hace referencia a pacientes diagnosticados en los primeros seis meses (180 días) de la infección.

El inicio del TAR en la infección aguda tiene ventajas importantes<sup>1,2</sup> como acortar la duración y gravedad de los síntomas, suprimir la replicación viral, reducir la diversidad viral y el reservorio (ADN proviral), reducir el riesgo de transmisión del VIH, normalizar la cifra de linfocitos CD4, reducir la activación inmunológica y preservar o restaurar la inmunidad específica frente al VIH-1, lo que en teoría podría permitir el control inmunológico de la replicación viral sin TAR. Por el contrario, las desventajas del TAR son la exposición a los FAR sin un beneficio clínico claramente demostrado, el riesgo de efectos secundarios, su duración indefinida, el desarrollo de resistencias si el cumplimiento no es adecuado, y el tratamiento innecesario de individuos



controladores de elite. Sin embargo, en la actualidad disponemos de un TAR fácil de administrar (1 comprimido al día), potente y seguro, lo que facilita el TAR de estos pacientes.

Las estrategias terapéuticas para evitar un TAR indefinido que se han realizado en los últimos años han fracasado<sup>1,2</sup>: 1) Administrar el TAR durante un periodo limitado de tiempo (ensayos clínicos SPARTAC, PRIMO-SHM y ACTG A5217); 2) Administrarlo de forma intermitente, a fin de potenciar la respuesta VIH-específica y controlar la replicación viral sin FAR; 3) Combinar el TAR con inmunosupresores (hidroxiurea, ciclosporina A, ácido micofenólico) o citoquinas (IL-2, interferón); y, 4) Asociar las vacunas terapéuticas (ensayos clínicos QUEST, ACTG A5187) al TAR. En la mayoría de pacientes ninguna de estas estrategias ha conseguido que el sistema inmune controle la replicación viral de forma sostenida sin TAR y el beneficio inmunológico y virológico alcanzado no ha durado más de 2 años<sup>3</sup>. Solo se ha observado un control virológico en un 4-8% de los pacientes<sup>4</sup> que en general iniciaron el TAR precozmente (<90 días), pero paradójicamente las características virológicas, inmunológicas y genéticas de estos “controladores post-TAR”<sup>5</sup> son completamente diferentes a los controladores de elite. Por tanto, en la práctica clínica, si se inicia el TAR durante la infección aguda, este se debe mantener de forma indefinida. Las pautas de TAR deben ser las mismas que en la infección crónica y la adición de más FAR (4 o 5) no está recomendada ya que no se ha acompañado de ningún beneficio adicional<sup>6</sup>.

El TAR en la infección aguda/reciente debe iniciarse lo antes posible y preferiblemente en los primeros 4 meses de la infección por el VIH ya que es cuando se puede conseguir el máximo beneficio inmunológico (alcanzar más de 900 linfocitos CD4/ $\mu$ L)<sup>7</sup>.

Finalmente, siempre debe valorarse la inclusión de estos pacientes en protocolos de investigación o ensayos clínicos que busquen la erradicación o la cura funcional del VIH.

### Recomendaciones

- El TAR debe recomendarse en todos los pacientes con infección aguda por el VIH independientemente de los síntomas, su gravedad y su duración **(A-II)** y debe comenzarse tan pronto como sea posible para obtener el máximo beneficio.
- En general el TAR debe ofrecerse a todos los pacientes con infección reciente **(B-II)**. En los pacientes con una cifra menor de 500 linfocitos CD4/ $\mu$ L debe comenzarse en los primeros 4 meses para obtener el máximo beneficio
- Se debe recomendar iniciar el TAR en todos los casos en los que exista un alto riesgo de transmisión del VIH **(A-II)**
- Se debe recomendar el inicio del TAR cuando la infección aguda por el VIH ocurre durante el embarazo **(A-I)**
- El inicio del TAR se hará con el mismo que se recomienda en la infección crónica **(A-I)** (Tabla 3). Una pauta con dos ITIAN (preferentemente TDF/FTC) y un inhibidor de la integrasa podría reducir más rápidamente la CVP durante las primeras 4-8 semanas en comparación con los IP o ITINN **(A-I)**, lo que podría facilitar la reducción de la transmisión del VIH. La combinación de RAL + 2 ITIAN (preferentemente TDF/FTC) podría tener la ventaja de alcanzar concentraciones más elevadas en las secreciones genitales **(B-III)**
- Se debe efectuar siempre una prueba de resistencias y un tropismo viral al diagnóstico de la infección aguda o reciente, se vaya a iniciar TAR o no **(A-II)**
- Si no se dispone del resultado del estudio de resistencias es preferible comenzar con una pauta basada en un IP/r hasta tener los resultados **(A-II)**
- Una vez iniciado el TAR debe administrarse por tiempo indefinido **(A-I)**

## Referencias bibliográficas

1. Cohen MS, Shaw GM, McMichael AJ, Haynes BF. Acute HIV-1 Infection. *N Engl J Med* 2011;364:1943-54.
2. Ambrosioni J, Nicolas D, Sued O, Aguero F, Manzardo C, Miro JM. Update on antiretroviral treatment during primary HIV infection. *Expert Rev Anti Infect Ther* 2014;12:793-807.
3. Lodi S, Meyer L, Kelleher AD, Rosinska M, Ghosn J, Sannes M, et al. Immunovirologic control 24 months after interruption of antiretroviral therapy initiated close to HIV seroconversion. *Arch Intern Med* 2012;172:1252-5.
4. Chen J, Han X, An M, Liu J, Xu J, Geng W, et al. Immunological and virological benefits resulted from short-course treatment during primary HIV infection: a meta-analysis. *PLoS One* 2013;8:e82461.
5. Saez-Cirion A, Bacchus C, Hocqueloux L, Avettand-Fenoel V, Girault I, Lecuroux C, et al. Post-treatment HIV-1 controllers with a long-term virological remission after the interruption of early initiated antiretroviral therapy ANRS VISCONTI Study. *PLoS Pathog* 2013;9:e1003211.
6. Markowitz M, Evering TH, Garmon D, Caskey M, La Mar M, Rodriguez K, et al. A randomized open-label study of 3- versus 5-drug combination antiretroviral therapy in newly HIV-1-infected individuals. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2014;66:140-7.
7. Le T, Wright EJ, Smith DM, He W, Catano G, Okulicz JF, et al. Enhanced CD4+ T-cell recovery with earlier HIV-1 antiretroviral therapy. *N Engl J Med* 2013;368:218-30.

## 7.2. Infección por VIH-2

El VIH-2 posee una organización genómica similar al VIH-1 aunque con diferencias estructurales que van a influir de forma significativa en su patogenicidad y en su sensibilidad a los FAR<sup>1</sup>.

Diversas circunstancias provocan que la toma de decisiones acerca del TAR en los pacientes con infección por el VIH-2 tenga una mayor dificultad: 1ª) La historia natural del VIH-2 difiere de la del VIH-1 y carecemos de las evidencias necesarias que permitan identificar el momento óptimo de inicio del TAR en estos pacientes. 2ª) Los algoritmos genotípicos utilizados para predecir resistencias a FAR en la infección por VIH-1 no son directamente aplicables al VIH-2. 3ª) No disponemos de evidencias procedentes de ensayos clínicos que permitan identificar los regímenes de uso preferencial en el escenario de la infección por VIH-2. 4ª) En el momento actual tampoco disponemos de una prueba comercial para medir la carga viral del VIH-2, ni de pruebas de resistencia fenotípicas o genotípicas validadas para uso clínico. Pese a estas limitaciones parece razonable asumir que los principios generales del TAR en los pacientes con infección por el VIH-2 deben ser los mismos que para el VIH-1.

El VIH-2 presenta importantes diferencias respecto al VIH-1 en su perfil de sensibilidad a los FAR. El VIH-2 presenta resistencia intrínseca a los ITINN<sup>2</sup>. En contraposición, es sensible a los ITIAN, aunque su barrera genética frente a estos es más baja que frente al VIH-1<sup>3</sup>. Además, el VIH-2 presenta una sensibilidad variable frente a los IP, siendo LPV, SQV y DRV los más activos<sup>4</sup>. RAL tiene actividad *in vitro* frente al VIH-2<sup>5</sup>. El uso de MVC en el tratamiento de la infección por VIH-2 está limitado por la no disponibilidad de un test de tropismo y por la capacidad del VIH-2 para utilizar, además del CCR5 y el CXCR4, otros correceptores<sup>6</sup>. Por último, el VIH-2 presenta resistencia intrínseca a ENF<sup>7</sup>. En este escenario, hasta no disponer de nuevas evidencias, parece razonable recomendar como régimen preferente para el TAR de inicio en pacientes infectados por el VIH-2 o con infección dual por VIH-1/2, la combinación de 2 ITIAN y un IP/r.

## Recomendaciones

- Los principios generales del TAR en pacientes con infección por el VIH-2 deben ser los mismos que para la infección por el VIH-1 (**A-III**)

- El régimen de TAR de inicio de uso preferente en estos pacientes es la combinación de 2 ITIAN + 1 IP/r **(A-III)**
- El uso de ITINAN, MVC o ENF están contraindicados para el tratamiento de la infección por el VIH-2 **(A-I)**

### Referencias bibliográficas

1. Campbell-Yesufu OT, Gandhi RT. Update on human immunodeficiency virus (HIV)-2 infection. Clin Infect Dis 2011;52:780-7.
2. Tuaillon E, Gueudin M, Lemee V, Gueit I, Roques P, Corrigan GE, et al. Phenotypic susceptibility to nonnucleoside inhibitors of virion-associated reverse transcriptase from different HIV types and groups. J Acquir Immune Defic Syndr 2004;37:1543-9.
3. Smith RA, Anderson DJ, Pyrak CL, Preston BD, Gottlieb GS. Antiretroviral drug resistance in HIV-2: three amino acid changes are sufficient for classwide nucleoside analogue resistance. J Infect Dis 2009;199:1323-6.
4. Brower ET, Bacha UM, Kawasaki Y, Freire E. Inhibition of HIV-2 protease by HIV-1 protease inhibitors in clinical use. Chem Biol Drug Des 2008;71:298-305.
5. Roquebert B, Damond F, Collin G, Matheron S, Peytavin G, Benard A, et al. HIV-2 integrase gene polymorphism and phenotypic susceptibility of HIV-2 clinical isolates to the integrase inhibitors raltegravir and elvitegravir in vitro. J Antimicrob Chemother 2008;62:914-20.
6. Owen SM, Ellenberger D, Rayfield M, Wiktor S, Michel P, Grieco MH, et al. Genetically divergent strains of human immunodeficiency virus type 2 use multiple coreceptors for viral entry. J Virol 1998;72:5425-32.
7. Ekouevi DK, Tchounga BK, Coffie PA, Tegbe J, Anderson AM, Gottlieb GS, et al. Antiretroviral therapy response among HIV-2 infected patients: a systematic review. BMC Infect Dis 2014;14:461.

### 7.3. Embarazo

El TAR en el embarazo se discute en un documento de consenso elaborado por el PNS en colaboración con GeSIDA y otras sociedades científicas<sup>1</sup>. Se recomienda su lectura y el de otra guía internacional sobre el tema<sup>2</sup> así como otras aportaciones<sup>3-7</sup> para cualquier duda al respecto. En este apartado nos limitamos a presentar las recomendaciones acerca del TAR en este contexto. El manejo obstétrico y del recién nacido está fuera de los objetivos y alcance de esta guía.

#### Recomendaciones

- Es imprescindible realizar una serología de VIH en toda mujer embarazada **(A-I)** y, si fuera negativa, repetirla en el tercer trimestre **(A-II)**
- El consejo preconcepcional debe formar parte de la asistencia a la mujer con infección por el VIH en edad reproductiva **(A-II)**
- El TAR está indicado en todas las gestantes, independientemente del número de linfocitos CD4+ y de la CVP que presenten con el objetivo de mantener una CVP indetectable **(A-I)**
- La elección de los FAR concretos se basará en el estudio de resistencias, en la seguridad los mismos (véanse tablas 10, 11 y 12). Si no hay resistencias, el TAR de elección es ZDV o TDF o ABC + 3TC o FTC + LPV/r **(A-I)**; en caso contrario podrán recibir cualquiera de los FAR “recomendados” o “alternativos” tras una valoración individualizada **(A-III)**. En la tabla 11 se recoge la actitud recomendada ante diferentes situaciones.
- El tratamiento intraparto con ZDV por vía intravenosa estará indicado en mujeres con CVP >1000 copias o desconocida en el momento del parto, con independencia del TAR que hubiese llevado previamente la paciente **(A-I)**

- La cesárea electiva está indicada, en la semana 38, en mujeres cuya CVP previa al parto es mayor de 1000 copias/mL **(A-II)**
- Las madres deben abstenerse de forma absoluta de lactar a sus hijos y deberán alimentarlos con una fórmula adaptada **(A-I)**

## Referencias bibliográficas

1. Grupo de expertos de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS), Grupo de Estudio del Sida (GESIDA), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y Sociedad española de Infectología Pediátrica /SEIP). Guía práctica para el seguimiento de la infección por VIH en relación con la reproducción, embarazo, parto y profilaxis de la transmisión vertical del niño expuesto (2013). Disponible en: <http://www.gesida-seimc.org/pcientifica/fuentes/DcyRc/gesidadcyr2013-SeguimientoInfVIHEmbarazo.pdf> (Consultada el 18.11.2014).
2. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services. Disponible en: <http://aidsinfo.nih.gov/guidelines> (Consultada el 18.11.2014).
3. Ford N, Calmy A, Mofenson L. Safety of efavirenz in the first trimester of pregnancy: an updated systematic review and meta-analysis. *AIDS* 2011;25:2301-4.
4. Nobrega I, Travassos AG, Haguihara T, Amorim F, Brites C. Use of raltegravir in late-presenting HIV-infected pregnant women. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2013;29:1451-4.
5. Briand N, Warszawski J, Mandelbrot L, Dollfus C, Pannier E, Cravello L, et al. Is intrapartum intravenous zidovudine for prevention of mother-to-child HIV-1 transmission still useful in the combination antiretroviral therapy era? *Clin Infect Dis* 2013;57:903-14.
6. Wang L, Kourtis AP, Ellington S, Legard-Williams J, Bulterys M. Safety of tenofovir during pregnancy for the mother and fetus: a systematic review. *Clin Infect Dis* 2013;57:1773-81.
7. Williams PL, Crain MJ, Yildirim C, Hazra R, Van Dyke RB, Rich K, et al. Congenital anomalies and in utero antiretroviral exposure in human immunodeficiency virus-exposed uninfected infants. *JAMA Pediatr* 2015;169:48-55.

## 7.4. COMORBILIDADES

### 7.4.1. Tratamiento antirretroviral de inicio en pacientes con infecciones oportunistas distintas a la tuberculosis

En la actualidad se recomienda iniciar el TAR en fases precoces de la infección por el VIH. A pesar de ello, una proporción considerable de pacientes acude por primera vez en fases avanzadas, con inmunodepresión profunda y, en ocasiones, presentando enfermedades oportunistas, la mayoría infecciosas (IO).

El momento idóneo para iniciar el TAR en un paciente con una IO es motivo de controversia<sup>1</sup>. Las posibles ventajas de un inicio temprano incluyen una recuperación inmune más rápida, una mayor resolución de la IO, prevenir la aparición de otras y reducir el riesgo de mortalidad. Entre los inconvenientes del inicio precoz del TAR están el número elevado de comprimidos a tomar para el tratamiento concomitante de la IO y del VIH, posibles interacciones y toxicidades, y el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (SIRI)<sup>1</sup>. La IO en la que se ha estudiado mejor el momento más idóneo para iniciar el TAR es la tuberculosis, que se trata en otro apartado. Existen pocos estudios aleatorizados y de cohortes que hayan evaluado este tema en otras IO. El ensayo clínico aleatorizado ACTG A5164 demostró una reducción en la progresión a sida/muerte (*OR*: 0,51; *IC* 95%: 0,27 a 0,94) en pacientes que iniciaban TAR dentro de una mediana de 12 días tras el inicio del tratamiento de la IO frente a los que lo demoraban hasta una mediana de 45 días<sup>2</sup>. No se observaron diferencias significativas en efectos adversos, incidencia de SIRI ni su aparición según se usasen o no esteroides para la IO. Más del 60% de

los pacientes tenían neumonía por *Pneumocystis jiroveci* (NPJ), pero dado el pequeño número y variedad de otras IO es difícil extraer conclusiones para cada una de ellas por separado. En todo caso, parecía haber una tendencia favorable al inicio precoz en las infecciones fúngicas, incluyendo la meningitis criptocócica (MC).

Un estudio prospectivo de cohorte, realizado por el grupo PISCIS, halló también una mayor progresión a sida/muerte en los pacientes que iniciaron el TAR entre 30-270 días frente a los que lo hicieron antes de 30 días, tanto en IO en general como en la NPJ ( $P = 0,002$ ; RR: 1,83; IC 95%: 1,25 a 2,68)<sup>3</sup>.

Una de las IO más complicadas de tratar por su elevada morbilidad es la MC, sobre todo en los países empobrecidos. La ausencia de un tratamiento estandarizado para el aumento de la presión intracraneal, la falta de 5-fluorocitosina y la dificultad para acceder al TAR en esos países, contribuyen seguramente a su mayor mortalidad.

Algunos estudios han intentado evaluar la importancia del momento de iniciar el TAR en pacientes con MC. En Zimbabwe, Makadzange et al. observaron una peor supervivencia en los pacientes que iniciaron el TAR (d4T/3TC/NVP) antes de 72 horas del comienzo del tratamiento de la MC respecto a los que lo iniciaron después de 10 semanas (RR: 2,85; IC 95%: 1,1 a 7,23)<sup>4</sup>. Sin embargo, en dicha mala evolución pudo influir la ausencia de un protocolo de manejo de la hipertensión craneal, el uso de fluconazol en vez de anfotericina B y una carga antigénica más elevada en el momento del inicio del TAR en el grupo de inicio inmediato.

En un reciente estudio aleatorizado en Botswana, Bisson et al., evaluaron a 27 pacientes con MC que iniciaron TAR con una mediana de 7 días frente a 32 tras la aleatorización; todos los pacientes llevaban tratamiento con anfotericina B. No encontraron diferencias en el tiempo hasta la negativización del cultivo del criptococo en el LCR, aunque sí una tendencia a menor mortalidad a pesar de una mayor frecuencia de SRI en los pacientes con inicio precoz del TAR<sup>5</sup>. No obstante, este estudio tiene la limitación de su pequeño tamaño muestral, menor al número previsto en el diseño por problemas de reclutamiento.

Finalmente, en el estudio COAT (*Cryptococcal Optimal ART Timing*), organizado por la Universidad de Minnesota y realizado en África, se detuvo la inclusión de pacientes y el estudio por una mayor mortalidad si el TAR se iniciaba precozmente<sup>6</sup>. Los pacientes ( $n=177$  y con mediana de CD4 de 19 y 28 células/ $\mu\text{L}$ , respectivamente) fueron aleatorizados a inicio precoz o tardío del TAR (1-2 semanas o 5 semanas después del diagnóstico) y recibieron anfotericina B (0.7-1.0 mg/kg/d) y fluconazol (800 mg/d) seguido de una consolidación con fluconazol. La mortalidad a las 26 semanas fue significativamente mayor en los que iniciaron tratamiento de forma precoz (45% vs 30%, RR 1.73, IC95% 1.06 a 2.82,  $p=0.03$ ). La mortalidad fue particularmente elevada en pacientes con menos de 5 células/ $\mu\text{L}$  en LCR. La presencia de SRI diagnosticado no difirió significativamente entre ambos grupos (20% vs. 13%,  $p=0.32$ ). Los autores concluyeron que en pacientes con MC, diferir TAR 5 semanas después del diagnóstico se asociaba a una mayor supervivencia significativa, comparado con aquéllos en los que se inició TAR 1-2 semanas tras el diagnóstico, especialmente en pacientes con poca celularidad en el LCR<sup>6</sup>.

Por tanto, a pesar de la limitación de los datos, en las IO en general habría una menor progresión de la enfermedad en aquellos pacientes que inician TAR de forma precoz (antes de los 30 días), aunque no está claro si, además de la NPJ, esto es cierto para todas las IO. Concretamente, en la MC (probablemente en relación a la gravedad del SRI en SNC, no siempre clínicamente reconocido, y como también ocurre en la meningitis tuberculosa) sería claramente mejor esperar varias semanas para iniciar el TAR tras el diagnóstico y tratamiento de esta IO<sup>6</sup>.

## Recomendaciones

- En pacientes con IO se debe iniciar el TAR dentro de los primeros 15-30 días del inicio del tratamiento de la infección **(A-II)**
- En el caso de la meningitis criptocócica, es prudente esperar varias semanas (5 según el estudio más amplio publicado hasta ahora, especialmente en pacientes con menos de 5 células/ $\mu$ L en LCR) antes de iniciar TAR **(A-I)**. La negatividad del cultivo del LCR es un dato que apoya el inicio del TAR **(A-II)** pero, en general debe considerarse cuando se observe descenso de la carga antigénica **(B-III)**. Además se debe seguir un control estrecho de la hipertensión intracraneal **(A-I)**

## Referencias bibliográficas

1. Lawn SD, Torok ME, Wood R. Optimum time to start antiretroviral therapy during HIV-associated opportunistic infections. *Curr Opin Infect Dis* 2011;24:34-42.
2. Zolopa A, Andersen J, Powderly W, Sanchez A, Sanne I, Suckow C, et al. Early antiretroviral therapy reduces AIDS progression/death in individuals with acute opportunistic infections: a multicenter randomized strategy trial. *PLoS One* 2009;4:e5575.
3. Manzardo C, Esteve A, Ortega N, Podzamczar D, Murillas J, Segura F, et al. Optimal timing for initiation of highly active antiretroviral therapy in treatment-naive human immunodeficiency virus-1-infected individuals presenting with AIDS-defining diseases: the experience of the PISCIS Cohort. *Clin Microbiol Infect* 2013;19:646-53.
4. Makadzange AT, Ndhlovu CE, Takarinda K, Reid M, Kurangwa M, Gona P, et al. Early versus delayed initiation of antiretroviral therapy for concurrent HIV infection and cryptococcal meningitis in sub-saharan Africa. *Clin Infect Dis* 2010;50:1532-8.
5. Bisson GP, Molefi M, Bellamy S, Thakur R, Steenhoff A, Tamuhla N, et al. Early versus delayed antiretroviral therapy and cerebrospinal fluid fungal clearance in adults with HIV and cryptococcal meningitis. *Clin Infect Dis* 2013;56:1165-73.
6. Boulware DR, Meya DB, Muzoora C, Rolfes MA, Huppler Hullsiek K, Musubire A, et al. Timing of antiretroviral therapy after diagnosis of cryptococcal meningitis. *N Engl J Med* 2014;370:2487-98.

### 7.4.2. Tratamiento antirretroviral y tuberculosis (TB)

El tratamiento de la TB en adultos infectados por el VIH ha sido objeto de un documento de consenso reciente de GESIDA/Secretaría del PNS<sup>1</sup>. Se recomienda su lectura para cualquier duda relacionada con el tratamiento de la tuberculosis o de la infección por VIH en pacientes que padecen las dos enfermedades. En este apartado nos limitamos a presentar de modo resumido los aspectos más relevantes del TAR en este contexto.

*Momento de inicio óptimo del TAR en pacientes infectados por VIH con TB.* Esta importante cuestión se ha visto resuelta gracias a tres ensayos clínicos realizados en diferentes partes del mundo cuyos resultados fueron, con pequeñas diferencias, congruentes entre sí<sup>2-4</sup>.

## Recomendaciones

- Se recomienda iniciar TAR siempre durante el tratamiento de la tuberculosis, independientemente del recuento de células CD4+, ya que se disminuye el riesgo de muerte **(A-I)**
- El momento óptimo de iniciar el TAR depende del recuento de células CD4+. Si el recuento es  $<50$  células/ $\mu$ L, debe iniciarse lo antes posible, tras comprobar la tolerancia al tratamiento antituberculoso y no más tarde de las dos primeras semanas **(A-I)**. Si el recuento de CD4+ es  $>50$  células/ $\mu$ L, puede retrasarse el inicio del TAR hasta finalizar la fase intensiva del tratamiento antituberculoso (8 semanas) **(A-I)**
- Con las recomendaciones previas se disminuye el riesgo de efectos adversos y el desarrollo de síndrome inflamatorio por reconstitución inmunológica (SIRI), sin comprometer la supervivencia **(A-I)**

*Pautas de tratamiento antirretroviral.* La principal dificultad en el tratamiento adecuado simultáneo de la tuberculosis y la infección por VIH radica en las posibles interacciones medicamentosas. Estas son especialmente relevantes en el caso de las rifamicinas, por ser potentes inductores del sistema enzimático CYP3A4, implicado en el metabolismo de la mayoría de las familias de fármacos antirretrovirales.

Como principio general, debe intentarse, siempre que se pueda, incluir rifampicina en el tratamiento de la tuberculosis y usar un régimen antirretroviral con fármacos sin problemas de interacciones. Para el paciente que inicia TAR, la elección del régimen debe seguir las mismas normas que para la población sin tuberculosis y debe incluir, por tanto, dos análogos de nucleósidos y un tercer fármaco. Para pacientes que han recibido previamente TAR y han desarrollado resistencia o intolerancia, el régimen debe construirse de acuerdo a los principios para la elección de fármacos antirretrovirales en pacientes en tratamiento para tuberculosis que se sintetizan a continuación. Las recomendaciones pueden sintetizarse en los siguientes puntos<sup>5-9</sup>.

### Recomendaciones

- *Elección de los ITIAN.* No existe interacción significativa entre los fármacos antituberculosos y los ITIAN, ni hay evidencia de la potenciación de la toxicidad entre ellos. Por tanto, ABC, TDF, 3TC o FTC pueden ser utilizados en estos pacientes sin riesgos añadidos **(A-I)**
- *Elección del tercer fármaco.* La mayor experiencia y los mejores resultados se han obtenido con EFV, por lo que éste constituye el fármaco de elección **(A-I)**. La dosis de EFV es la estándar en todos los pacientes (600 mg/día), independientemente del peso, sin necesidad de aumentarla a 800 mg/día **(A-I)**
- *Alternativas terapéuticas como terceros fármacos.* Existe experiencia o evidencia suficiente para recomendar como alternativas pautas que incluyan nevirapina a dosis habituales **(A-II)**, RAL a dosis de 800 mg/12 horas **(A-II)**, aunque la dosis de 400 mg/12 horas ha demostrado eficacia, y MRV a dosis de 600 mg/12 horas **(A-III)**.
- *Fármacos que no pueden utilizarse.* No se pueden coadministrar con rifampicina los otros no análogos (RPV y ETR), ningún inhibidor de la proteasa (potenciado o no con RTV) ni EVG. En el caso excepcional de que un inhibidor de la proteasa fuese la única opción de tratamiento antirretroviral debe sustituirse rifampicina por rifabutina y realizar el ajuste correspondiente en las dosis de los fármacos **(A-I)**

### *Síndrome inflamatorio por reconstitución inmunológica*

El SIRI es una complicación frecuente del TAR en pacientes con TB, especialmente en pacientes con recuento de células CD4+ muy bajas y cuando el TAR se inicia muy precozmente en relación al inicio del tratamiento antituberculoso<sup>10</sup>.

### Recomendaciones

- En caso de SIRI no debe interrumpirse el tratamiento antituberculoso ni el TAR **(A-III)**
- Para el manejo de los síntomas de SIRI pueden añadirse antiinflamatorios no esteroideos en el caso de formas leves-moderadas **(A-III)** o corticoesteroides en las formas moderadas-graves **(A-II)**

### Referencias bibliográficas

1. Rivero A, Pulido F, Cayla J, Iribarren JA, Miro JM, Moreno S, et al. Recomendaciones de GESIDA/Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida para el tratamiento de la tuberculosis en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (actualización enero de 2013). *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2013;31:672-84.
2. Abdool Karim SS, Naidoo K, Grobler A, Padayatchi N, Baxter C, Gray AL, et al. Integration of antiretroviral therapy with tuberculosis treatment. *N Engl J Med* 2011;365:1492-501.
3. Blanc FX, Sok T, Laureillard D, Borand L, Rekacewicz C, Nerrienet E, et al. Earlier versus later start of



antiretroviral therapy in HIV-infected adults with tuberculosis. *N Engl J Med* 2011;365:1471-81.

4. Havlir DV, Kendall MA, Ive P, Kumwenda J, Swindells S, Qasba SS, et al. Timing of antiretroviral therapy for HIV-1 infection and tuberculosis. *N Engl J Med* 2011;365:1482-91.

5. Borand L, Laureillard D, Madec Y, Chou M, Pheng P, Marcy O, et al. Plasma concentrations of efavirenz with a 600 mg standard dose in Cambodian HIV-infected adults treated for tuberculosis with a body weight above 50 kg. *Antivir Ther* 2013;18:419-23.

6. Bonnet M, Bhatt N, Baudin E, Silva C, Michon C, Taburet AM, et al. Nevirapine versus efavirenz for patients co-infected with HIV and tuberculosis: a randomised non-inferiority trial. *Lancet Infect Dis* 2013;13:303-12.

7. Grinsztejn B, De Castro N, Arnold V, Veloso VG, Morgado M, Pilotto JH, et al. Raltegravir for the

treatment of patients co-infected with HIV and tuberculosis (ANRS 12 180 Replate TB): a multicentre, phase 2, non-comparative, open-label, randomised trial. *Lancet Infect Dis* 2014;14:459-67.

8. The European Medicines Agency (EMA). Celsentri: EPAR — Product Information. Disponible en: [http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/EPAR\\_-\\_Product\\_Information/human/000811/WC500022190.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000811/WC500022190.pdf) Consultada el 29.11.2014).

9. Dierberg KL, Chaisson RE. Human immunodeficiency virus-associated tuberculosis: update on prevention and treatment. *Clin Chest Med* 2013;34:217-28.

10. Meintjes G, Wilkinson RJ, Morroni C, Pepper DJ, Rebe K, Rangaka MX, et al. Randomized placebo-controlled trial of prednisone for paradoxical tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome. *AIDS* 2010;24:2381-90.

#### 7.4.3. Uso de FAR en pacientes con insuficiencia renal (Tabla 13)

Para una visión completa del diagnóstico, prevención y tratamiento de las alteraciones renales en pacientes con infección por VIH se recomienda consultar el documento de consenso *ad hoc* elaborado por GESIDA, la SEN y la SEQC<sup>1</sup>.

#### Recomendaciones

- Es necesario ajustar las dosis de los ITIAN, excepto en el caso de ABC **(A-II)**
- No se requiere ajuste de dosis para los ITINN, IP, ENF ni los inhibidores de la integrasa RAL y DTG **(A-II)**
- MVC requiere ajuste de dosis si se emplea en combinación con inhibidores potentes del CYP3A4, como los IP (excepto TPV/r), ketoconazol, itraconazol, claritromicina y telitromicina **(A-II)**
- Se desaconseja el uso de coformulaciones de FAR en pacientes con insuficiencia renal significativa. En estos casos deben emplearse los FAR por separado y realizar los ajustes pertinentes **(B-III)**
- En los pacientes con cualquier grado de insuficiencia renal se recomienda vigilar estrechamente la función renal y evitar los fármacos nefrotóxicos **(A-III)**
- En los pacientes con IRC avanzada se debe realizar el ajuste de dosis recomendado por las fichas técnicas de cada medicamento, teniendo en cuenta las posibles interacciones entre los diferentes fármacos, más frecuentes y peligrosas en esta situación **(A-II)**

#### Referencias bibliográficas

1. Gorris JL, Gutierrez F, Trullas JC, Arazo P, Arribas JR, Barril G, et al. Resumen ejecutivo del documento de consenso sobre el manejo de la patología renal en

pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2014;32:583-97.



#### 7.4.4. Hepatopatías (VHC, VHB, cirrosis)

##### 7.4.4.1. Momento de inicio del tratamiento antirretroviral

El control de la replicación del VIH y la mejoría inmunológica por efecto del TAR se han asociado a menor velocidad de progresión de la enfermedad hepática causada por VHC y a una mejor evolución clínica, incluso en pacientes con cirrosis descompensada, en estudios de cohortes<sup>1,2</sup>. Por ello el TAR es una prioridad en estos pacientes.

En los coinfectados en los que se plantea el tratamiento del VHC, en general es preferible iniciar el TAR y una vez controlada la replicación del VIH, añadir el tratamiento de la hepatitis. Opcionalmente, sobre todo en pacientes controladores de elite, se podría plantear tratar inicialmente el VHC

El TDF suprime el VHB en la inmensa mayoría de los pacientes coinfectados por VIH y VHB<sup>3</sup>. Por tanto, si existe indicación de tratar la infección por VHB, se debe iniciar TAR incluyendo TDF.

GeSIDA ha elaborado unas guías de manejo de las hepatitis virales en pacientes con infección por VIH que prontamente estarán disponibles

#### Recomendaciones

- En pacientes coinfectados por el VHC se recomienda iniciar el TAR independientemente de la cifra de linfocitos CD4+ **(A-II)**
- En pacientes que precisan tratamiento de la hepatitis C, en general es preferible iniciar el TAR **(A-III)**
- En pacientes coinfectados por VIH/VHB con indicación de tratamiento frente al VHB, se debe iniciar TAR incluyendo TDF **(A-I)**

##### 7.4.4.2. Elección de los fármacos antirretrovirales (FAR)

La elección de los FAR en un paciente coinfectado por virus de la hepatitis ha de tener en cuenta su potencial hepatotoxicidad, la existencia de cirrosis hepática, la coinfección por VHB y la indicación de tratamiento anti-VHC.

La hepatotoxicidad asociada al TAR es más frecuente en pacientes coinfectados. Sin embargo, si se exceptúan los casos asociados a dideoxynucleósidos (d-AN) y NVP, que pueden causar fallo hepático agudo y toxicidad crónica, los FAR utilizados actualmente se asocian con un bajo riesgo de hepatotoxicidad y la mayoría de los episodios de hepatitis tóxica por TAR son leves<sup>4</sup>.

Por otra parte, no se ha demostrado de modo consistente que ningún FAR ejerza un efecto protector sobre la esteatogénesis ni la fibrogénesis hepática.

En pacientes con cirrosis clase A de Child-Pugh se puede usar cualquier FAR, con las consideraciones antes expuestas. En pacientes con insuficiencia hepatocelular (clases B y C de Child-Pugh) vale la pena tener en cuenta que, con respecto a los ITINN, los IP/r presentan un mayor margen terapéutico. Los datos farmacocinéticos obtenidos con FPV permiten la dosificación individualizada en pacientes con cirrosis Child-Pugh B y C<sup>5</sup>.

La monitorización de los niveles plasmáticos, teóricamente útil en pacientes con insuficiencia hepatocelular, no está disponible en la mayoría de centros y su utilidad en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia hepática no se ha demostrado.

Por sus características farmacocinéticas, los inhibidores de la integrasa ofrecen ventajas en estos pacientes. RAL ha demostrado niveles séricos adecuados sin necesidad de ajuste de dosis y buena tolerancia en pacientes en estadio C de Child<sup>6</sup>. En base a los datos obtenidos en vo-

luntarios sanos, DTG tampoco precisa ajuste de dosis en caso de insuficiencia hepática moderada<sup>7</sup>. En los pacientes que reciben tratamiento anti-VHC con RBV están contraindicado d4T y ZDV porque aumenta el riesgo de toxicidad. Además, existen múltiples interacciones entre los FAR y los antivirales de acción directa (AAD) frente al VHC, excepto sofosbuvir, que condicionan la modificación de la dosis o desaconsejan su coadministración<sup>8-13</sup> (Tabla 14)

### Recomendaciones

- En pacientes con hepatopatía crónica y función hepática conservada, incluida cirrosis clase A de Child, se puede utilizar cualquier FAR **(A-I)**, aunque es razonable evitar los dideoxineucleótidos **(A-III)**
- En pacientes con insuficiencia hepatocelular, los inhibidores de integrasa no precisan ajuste de dosis **(A-I)**. Los IP/r presentan mayor margen terapéutico que los ITINN **(A-II)**
- Debe evitarse la asociación de RBV con ddI, d4T y ZDV **(A-I)**
- Excepto sofosbuvir, los AAD disponibles (telaprevir, boceprevir, simeprevir y daclatasvir) presentan interacciones farmacocinéticas significativas con los ITINN y los IP/r, que requieren ajuste de dosis o contraindican la coadministración **(A-I)**

### REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Macias J, Berenguer J, Japon MA, Giron JA, Rivero A, Lopez-Cortes LF, et al. Fast fibrosis progression between repeated liver biopsies in patients coinfecting with human immunodeficiency virus/hepatitis C virus. *Hepatology* 2009;50:1056-63.
2. Pineda JA, Garcia-Garcia JA, Aguilar-Guisado M, Rios-Villegas MJ, Ruiz-Morales J, Rivero A, et al. Clinical progression of hepatitis C virus-related chronic liver disease in human immunodeficiency virus-infected patients undergoing highly active antiretroviral therapy. *Hepatology* 2007;46:622-30.
3. Price H, Dunn D, Pillay D, Bani-Sadr F, de Vries-Sluijs T, Jain MK, et al. Suppression of HBV by tenofovir in HBV/HIV coinfecting patients: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 2013;8:e68152.
4. Macias J, Neukam K, Mallolas J, Lopez-Cortes LF, Carton JA, Domingo P, et al. Liver toxicity of initial antiretroviral drug regimens including two nucleoside analogs plus one non-nucleoside analog or one ritonavir-boosted protease inhibitor in HIV/HCV-coinfecting patients. *HIV Clin Trials* 2012;13:61-9.
5. Perez-Elias MJ, Morellon ML, Ortega E, Hernandez-Quero J, Rodriguez-Torres M, Clotet B, et al. Pharmacokinetics of fosamprenavir plus ritonavir in human immunodeficiency virus type 1-infected adult subjects with hepatic impairment. *Antimicrob Agents Chemother* 2009;53:5185-96.
6. Hernandez-Novoa B, Moreno A, Perez-Elias MJ, Quereda C, Dronda F, Casado JL, et al. Raltegravir pharmacokinetics in HIV/HCV-coinfecting patients with advanced liver cirrhosis (Child-Pugh C). *J Antimicrob Chemother* 2014;69:471-5.
7. Song I, Borland J, Savina P, Chen S, Patel P, Wajima W, et al. Pharmacokinetics of dolutegravir in subjects with moderate hepatic impairment. 19th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections March 5-8, 2012 Seattle, Washington Abstract 608.
8. Ficha técnica de simeprevir. [http://www.ema.europa.eu/docs/es\\_ES/document\\_library/EPAR\\_-\\_Product\\_Information/human/002777/WC500167867.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002777/WC500167867.pdf). (Consultada el 17.11.2014).
9. Ficha técnica de boceprevir. [http://www.ema.europa.eu/docs/es\\_ES/document\\_library/EPAR\\_-\\_Product\\_Information/human/002332/WC500109786.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002332/WC500109786.pdf). (Consultada el 17.11.2014).
10. Ficha técnica de telaprevir. Disponible en [http://www.ema.europa.eu/docs/es\\_ES/document\\_library/EPAR\\_-\\_Product\\_Information/human/002313/WC500115529.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002313/WC500115529.pdf). (Consultada el 17.11.2014).
11. Ficha técnica de sofosbuvir. Disponible en: [http://www.ema.europa.eu/docs/es\\_ES/document\\_library/EPAR\\_-\\_Product\\_Information/human/002798/WC500160597.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002798/WC500160597.pdf). (Consultada el 17.11.2014).
12. Ficha técnica de daclatasvir. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2014/20140822129304/anx\\_129304\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2014/20140822129304/anx_129304_es.pdf) (consultada el 17.11.2014).
13. Eley T, You X, Wang R, Luo WL, Huang SP, Kandoussi H, et al. Daclatasvir: overview of drug-drug interactions with antiretroviral agents and other common concomitant drugs. *HIV DART*. Miami, FL, December 9-12, 2014. Abstract No 63.

### 7.4.5. Neoplasias

Se recomienda la lectura de los dos documentos realizados por GeSIDA en los que se tratan de forma amplia las neoplasias<sup>1,2</sup>.

Los pacientes con cáncer que son sometidos a quimioterapia/radioterapia tienen riesgo de inmunodepresión y de disminución del recuento de los linfocitos CD4, lo que ya de por sí justificaría el inicio de TAR<sup>3</sup>. En este escenario es importante considerar el perfil de toxicidad y las posibles interacciones farmacocinéticas, principalmente de aquellos FAR que se metabolizan por la vía del CYP450, con los fármacos antineoplásicos<sup>4</sup>. Los IP/r se asocian a neutropenia más profunda y prolongada cuando se coadministran con la quimioterapia de los linfomas<sup>1</sup>; algunos de ellos (ATV, LPV y SQV) alargan el intervalo QT, lo que podría potenciar este efecto cuando se usan junto a muchos fármacos anticancerosos<sup>5</sup>. Además, en un estudio, presentaron mayor toxicidad, más interacciones y menor eficacia virológica que los ITINAN y RAL<sup>5</sup>.

### Recomendaciones

- El TAR es un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con infección por el VIH con sarcoma de Kaposi o linfomas no Hodgkin (**A-II**)
- En pacientes con otro tipo de neoplasias, como consideración general, si no llevan TAR, éste ha de empezarse tan pronto como sea posible (**A-II**)
- RAL por sus características farmacológicas, excelente tolerancia y mínimas interacciones, debe ser el FAR de elección en pacientes que reciban quimioterapia siempre que sea posible (**A-III**)

### Referencias bibliográficas

1. Miralles P, Berenguer J, Ribera Santasusana JM, Calvo F, Díaz Mediavilla J, Díez-Martín JL, et al. Recomendaciones de GeSIDA/PETHEMA sobre el diagnóstico y el tratamiento de los linfomas en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. *Med Clin (Barc)* 2008;130:300-11.
2. Santos J, Valencia E. Guía de práctica clínica sobre los tumores no defintorios de sida e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2014;32:515-22.
3. Torres HA, Mulanovich V. Management of HIV infection in patients with cancer receiving chemotherapy. *Clin Infect Dis* 2014;59:106-14.
4. Mounier N, Katlama C, Costagliola D, Chichmanian RM, Spano JP. Drug interactions between antineoplastic and antiretroviral therapies: Implications and management for clinical practice. *Crit Rev Oncol Hematol* 2009;72:10-20.
5. Torres HA, Rallapalli V, Saxena A, Granwehr BP, Viola GM, Ariza-Heredia E, et al. Efficacy and safety of antiretrovirals in HIV-infected patients with cancer. *Clin Microbiol Infect* 2014;20:O672-9.

## 8. COSTE COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES COMBINACIONES DE FÁRMACOS ANTIRRETRO-VIRALES

El TAR ha reducido la mortalidad relacionada con el sida y ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, su coste es elevado y, en un entorno donde los recursos son limitados, es necesario gestionar adecuadamente el presupuesto. En las diferentes combinaciones de TAR utilizadas como terapia de inicio existen diferencias sustanciales entre ellas: el gasto mensual con pautas de eficacia similar puede diferir en cantidades de más de 500 euros.

Una evaluación farmacoeconómica con objeto de determinar el posicionamiento de nuevas estrategias o de nuevos medicamentos debe contemplar no solamente el coste, sino también la eficacia (ensayos clínicos) o efectividad (práctica clínica habitual) de forma conjunta. Por este motivo, en los últimos años se publica conjuntamente con estas guías un estudio farma-

coeconómico<sup>1</sup> en el que se realiza una evaluación de costes y eficiencia (coste/eficacia) mediante construcción de árboles de decisión a partir de las pautas preferentes recomendadas.

El precio que el sistema Nacional de salud paga por un fármaco se obtiene a partir del precio de venta laboratorio (PVL) con la deducción obligatoria del 7,5% sobre el precio de compra de medicamentos no genéricos y no afectados por el sistema de precios de referencia (Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo: Medidas extraordinarias para la reducción del déficit público). En el caso de que hubieran transcurrido 10 años desde la fecha de inicio de financiación con fondos públicos (11 años en el caso de haber sido autorizada una nueva indicación) la deducción sería del 15 %, salvo en los medicamentos que cuenten con protección de patente de producto en todos los Estados miembros de la Unión Europea (Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto). Sin embargo, ninguno de los antirretrovirales incluidos en los regímenes recomendados como terapia de inicio tiene deducción del 15% en noviembre de 2014. A esta cifra habría que sumar el 4% IVA. Además cabe considerar que pueden existir variaciones entre los precios finales de adquisición entre Comunidades Autónomas e incluso entre distintos hospitales en una misma Comunidad.

Por ello es importante que cada centro utilice sus propios precios para obtener datos de eficiencia. A tal efecto, el estudiomencionado<sup>1</sup> ofrece una aplicación informática en la que introduciendo los precios que cada hospital paga se obtiene el posicionamiento de las distintas pautas de inicio. La aplicación puede descargarse de forma gratuita en la web de Gesida, en Guías clínicas ([http://www.gesida-seimc.org/guias\\_clinicas.php?mn\\_MP=406&mn\\_MS=407](http://www.gesida-seimc.org/guias_clinicas.php?mn_MP=406&mn_MS=407)) en el apartado *Costs and cost-efficacy analysis of the GESIDA/Spanish National AIDS Plan recommended guidelines for initial antiretroviral therapy in HIV-infected adults* (aplicación cálculo coste y eficacia).

Otra consideración a tener en cuenta es que los estudios fármaco-económicos probablemente subestimen la efectividad del TAR, dado que habitualmente no incluyen la reducción en el riesgo de transmisión de la enfermedad de los pacientes tratados. Este hecho puede tener un impacto económico importante.

### Recomendación

- Se recomienda incluir criterios de coste-efectividad en la toma de decisiones sobre el TAR de inicio **(A-III)**

### Referencias bibliográficas

1. Blasco A, Llibre JM, Arribas J, Boix V, Clotet B, Domingo P, et al. Cost/efficacy analysis of preferred Spanish AIDS study group regimens and the dual

therapy with lopinavir/ritonavir plus lamivudine for initial ART in HIV infected adults. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2015;(sometido a publicación).

## 9. TABLAS

**Tabla 1. Exploraciones complementarias en la valoración inicial y el seguimiento de los pacientes con infección por el VIH-1**

Actividad / Exploración	Valoración Inicial	Antes de iniciar el TAR	Seguimiento
Historia Clínica <sup>1</sup>	✓		
Evaluación clínica		✓	Cada 3-6 meses
Exploración física completa <sup>2</sup>	✓		Anual
Hemograma	✓	✓	Cada 3-6 meses
Bioquímica plasmática que incluya perfil hepático, renal (con FGe) y metabólico	✓	✓	Cada 3-6 meses
Determinación de TSH, vitamina D y proteinograma	✓	✓	Según indicación clínica
Análisis elemental de orina y sedimento. Bioquímica en muestra aislada de orina: proteinuria y cociente proteínas/creatinina (CPC) en orina.	✓	✓	Anual <sup>3</sup>
Serología a VHA, VHB, VHC y lúes	✓		Si son negativas, repetir anualmente si persisten factores de riesgo
Serología a Toxoplasma, CMV y VEB	✓		Según indicación clínica
Serología de <i>Trypanosoma cruzi</i> o <i>Strongyloides stercoralis</i> <sup>4</sup>	Optativo		
Carga viral del VIH-1	✓	✓	A las 4 semanas de iniciado el TAR y posteriormente cada 3-6 meses <sup>5</sup>
Determinación de linfocitos T CD4+	✓	✓	Cada 3-6 meses <sup>5</sup>
Estudio genotípico de resistencia	✓	✓	Si fracaso virológico
HLA B*5701	✓		
Tropismo viral <sup>6</sup>	Optativo	Optativo	
ARN VHC <sup>7</sup>	Optativo	Optativo	Según indicación clínica
Genotipo VHC <sup>7</sup>	Optativo		
ADN VHB <sup>8</sup>	Optativo	Optativo	Según indicación clínica
Alfa-feto-proteína <sup>9</sup>	Optativo	Optativo	Según indicación clínica
Pruebas del PPD o IGRA	✓		
Radiografía de tórax <sup>10</sup>	✓		
Ecografía hepática <sup>9</sup>	Optativo	Optativo	
Elastografía hepática <sup>9</sup>	Optativo	Optativo	
Esófago-gastroscopia <sup>11</sup>	Optativo	Optativo	
Citología cervical uterina <sup>12</sup>	✓		Si normal, repetir anualmente
Citología anal <sup>13</sup>	Optativo		Según indicación clínica
Electrocardiograma <sup>14</sup>	✓	Optativo	
Densitometría ósea <sup>15</sup>	Optativa	Optativa	Según indicación clínica

Nota: estas recomendaciones deben considerarse orientativas y pueden ser modificadas de acuerdo con el juicio clínico de los profesionales responsables de la atención al paciente.

✓ Realizar

<sup>1</sup> Debe incluir historia vacunal, sexual y de la pareja habitual.

<sup>2</sup> Debe incluir medida de la tensión arterial, peso, talla y medidas antropométricas.

<sup>3</sup> Si se usa TDF, realizar cada 3-4 meses. Si diabetes mellitus o hipertensión arterial, determinar además albuminuria y cociente albúmina/creatinina (CAC) en muestra aislada de orina.

<sup>4</sup> Optativo en personas procedentes de áreas con alta prevalencia de infestación, sobre todo si se sospecha la misma (p.e. eosinofilia).

<sup>5</sup> Se puede considerar determinar la CVP y los linfocitos T CD4+ con menos frecuencia (cada 6-12 meses) en pacientes clínicamente estables, con CVP repetidamente suprimida y cifras de linfocitos T CD4+ repetidamente superiores a 500 céls/μL.

<sup>6</sup> Realizar solo si se prevé utilizar MVC en el esquema terapéutico.

<sup>7</sup> Si co-infección por VHC.

<sup>8</sup> Si co-infección por VHB.

<sup>9</sup> Si co-infección por VHC, VHB u otra causa de daño hepático crónico, periodicidad según indicación clínica (c/ 6-12 meses).

<sup>10</sup> Especialmente en pacientes pertenecientes a poblaciones con una elevada prevalencia de tuberculosis.

<sup>11</sup> Si cirrosis hepática confirmada o elastografía >12,5 kPpa (F4), para descartar varices; periodicidad según indicación clínica.

<sup>12</sup> Si se detectan células atípicas, realizar colposcopia y biopsia.

<sup>13</sup> Debe realizarse inicialmente en todos los pacientes con hábitos de riesgo (varones homo/bisexuales y mujeres que practican coito anal receptivo) y en los que presentan lesiones perianales o genitales secundarias a VPH. Si citología anormal, debe realizarse anoscopia de alta resolución y biopsia (evidencia de beneficio desconocida; defendida por algunos expertos)

<sup>14</sup> Especialmente en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y/o que vayan a iniciar fármacos que puedan producir problemas de conducción cardíaca.

<sup>15</sup> Considerar en varones de más de 50 años y en mujeres postmenopáusicas

**Tabla 2. Indicaciones de TAR en pacientes con infección crónica por el VIH<sup>1</sup>**

<b>RECOMENDACIÓN GENERAL</b>	
Se recomienda la administración de TAR a todos los pacientes con infección por VIH <sup>2</sup> . La fuerza y gradación de la recomendación varía según las siguientes circunstancias:	
<b>Condición / circunstancia</b>	<b>Fuerza y gradación</b>
<b>Enfermedades B o C del CDC</b>	<i>A-I</i>
<b>Cifra de linfocitos T CD4+</b> <350/ $\mu$ L 350 a 500/ $\mu$ L >500/ $\mu$ L	<i>A-I</i> <i>A-II</i> <i>B-III</i>
<b>Comorbilidades</b> Nefropatía por VIH Hepatitis crónica por VHC Hepatitis crónica por VHB Edad $\geq$ 55 años Riesgo cardiovascular elevado Trastornos neurocognitivos Neoplasias	<i>A-II</i>
<b>Riesgo de transmisión</b> Mujeres gestantes Transmisión heterosexual Transmisión sexual entre varones	<i>A-I</i> <i>A-I</i> <i>A-III</i>

<sup>1</sup> Es importante hacer una valoración individualizada del momento de inicio del TAR y de los FAR que deben formar parte del régimen inicial, sopesando las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones.

La disposición y la motivación del paciente es un factor crítico a la hora de tomar la decisión de cuándo empezar.

<sup>2</sup> Se consideran como excepción los pacientes que mantienen carga viral indetectable de forma mantenida sin TAR (controladores de élite). En este caso no existe información que permita valorar el efecto beneficioso del TAR, por lo que no se puede establecer una recomendación de tratamiento.

**Tabla 3. Combinaciones de TAR de inicio recomendadas†**

3er Fármaco	Pauta†	Comentarios‡
<b>Preferentes.</b> Pautas que en ensayos clínicos aleatorizados han mostrado una eficacia superior frente a otras (menos fracasos virológicos y/o menos discontinuaciones por efectos adversos) y que presentan un bajo riesgo de interacciones farmacológicas. Son aplicables a la mayoría de los pacientes		
INI	ABC/3TC+DTG	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABC está contraindicado en pacientes con HLA-B*5701 positivo; cuando se prescriba se deben tomar las medidas necesarias para tratar de minimizar todos los FRCV modificables</li> <li>Una coformulación en un comprimido, aprobada por la EMA, no está disponible actualmente en España</li> <li>Información escasa en pacientes con CD4+ &lt;200 células/μL</li> </ul>
	TDF/FTC+DTG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar TDF con precaución en pacientes con factores de riesgo para insuficiencia renal; no se recomienda en pacientes con FGe &lt;50 mL/min a menos que no exista otra alternativa</li> <li>Información escasa en pacientes con CD4+ &lt;200 células/μL</li> </ul>
	TDF/FTC+RAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar TDF con precaución en pacientes con factores de riesgo para insuficiencia renal; no se recomienda en pacientes con FGe &lt;50 mL/min a menos que no exista otra alternativa</li> </ul>
<b>Alternativas.</b> Pautas eficaces, pero que no se consideran preferentes bien porque su eficacia ha resultado inferior a las pautas preferentes en ensayos clínicos o porque tienen desventajas potenciales o restricciones en su indicación. Pueden ser sin embargo de elección en algunos pacientes		
ITINN	TDF/FTC/RPV	<ul style="list-style-type: none"> <li>No indicado en pacientes con CVP &gt;100.000 copias/mL</li> <li>Pauta que puede ser de elección en pacientes con CVP &lt;100.000 copias/mL (más eficaz que TDF/FTC/EFV) en especial si se desea priorizar la simplicidad</li> <li>Información escasa en pacientes con CD4+ &lt;200 células/μL</li> <li>Realizar previamente un estudio genotípico que descarte mutaciones de resistencia a ITINN</li> <li>Contraindicado si se utilizan inhibidores de la bomba de protones</li> <li>Usar TDF con precaución en pacientes con factores de riesgo para insuficiencia renal; no se recomienda en pacientes con FGe &lt;50 mL/min a menos que no exista otra alternativa</li> <li>Se debe tomar siempre con una comida</li> </ul>
	TDF/FTC/EFV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar en mujeres que planean quedarse embarazadas y en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas o ideación suicida. Usar con precaución en pacientes que realicen tareas peligrosas</li> <li>Usar TDF con precaución en pacientes con factores de riesgo para insuficiencia renal; no se recomienda en pacientes con FGe &lt;50 mL/min a menos que no exista otra alternativa</li> <li>Se dispone de suficiente información con esta pauta en pacientes con CD4+ &lt;200 células/μL por lo que puede ser de elección en pacientes muy inmunodeprimidos especialmente si se desea priorizar la simplicidad (si está disponible en preparado coformulado).</li> <li>Realizar previamente un estudio genotípico que descarte mutaciones de resistencia a ITINN</li> </ul>
INI	TDF/FTC/EVG/COBI	<ul style="list-style-type: none"> <li>No indicado en pacientes con FGe &lt;70 ml/min. Usar con precaución en pacientes con FGe &lt;90 ml/min</li> <li>Puede considerarse de elección cuando se desea priorizar la simplicidad</li> <li>Información escasa en pacientes con CD4+ &lt; 200 células/μL</li> <li>Mayor potencial de interacciones que otras pautas</li> </ul>
	ABC/3TC+RAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABC está contraindicado en pacientes con HLA-B*5701 positivo; cuando se prescriba se deben tomar las medidas necesarias para tratar de minimizar todos los FRCV modificables</li> </ul>
IP/r	TDF/FTC+DRV/r o DRV/COBI*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar TDF con precaución en pacientes con factores de riesgo para insuficiencia renal; no se recomienda en pacientes con FGe &lt;50 mL/min a menos que no exista otra alternativa</li> <li>Se dispone de suficiente información con esta pauta en pacientes con CD4+ &lt;200 células/μL por lo que puede considerarse de elección en pacientes muy inmunodeprimidos, especialmente cuando se requiera de una pauta con elevada barrera genética (pacientes con problemas de adherencia)</li> <li>El uso combinado de IP/r y TDF incrementa el riesgo de nefrotoxicidad</li> <li>Mayor potencial de interacciones que otras pautas</li> </ul>
	TDF/FTC+ATV/r o ATV+COBI*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar si se utilizan inhibidores de la bomba de protones</li> <li>Usar TDF con precaución en pacientes con factores de riesgo para insuficiencia renal; no se recomienda en pacientes con FGe &lt;50 mL/min a menos que no exista otra alternativa</li> <li>Se dispone de suficiente información con esta pauta en pacientes con CD4+ &lt; 200 células/μL por lo que puede considerarse de elección en pacientes muy inmunodeprimidos, especialmente cuando se requiera de una pauta con elevada barrera genética (pacientes con problemas de adherencia)</li> <li>El uso combinado de IP/r y TDF incrementa el riesgo de nefrotoxicidad</li> <li>Mayor potencial de interacciones que otras pautas</li> </ul>
	ABC/3TC+ATV/r o ATV/COBI*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar en los pacientes con CVP &gt;100.000 copias/mL</li> <li>Evitar si se utilizan inhibidores de la bomba de protones</li> <li>ABC está contraindicado en pacientes con HLA-B*5701 positivo; cuando se prescriba se deben tomar las medidas necesarias para tratar de minimizar todos los FRCV modificables</li> <li>Mayor potencial de interacciones que otras pautas</li> </ul>



**Otras pautas posibles.** Estas pautas también han demostrado eficacia pero, o bien la evidencia se considera insuficiente o tiene desventajas respecto a las pautas consideradas preferentes o alternativas

ITINN	ABC/3TC+EFV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar en los pacientes con CVP &gt;100.000 copias/mL</li> <li>- Evitar en mujeres que planean quedarse embarazadas y en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas o ideación suicida. Usar con precaución en pacientes que realicen tareas peligrosas</li> <li>- Realizar previamente un estudio genotípico que descarte mutaciones de resistencia a ITINN</li> <li>- ABC está contraindicado en pacientes con HLA-B*5701 positivo; cuando se prescriba se deben tomar las medidas necesarias para tratar de minimizar todos los FRCV modificables</li> </ul>
	TDF/FTC+NVP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No iniciar en mujeres con CD4+ &gt;250 células/μL ni en varones con CD4+ &gt;400 células/μL</li> <li>- Realizar previamente un estudio genotípico que descarte mutaciones de resistencia a ITINN</li> <li>- Usar TDF con precaución en pacientes con factores de riesgo para insuficiencia renal; no se recomienda en pacientes con FGe &lt;50 mL/min a menos que no exista otra alternativa</li> </ul>
IP/r	ABC/3TC+DRV/r o DRV/COBI*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ABC está contraindicado en pacientes con HLA-B*5701 positivo; cuando se prescriba se deben tomar las medidas necesarias para tratar de minimizar todos los FRCV modificables</li> <li>- Evaluar posibles interacciones</li> </ul>
	TDF/FTC+LPV/r	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar en pacientes con hiperlipidemia y/o riesgo cardiovascular elevado</li> <li>- Usar TDF con precaución en pacientes con factores de riesgo para insuficiencia renal; no se recomienda en pacientes con FGe &lt;50 mL/min a menos que no exista otra alternativa</li> <li>- El uso combinado de IP/r y TDF incrementa el riesgo de nefrotoxicidad</li> </ul>
	ABC/3TC+LPV/r	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar en pacientes con hiperlipidemia y/o riesgo cardiovascular elevado</li> <li>- ABC está contraindicado en pacientes con HLA-B*5701 positivo; cuando se prescriba se deben tomar las medidas necesarias para tratar de minimizar todos los FRCV modificables</li> <li>- Mayor potencial de interacciones que otras pautas</li> </ul>
	3TC+LPV/r	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar en pacientes con hiperlipidemia y/o riesgo cardiovascular elevado.</li> <li>- Puede ser una alternativa a la triple terapia convencional cuando no se pueda utilizar TDF ni ABC</li> <li>- Mayor potencial de interacciones que otras pautas</li> </ul>
	RAL+DRV/r	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No utilizar en pacientes con recuento de CD4 &lt;200 células/μL</li> <li>- Evitar en los pacientes con CVP &gt;100.000 copias/mL</li> <li>- Puede ser una alternativa a la triple terapia convencional cuando no se pueda utilizar TDF ni ABC</li> <li>- Mayor potencial de interacciones que otras pautas</li> </ul>
	RAL+LPV/r	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar en pacientes con hiperlipidemia y/o riesgo cardiovascular elevado</li> <li>- No utilizar en pacientes con recuento de CD4 &lt;200 células/μL</li> <li>- Evitar en los pacientes con CVP &gt;100.000 copias/mL</li> <li>- Puede ser una alternativa a la triple terapia convencional cuando no se pueda utilizar TDF ni ABC</li> <li>- Mayor potencial de interacciones que otras pautas</li> </ul>

† Cuando estén disponibles, se recomienda el uso de preparados que combinen fármacos a dosis fijas. No existe en la actualidad suficiente información que permita considerar como equivalentes terapéuticos a FTC y 3TC, por lo que el uso de uno u otro fármaco en los regímenes seleccionados depende fundamentalmente de la experiencia disponible en su uso conjunto con los otros fármacos de la combinación.

Los ensayos clínicos en los que se fundamenta la evidencia de cada pauta se referencian en el texto.

En los fármacos de una misma familia terapéutica e igual nivel de recomendación, el orden refleja la preferencia de los miembros del panel.

‡ Los comentarios reflejan aspectos que se deben considerar en la elección de régimen, pero no pretenden ser una guía exhaustiva de las precauciones a tomar en el uso de los fármacos. Para mayor información se recomienda revisar el texto del documento así como las fichas técnicas de los fármacos.

En otro apartado de estas guías se tratan aspectos de precio y de costes de los diferentes regímenes terapéuticos. Simultáneamente con las guías se publica un artículo en el que se hace un análisis formal de coste/eficacia de las pautas recomendadas.

\* El uso de Cobicistat (COBI) como potenciador de DRV o ATV ha sido aprobado por la EMA, aunque en el momento de redactar estas guías, COBI no está comercializado en España como fármaco independiente. También se ha autorizado una coformulación de DRV/COBI en un único comprimido, que tampoco está disponible en nuestro país.

**Tabla 4. Recomendaciones sobre la necesidad de cambio de TAR asumiendo que mantendrán la supresión virológica**

ART actual	Motivo del cambio	Necesidad de cambio	Recomendación
AZT o D4T	Prevenir/revertir lipoatrofia	Obligado	<b>A-I</b>
EFV	Sintomatología SNC: mareo, trastornos del sueño	Obligado	<b>A-I</b>
TDF	Osteopenia/Osteoporosis. Si se demuestra una implicación directa de TDF y se corrigen otros factores causales	Variable dependiendo de la magnitud de pérdida de densidad mineral ósea y de la existencia o no de otros factores causales	<b>A-II</b>
EFV	Toxicidad SNC <i>subclínica</i>	No. No se ha demostrado beneficio	<b>A-II</b>
IP/r	Diarrea y otros síntomas gastrointestinales asociados a ritonavir	Obligado	<b>A-III</b>
TDF	Disminución del FGe, disfunción tubular si se demuestra una acción directa del de TDF y se corrigen otros factores	Variable dependiendo de la magnitud de descenso de FGe y de la disfunción tubular y de la existencias de otros factores causales	<b>A-III</b>
IP/r	Dislipidemia, alto riesgo cardiovascular	Variable. No se ha demostrado que el cambio sea mejor que el uso de hipolipemiantes ni el impacto sobre el riesgo cardiovascular	<b>B-III</b>
Múltiples comprimidos	Comprimido único	No se ha demostrado que el cambio sea necesario en la mayoría de los pacientes	<b>B-III</b>

**Tabla 5. Recomendaciones sobre cambio entre FAR de la misma clase según el motivo de cambio ordenados por evidencia sobre eficacia del cambio**

<b>TAR actual</b>	<b>Motivo del cambio</b>	<b>TAR nuevo</b>	<b>Recomendación</b>
AZT o D4T	Prevenir aparición o empeoramiento de lipoatrofia	ABC	<b>A-I</b>
AZT o D4T	Prevenir aparición o empeoramiento de lipoatrofia	TDF	<b>A-I</b>
ABC/3TC+ATV/r	Hiperbilirrubinemia, dislipidemia	ABC/3TC+ATV*	<b>A-I</b>
2 ITIAN + EFV o NVP	Disminución del número de comprimidos diarios	TDF/FTC/EFV y TDF/FTC/RPV	<b>A-I</b>
EFV	Sintomatología SNC	ETV NVP	<b>A-II</b>
TDF/FTC/EFV	Sintomatología SNC / dislipidemia	TDF/FTC/RPV	<b>A-II</b>
TDF	Osteopenia / Osteoporosis	ABC	<b>A-II</b>
2 ITIAN + LPV/r o ATV/r	Prevenir toxicidad por ITIAN	LPV/r+3TC o ATV/r+3TC	<b>A-I</b>
2 ITIN(t) + PI/r	Prevenir toxicidad por nucleos(t)idos	DRV/r o LPV/r monoterapia	<b>B-I</b>
TDF/FTC+ATV/r	Hiperbilirrubinemia, disminución FGe, disfunción tubular, osteopenia/osteoporosis	ABC/3TC+ATV*	<b>B-II</b>
EFV	Dislipidemia	NVP	<b>B-II</b>

\* solo debe hacerse si se puede garantizar la actividad antiviral de los dos ITIAN y ATV

**Tabla 6. Recomendaciones sobre cambios a FAR de una nueva clase según el motivo de cambio ordenados por evidencia sobre la eficacia del cambio**

TAR actual	Motivo del cambio	TAR nuevo	Recomendación
2 ITIAN + IP/r	Disminución nº pastillas, dislipidemia, síntomas gastrointestinales	TDF/FTC/RPV	<b>A-I</b>
TDF/FTC + EFV o NVP	Disminución nº pastillas, sintomatología SNC por EFV	TDF/FTC/COB/EVG	<b>A-I</b>
TDF/FTC + IP/r	Disminución nº pastillas, síntomas gastrointestinales	TDF/FTC/COB/EVG	<b>A-I</b>
ENF	Evitar administración parenteral	RAL	<b>A-I</b>
EFV	Sintomatología SNC	RAL	<b>A-II</b>
TDF/FTC + IP/r	Osteopenia/Osteoporosis	RAL + IP/r ± FTC	<b>A-II</b>
IP/r	Dislipidemia	RAL	<b>B-I</b>
EFV	Dislipidemia	RAL	<b>B-I</b>
2 ITIAN + IP/r	Disminución del número de pastillas diarias	TDF/FTC/EFV	<b>B-I</b>
IP/r	Dislipidemia	NVP	<b>B-III</b>

Sólo se han incluido cambios para los que al menos existe un ensayo clínico pertinente y existe análisis sobre el efecto adverso particular.

La recomendación es fuerte si existe al menos un ensayo clínico de calidad avalando una mejora de balance riesgo/beneficio tras el cambio

El cambio desde un pauta con dos ITIAN más un IP/r a dos ITIAN más un ITINN, RAL o EVG/COBI solo debe hacerse si se puede garantizar la actividad antiviral de los dos ITIAN y la del tercer fármaco acompañante

**Tabla 7. Principales ensayos clínicos de tratamiento antirretroviral en pacientes con fracaso virológico precoz y avanzado**

Fármaco E. Clínico	Criterios inclusión	Diseño	Brazos comparados	N	Endpoints 48 sem.	Principales conclusiones	Otros resultados
<b>Estudios rescate precoz</b>							
<b>DRV/r (ODIN)</b>	- CV >1000 copias - CD4+ >50 cels - No MR a DRV	Fase IIIb No inferioridad (Δ: -12%) ITT-TLOVR	- DRV/r 800/100 QD - DRV/r 600/100 BID (ambos + ITIAN)	294 296	- 72,1% < 50 copias - 70,9% <50 copias - Δ 1,2% (IC95% -6,1 a 8,5%)	DRV/r QD es no inferior a DRV/r BID en pacientes con FV sin mutaciones a DRV	- Los EAs inferiores en pauta QD (7,8%) frente a BID (15,2%) y con mejor perfil lipídico
<b>LPV/r mono (HIVSTAR)</b>	- TAR: 2 ITIAN+ ITNN - CV ≥ 1000 copias - IP naive	Fase IV Aleatorizado Abierto No inferioridad ITT	- LPV/r (monoterapia) - LPV/r+TDF+3TC	98 97	- 61% < 50 copias - 83% < 50 copias ITT p<0,01	- LPV/r mono es menos eficaz que LPV/r+TDF+3TC como terapia de 2ª línea	- CV> 5 u Log y presencia de TAMs se asociaron a más fracaso con LPVr-monoterapia
<b>LPV/r+RAL (SECOND-LINE)</b>	-CV >500copias -1 <sup>er</sup> TAR≥ 24 sem -Nunca LPV/r	Fase IIIb/4 Aleatorizado Abierto No inferioridad (Δ: -12%) en ITT	- LPV/r + RAL - LPV/r + 2/-ITIAN	271 270	- 83% < 200 copias 48 sem. - 81% < 200 copias 48 sem. Δ: 1,8% (IC95% -4,7 a 8,3)	- LPV/r + RAL es no inferior al estándar de tratamiento LPV/r + 2 ITIAN	- LPV/r + RAL es una terapia bien tolerada y segura - Permite ahorrar ITIAN - No precisa realizar test genotípico
<b>ETR (TMC125-C227)</b>	-CV>1000 copias/mL -FV a 1º TAR con EFV ó NVP -Resistencia a ITINN e ITIAN -Naive a IP	Fase II Aleatorizado Abierto	- ETR 800 mg BID - IP ó IP/r  Ambos con 2 ITIAN a criterio del investigador	59 57	Descenso CV-VIH (log <sub>10</sub> ) desde valor basal a semana 12 y 24: - ETR: -1.39 y -1.51 log <sub>10</sub> copias/mL - IP: -2.16 y -2.13 log <sub>10</sub> copias/mL	- ETR es inferior a IP, ambos con 2 ITIAN en pacientes con FV y MR a ITINN e ITIAN. - La presencia de MR basales fue la principal razón del FV	- Diferencia (ETR vs DRV/r) porcentaje de sujetos con CV < 50 c/mL en semana 12 fue -27.8% (95% CI:-46.8%, -8.8%)
<b>Estudios rescate avanzado</b>							
<b>DRV/r (TITAN)</b>	-CV >1000copias -TAR≥ 12 sem -Nunca LPV/r , TVR, DRV o ENF	Fase III Aleatorizado No ciego No inferioridad (Δ: -12%) ITT	- DRV/r BID +TO - LPV/r BID +TO	298 297	- 71% <50cop (77%<400 copias) - 60% <50cop (68%<400 copias) Δ 11%(IC95%: 3-19) <50cop Δ 9%(IC95%: 2-16) < 400 copias	DRV/r no inferior LPV/r y cumple criterios de superioridad para CV<50 copias y 400 copias	- DRV/r > LPV/r si CV> 5uLog - FV 10% (DRV), 22% (LPV) - MR a IP e ITIAN más frecuentes con LPV

<b>DRV/r (POWER I/II)</b>	- CV >1000copias - Multifracaso - MR a IP $\geq 1$	Fase IIB Aleatorizado ITT-LOVR	- DRV/r BID 600/100 +TO - IP/r comparador +TO	131 124	- 45% <50cop - 10%<50cop $\Delta$ 37%(IC95%:25-46) <50cop	DRV/r 600/100 BID > IP/r comparador	- La superioridad de DRV/r fue independiente del uso de ENF, CV basal, nº mut. a IP o fármacos activos en la TO
<b>RAL (BENCHMRK I/II)</b>	- CV >1000copias, mientras reciben TAR - Resistencia documentada al menos a un fármaco de las 3 familias: ITIAN, ITINN e IP	Fase III Aleatorizado Doble ciego	- RAL + TO - Placebo + TO	462 237	- 62,1% < 50 copias sem 48 - 32,9% <50 copias sem 48 p <0,001	En pacientes VIH con opciones limitadas, RAL + TO es superior a placebo + TO	- Cuando RAL se asoció a DRV/r + ENF la eficacia fue del 98% - La seguridad de RAL fue similar a placebo - RAL presenta una barrera genética baja
<b>ETV (DUET I/II)</b>	- > 8 sem. con TAR - CV > 5000 copias - $\geq 1$ MR ITIAN - $\geq 3$ MR IP	Fase III Aleatorizado Doble ciego	- DRV/r + ETV - DRV/r + placebo (ambos + ITIAN)	599 604	- 61%, <50copias - 40%, <50 copias p<0,0001	-ETV es superior a placebo en pacientes con FV y experiencia a varios TAR	- 91% de los pacientes con CV <50 copias sem 48 persisten en la sem. 96 con <50copias - Los eventos de sida y muerte disminuyeron en pacientes con ETV + ENF
<b>MVC (MOTIVATE I/II)</b>	- CV > 5000 copias - Tropismo R5 - FV a ITIAN, NN e IP	Fase III Aleatorizado Doble ciego	-MVC QD + TO -MVC BID + TO -Placebo +TO	414 426 209	CV<50 copias: 43,2% CV<50 copias: 45,5% CV<50 copias: 16,7% p <0,001	MRV es superior a placebo en pacientes con tropismo R5	-CV<50 copias:64% (TO+ENF) -CV<50 copias:61% (TO+ENF) -CV<50 copias:27% (TO+ENF)
<b>DRV/RAL/ETV (TRIO)</b>	-CV >1000 copias - Naive a DRV/ETV/RAL - FV durante TAR - $\geq 3$ mut. proteasa (sensible DRV) - $\geq 3$ mut. ITIAN - Susceptible a ETV	Fase II Abierto No comparativo	- DRV/r 600/100 BID + RAL 400mg BID + ETV 200mg BID	103	- CV < 50 copias Sem 24: 95% (IC95% 85-96%) - CV < 50 copias Sem 48: 86% (IC95%: 80-93%)	La eficacia de DRV/r + ETV + RAL es muy eficaz en pacientes con pocas opciones	- La mediana de CD4+ se incremento en 108 cels/mm <sup>3</sup> - Incidencia EAs grado 3/4: 14,6%
<b>EVG/r(GS-US-183-0145)</b>	-CV>1000 copias - MR o más de 6 meses $\geq 2$ clases de FARV	Fase III Doble ciego, Aleatorizado No inferioridad $\Delta$ : -10% en ITT	- EVG 150mg (85mg si LPV/r o ATV/r) - RAL 400mg/BID Ambas pautas con IP/r y otro FAR activo	361 363	-CV < 50 copias: 59% - CV <50 copias: 58% $\Delta$ : 1,1% (IC95% -6,0 a 8,2)	EVG en combinación es no inferior a RAL ambos con un IP/r	- La administración de EVG es QD. No diferencias de efectos adversos entre ambos brazos

<b>DTG (SAILING)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV <math>\geq 1000</math> copias/mL</li> <li>- Resistencia <math>\geq 2</math> familias de FAR</li> <li>- 1 ó 2 FAR activos en la TO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase III</li> <li>- Aleatorizado</li> <li>- Doble ciego</li> <li>- No inferioridad (<math>\Delta</math>-12%) en ITT</li> <li>- Análisis superioridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-DTG 50 mg. QD +TO</li> <li>-RAL 400mg. BID + TO</li> </ul>	354 361	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 71% &lt; 50 copias sem. 48</li> <li>- 64% &lt; 50 copias sem. 48</li> <li><math>\Delta</math>: 7,4% (IC95% 0,7 a 14,2%) en ITT</li> </ul>	DTG 50 mg QD. es superior a RAL BID ambos con TO en pacientes con FV y experiencia previa a TAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los pacientes con DTG presentaron menos FV y menos mutaciones de resistencia a InInt</li> <li>- Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos</li> </ul>
<b>DTG (VIKING I-II)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV <math>\geq 1000</math> copias/mL</li> <li>- Resistencia genotípica a RAL</li> <li>- Resistencia a ITIAN, ITNN, IF o IP</li> <li>- <math>\geq 1</math> FAR activo en TO de la cohorte 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Fase IIb</li> <li>-2 cohortes</li> <li>-1ª fase monoterapia funcional: DTG</li> <li>- 2ª fase DTG +TO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-DTG 50 mg. BID +TO</li> <li>-DTG 50mg. QD + TO</li> </ul>	24 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 75% &lt; 50 copias 24 sem.</li> <li>- 41% &lt; 50 copias 24 sem.</li> </ul>	DTG 50mg. BID + TO es más eficaz que DTG QD en pacientes con resistencia a RAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La toxicidad fue similar en ambos grupos</li> <li>- Selección resistencias a InInt: &lt;15% de todos los pacientes</li> <li>- No se detectaron nuevas mutaciones a InInt</li> </ul>
<b>DTG (VIKING-III)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV <math>\geq 500</math> copias./mL</li> <li>- Resistencia genotípica a RAL/EVG</li> <li>- Resistencia a <math>\geq 2</math> familias de FAR</li> <li>- <math>\geq 1</math> FAR activo en TO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Fase III</li> <li>- Abierto, brazo único</li> </ul>	DTG 50mg BID + TO	183	- 69% < 50 copias/mL. 24 sem	DTG 50mg. BID + TO es eficaz en pacientes con fracaso previo a RAL o EVG y otros FAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La presencia de MR basales: Q148+<math>\geq 2</math> mutaciones a InInt reduce la eficacia de DTG</li> <li>- La tasa de suspensión por efectos adversos con DTG 50mg BID es baja (3%)</li> </ul>



**Tabla 8. Efectos secundarios tardíos más característicos de los antirretrovirales más utilizados en la actualidad**

<b>Fármacos</b>	<b>Efectos adversos</b>
Tenofovir (Factores de riesgo: afectación renal u ósea previas, presencia de factores de riesgo convencionales, duración de la exposición a TDF y concomitancia de tratamiento con IP/r)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descenso del filtrado glomerular. Puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal</li> <li>• Disminución de la densidad mineral ósea. Puede aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas</li> <li>• Puede producir hipofosfatemia por tubulopatía proximal renal y agravar un eventual déficit de vitamina D</li> </ul>
Abacavir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha asociado a riesgo de infarto de miocardio en pacientes con alto riesgo cardiovascular, aunque este efecto clínico es controvertido</li> </ul>
Inhibidores de la proteasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular por su efecto lipídico y quizás por otros efectos que no se conocen bien</li> <li>• LPV/r ha sido asociado a un mayor riesgo de infarto de miocardio, ATV no ha sido asociado a infarto de miocardio, y sobre DRV/r no se dispone de información al respecto</li> <li>• ATV puede producir hiperbilirrubinemia y excepcionalmente ictericia y colelitiasis</li> <li>• LPV/r y ATV/r (no hay datos de DRV/r) se han asociado a un mayor riesgo de disminución del filtrado glomerular estimado, aunque este efecto clínico es controvertido y podría deberse a la interacción con TDF cuando se administran concomitantemente</li> <li>• ATV/r y DRV/r se han asociado a litiasis renal</li> </ul>
Efavirenz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trastornos neuropsicológicos mantenidos, (aunque sean de bajo grado pueden resultar difíciles de tolerar a largo plazo)</li> <li>• Se ha asociado a un mayor riesgo de deterioro neurocognitivo, aunque este efecto clínico es controvertido. En cultivos neuronales induce neurotoxicidad</li> <li>• Disminuye el nivel plasmático de 25-OH vitamina D, pero el significado clínico de esta alteración es desconocido</li> <li>• Se ha asociado a ginecomastia, aunque este efecto clínico es controvertido</li> <li>• Puede ser teratogénico y está contraindicado en mujeres que deseen quedarse embarazadas</li> </ul>

**Tabla 9. Antirretrovirales como sustratos, inductores e inhibidores del citocromo P-450, glucuronidación (UGT), glicoproteína-P (P-gp) y otros transportadores. Asociaciones contraindicadas o no recomendadas**

(Sólo se incluyen las alternativas a en estos casos; no se incluyen otras asociaciones que requieren ajuste de dosis o mayor seguimiento: véanse otras fuentes de información. No se incluye información de fármacos retirados del mercado como astemizol, bepridilo o cisaprida ni de los que todavía no están comercializados como rifapentina)

Clase	Antirretroviral	§ Es sustrato de:	§ Es inductor de:	§ Es inhibidor de:
ITINN	Efavirenz	<b>CYP2B6, 3A4</b> <b>Glucuronidación</b> UGT2B7	<b>CYP3A4</b> <b>CYP2C19</b> ( <i>in vivo</i> ; voluntarios sanos) <b>CYP 2B6</b> <b>Glucuronidación</b> <b>(UGT1A1)</b>  <b>Autoinduce su propio metabolismo</b>	<b>CYP2C9 y 2C19</b> ( <i>in vitro</i> ; sin embargo, <i>in vivo</i> ha habido informes contradictorios tanto de exposiciones aumentadas como disminuidas a sustratos de estas enzimas coadministrados con efavirenz. El efecto neto no está claro). <b>3A4</b> ( <i>in vitro</i> ) CYP2C8 UGT1A9 y UGT1A4 ( <i>in vitro</i> ) P-gp
		<b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con efavirenz:</b>		
		<b>Antirretrovirales:</b> ATV/r <sup>§</sup> (considerar ATV/r 400/100 mg c/24h en naive; evitar en pretratados) DRV/r 800/100 mg/24h (emplear DRV/r 600/100 mg/12h) ETR FPV no potenciado (emplear FPV/r 700/100 mg/12h) LVP/r (considerar LVP/r 500/125mg /12h -5 comp de 100/25mg por toma) MVC: ↑MVC 600mg/12h (en ausencia de inhibidores potentes del CYP3A4; en presencia de los mismos 150 mg/12 de MVC) NVP RPV SQV no potenciado.	<b>VHC:</b> Boceprevir contraindicado (Nota: con telaprevir permitido ↑ TVR a 1125 mg/8h)	<b>Otros:</b> Anticonceptivos orales (emplear métodos de barrera) Amodiaquina Atovacuona Carbamacepina Claritromicina (para tratamiento de MAC, valorar azitromicina) Deriv. Ergotamina Gingko biloba (extracto) Hipericum (hierba de S. Juan) Itraconazol Ketoconazol Midazolam Pimozida Posaconazol Proguanilo Terfenadina Triazolam Voriconazol (evitar/ajustar dosis. Según datos farmacocinéticos: 400 mg/12h de voriconazol + 300 mg/24h de EFV) ) Zumo de pomelo
		<b>CYP3A4, 2B6, 2D6</b> <b>Glucuronidación</b> P-gp	<b>CYP3A4 (induce su propio metabolismo), 2B6</b> P-gp	--
	Nevirapina	<b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con nevirapina:</b>		
		<b>Antirretrovirales:</b> ATV/r EFV ETR EVG/COBI FPV no potenciado LPV/r (se recomienda LVP/r 500/125 mg/12h -5 comp de 100/25mg por toma- ) RPV SQV no potenciado	<b>VHC:</b> Boceprevir y telaprevir (por ausencia de datos)	<b>Otros:</b> Anticonceptivos orales (emplear métodos de barrera o medroxiprogesterona depot) Claritromicina (para tratamiento de MAC, valorar azitromicina) <i>Hypericum</i> (Hierba de San Juan) Ketoconazol Itraconazol Rifampicina Voriconazol

Clase	Antirretroviral	§ Es sustrato de:	§ Es inductor de:	§ Es inhibidor de:
	Etravirina	<b>CYP3A4, CYP2C9/19</b> CYP2C18 <b>glucuronidación</b> (UGT1A3 y UGT1A8) (No es sustrato de P-gP)	<b>CYP3A4 (débil)</b>	<b>CYP2C9/19 (débil)</b> <b>P-gp (débil)</b>
		<b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con etravirina:</b>		
		<b>Antirretrovirales:</b> DTG: etravirina solo debe emplearse con dolutegravir si se asocian a ATV/r, DRV/r ó LPV/r. EFV IP no potencia-dos. NVP RPV TPV/r  <b>(Nota:</b> en combinación con DRV/r 600/100 mg/12h ETR debe administrarse 2 veces al día: 200 mg/12h)	<b>VHC:</b> ( <b>nota:</b> boceprevir reduce un 29% la C <sub>min</sub> de ETR, significado clínico no establecido; ETR puede asociarse con telaprevir sin ajuste de dosis)	<b>Otros:</b> Carbamacepina Claritromicina (para tratamiento de MAC, valorar azitromicina) Clopidogrel (teóricamente: ETR podría reducir la formación del metabolito activo de clopidogrel, significado clínico no establecido) Dexametasona (considerar alternativa a dexametasona, especialmente en uso crónico) Diazepam Fenitoína Fenobarbital <i>Hypericum</i> (Hierba de San Juan) Itraconazol Ketoconazol Posaconazol Rifampicina
	Rilpivirina	<b>CYP3A4</b> (No es sustrato de P-gP)	--	<b>P-gp (<i>in vitro</i>; aunque no afectó la farmacocinética de digoxina, no se puede descartar acúmulo de otros sustratos más sensibles de la P-gp como dabigaran: precaución)</b> <b>MATE-2K (<i>in vitro</i>; significado clínico incierto)</b>
		<b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con rilpivirina:</b> en general, fármacos que puedan aumentar el metabolismo de RPV (inductores del CYP3A4) o alterar el pH gástrico (inhibidores de la bomba de protones contraindicados)( <b>Nota:</b> puede darse con antihistamínicos H2 tipo ranitidina: 12 horas antes o 4 horas después de rilpivirina; con antiácidos: 2 horas antes o 4 horas después de RPV). <b>Nota:</b> en voluntarios dosis mayores a las terapéuticas de RPV (75 mg una vez al día y 300 mg una vez al día) prolongaron el intervalo QTc en el ECG. A la dosis de 25 mg/24h no se produce efecto clínicamente relevante sobre el intervalo QT. Usar con precaución conjuntamente con medicamentos que tienen un riesgo conocido de <i>Torsade de Pointes</i> .		
		<b>Antirretrovirales:</b> Efavirenz Etravirina Nevirapina	<b>VHC:</b> ( <b>Nota:</b> puede asociarse con boceprevir y telaprevir. Dado que ambos aumentan niveles de rilpivirina, precaución en pacientes con riesgo ↑QT)	<b>Otros:</b> Carbamacepina Claritromicina (no hay datos: ↑RPV, ambos↑QT, considerar azitromicina) Dexametasona vía sistémica (excepto dosis única) Eritromicina (no hay datos: ↑RPV, ambos↑QT, considerar azitromicina) Esomeprazol,

				Fenitoína Fenobarbital <i>Hypericum</i> (Hierba de San Juan) Lansoprazol Omeprazol, Oxcarbacepina Pantoprazol Rabeprazol Rifabutina ( <b>nota:</b> puede asociarse RPV con rifabutina: ↑RPV a 50 mg/día) Rifampicina ( <b>nota:</b> puede asociarse RPV con rifabutina: ↑RPV a 50 mg/día)
--	--	--	--	--

Clase	Antirretroviral	§ Es sustrato de:	§ Es inductor de:	§ Es inhibidor de:
IP	Atazanavir	<b>CYP3A4</b> <b>Glucuronidación</b> P-gp	CYP2C8 (con ATV/r) Una interacción clínicamente importante entre ATV/r y los sustratos del CYP2C8 es poco probable. §	<b>CYP3A4</b> CYP2C8 (débil) § UGT 1A1 § y UGT 1A3 P-gp (moderado)***
	Darunavir/r	véase ritonavir		
	Fosamprenavir/r	véase ritonavir		
	Indinavir/r	véase ritonavir		
	Lopinavir/r	véase ritonavir		
	Ritonavir	<b>CYP3A4&gt;CYP2D6</b> <b>P-gp</b>	<b>CYP1A2, 2B6</b> <b>2C19</b> (potente) y en menor medida <b>2C9, 2C8</b> (in vivo), <b>glucuronidación</b> (UGT1A4) Autoinduce su propio metabolismo	<b>CYP3A4 (potente) y 2D6 (potente)</b> <b>P-gp (potente inicialmente; puede reducirse en el transcurso del tiempo)***</b>
	Saquinavir	véase ritonavir		
	Tipranavir/r (en estado de equilibrio)*	<b>CYP3A4</b> <b>P-gp</b>	<b>1A2 (moderado)</b> <b>2C9 (leve)</b> CYP2B6 glucuronidación <b>P-gp (efecto inhibidor significativo tras primera dosis y efecto inductor mínimo tras uso continuado)</b>	<b>CYP3A4 intestinal (potente)</b> <b>CYP3A4 hepático (moderado)</b> <b>2D6 (potente)</b> CYP2C8**
	IP/r	<p><b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con IP potenciados con ritonavir:</b> Con ATV/r: fármacos que puedan alterar el pH gástrico: inhibidores de la bomba de protones -IBP- contraindicados. Si IBP inevitable, ATV/r 400/100 mg/24h y estrecha monitorización. La dosis diaria del IBP no debe exceder 20 mg de omeprazol o su equivalente y debe administrarse 12 antes de ATV/r.) (<b>Nota:</b> en pacientes que no estén tomando tenofovir pueden administrarse antihistamínicos H2 sin superar una dosis equivalente a 20 mg de famotidina dos veces al día. Si fuese necesaria una dosis mayor, equivalente a 40 mg de famotidina dos veces al día como máximo, considerar ATV/r 400/100 mg/24h. En pacientes que estén tomando tenofovir, si se administra una antihistamínicos H2 dosificar ATV/r 400/100 mg/24h y no superar 40 mg/12h de famotidina o equivalente. Es preferible administrar ATV/r 10 horas después ó 2 horas antes de los antihistamínicos H2. Los antiácidos deben administrarse 1 hora antes ó 2 horas después de atazanavir) Evitar también fármacos de estrecho margen terapéutico que sean metabolizados mayoritariamente mediante CYP3A4 ó CYP2D6, que pueden acumularse y presentar toxicidad importante.</p> <p>Con ATV/r, LPV/r y SQV/r: Evitar fármacos que puedan prolongar el intervalo QT</p>		
		<b>Antirretrovirales:</b>  ATV/r + NVP  ATV/r + EFV (considerar ATV/r 400/200 mg c/24h en naive; evitar en pretratados)  DRV/r + EFV: emplear DRV/r	<b>VHC:</b> <b>Nota:</b> sólo está permitido el uso de ATV/r con telaprevir, monitorizando ↑ bilirrubina. Boceprevir + ATV/r: esta coadministración podría valorarse caso a caso cuando se considere necesario, en pacientes con cargas virales del VIH suprimidas y con cepas virales del VIH sin sospecha de resistencia al tratamiento frente al VIH. (se alcanzan niveles similares al uso de ATV no potenciado) El resto de IP/r no deben asociarse a	<b>Otros:</b> Alfuzosina Amiodarona Anfetamina, derivados Anticonceptivos orales (Nota: con ATV/r puede emplearse un anticonceptivo oral que contenga mínimo 30 µg de Etinilestradiol) Avanafil Budesonida (incluso inhalada)

		<p>600/100 mg/12h)</p> <p>DRV/r 600/100 mg/12h + ETR: emplear ETR dos veces al día: 200 mg/12h.</p> <p>LPV/r + EFV ó NVP: considerar LVP/r 500/125mg /12h -5 comp de 100/25mg por toma</p>	<p>boceprevir o telaprevir.</p>	<p>Cloracepato</p> <p>Clozapina</p> <p>Colchicina (si insuf. renal o hepática)( <b>Nota:</b> si insuf. renal o hepática normales, usar dosis reducidas de colchicina) (<b>Nota:</b> dexametasona en uso prolongado puede reducir las concentraciones de los IP; precaución)</p> <p>Dextropropoxifeno</p> <p>Diazepam</p> <p>Deriv. ergotamina</p> <p>Disulfiram (no asociar a soluciones de Norvir® y Kaletra®)</p> <p>Encainida</p> <p>Estazolam,</p> <p>Éxtasis</p> <p>Fenitoína y fenobarbital (evitar o monitorizar estrechamente niveles de antirretroviral y antiepiléptico).</p> <p>Flecainida</p> <p>Fluracepam</p> <p>Fusídico, ácido</p> <p>Fluticasona (valorar beclometasona)</p> <p>Halofantrina</p> <p>Hypericum (Hierba de San Juan)</p> <p>Irinotecan: con ATV/r</p> <p>Lidocaína sistémica</p> <p>Lovastatina</p> <p>Lumefantrina</p> <p>Meperidina o petidina</p> <p>Metanfetamina</p> <p>Metronidazol con las soluciones de Norvir® y Kaletra® (posible reacción de tipo disulfiram)</p> <p>Midazolam oral</p> <p>Pimozida</p> <p>Piroxicam</p> <p>Propafenona</p> <p>Quetiapina</p> <p>Quinidina</p> <p>Rifampicina (valorar rifabutina 150 mg/día)</p> <p>Rivaroxaban</p> <p>Salmeterol</p> <p>Sertindol</p> <p>Sildenafil (hipertensión pulmonar)</p> <p>Simvastatina</p> <p>Terfenadina</p> <p>Triazolam</p> <p>Vardenafilo</p> <p>Voriconazol</p>
--	--	--	---------------------------------	---

Clase	Antirretroviral	§ Es sustrato de:	§ Es inductor de:	§ Es inhibidor de:
	ATV no potenciado	<b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con atazanavir no potenciado:</b> En general, fármacos que puedan aumentar el metabolismo de atazanavir (inductores del CYP3A4) o alterar el pH gástrico (inhibidores de la bomba de protones - IBP-contraindicados). ( <b>nota:</b> puede darse con antihistamínicos H2 tipo ranitidina: 10 horas antes o 2 horas después de atazanavir; Los antiácidos deben administrarse 1 hora antes ó 2 horas después de atazanavir) Evitar fármacos que puedan prolongar el intervalo QT		
		<b>Antirretrovirales:</b> Didanosina en comp. tamponados: administrar ATV 2h antes ó 1h después de didanosina. Efavirenz (considerar ATV/r 400/100 mg c/24h en naive; evitar en pretratados) Indinavir Nevirapina Tenofovir (emplear ATV/r)	<b>VHC:</b> No asociar atazanavir no potenciado con boceprevir o telaprevir (ausencia de datos)	<b>Otros:</b> Alfuzosina Bosentan (emplear ATV/r y ajustar dosis de bosentan) Buprenorfina (emplear ATV/r) Carbamacepina Claritromicina: para MAI reducir 50% dosis de claritromicina; otras indicaciones: valorar azitromicina. Colchicina (si insuf. renal o hepática)( <b>Nota:</b> si insuf. renal o hepática normales, usar dosis reducidas de colchicina) Deriv. ergotamina Esomeprazol Fenitoína Fenobarbital ( <b>Nota:</b> fluticasona: precaución especialmente en uso a largo plazo) Hypericum (Hierba de San Juan) Irinotecan Lansoprazol Lovastatina Midazolam oral Omeprazol Oxcarbacepina Pantoprazol Pimozida Rabeprazol Rifampicina Salmeterol Sertindol Sildenafil (Hipertensión pulmonar; valorar tadalafilo ajustando dosis). Simvastatina Triazolam
Inhibidores de la fusión	Enfuvirtida	<b>Al ser un péptido se elimina mediante catabolismo proteico. No es sustrato ni influye en la actividad del citocromo P-450.</b> Ausencia de interacciones clínicamente importantes.		
Antagonistas CCR5	Maraviroc	<b>CYP3A4 P-gp</b>	<b>Otros medicamentos que actúan sobre el CYP3A4 pueden modificar las concentraciones de maraviroc. Sin embargo, es poco probable que maraviroc modifique las concentraciones de otros fármacos.</b> <b>Maraviroc <i>in vitro</i> inhibe la P-gp. Maraviroc no afectó la farmacocinética de digoxina; sin embargo, no se puede descartar un acúmulo de otros sustratos más sensibles de la P-gp como dabigatran.</b>	
		<b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con maraviroc:</b>		



		En general, combinaciones de dos inductores enzimáticos importantes (p.ej: rifampicina+efavirenz)		
		<b>Antiretrovirales:</b> FPV/r	<b>VHC:</b> (Nota: puede asociarse con boceprevir y telaprevir ajustando maraviroc a 150 mg/12h).	<b>Otros:</b> <i>Hypericum</i> (Hierba de San Juan)

Clase	Antirretroviral	§ Es sustrato de:	§ Es inductor de:	§ Es inhibidor de:
Inhibidores de la integrasa del HIV	Raltegravir	<b>UGT1A1 (No es sustrato del citocromo P-450)</b> P-gp no juega un papel importante	--	<b>In vitro: no inhibe UGT1A1 ni UGT2B7; sin embargo según un estudio clínico, in vivo puede existir cierta inhibición de la UGT1A1</b> <b>No inhibe P-gp</b>
		<b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con raltegravir:</b> No se recomienda su administración simultánea con antiácidos que contienen aluminio y/o magnesio: espaciar 4h. No se han descrito otras asociaciones contraindicadas o no recomendadas con raltegravir. Con rifampicina, la ficha técnica del producto recomienda valorar aumento de dosis de RAL a 800 mg/12h; se está investigando la posibilidad de mantener la dosis estándar. No hay datos con otros inductores potentes del UGT1A1 como carbamazepina, fenobarbital o fenitoína. (Nota: raltegravir puede asociarse a telaprevir y boceprevir sin que se requiera ajuste de dosis)		
	Dolutegravir	<b>UGT1A1 (mayoritario) CYP3A4 (minoritario)</b> <b>In vitro es sustrato de UGT1A3, UGT1A9 y de los transportadores BCRP y P-gp</b>		<b>Transportadores OCT2 y MATE.</b> <b>(La inhibición de los transportadores OAT1 y 3 probablemente carezca de importancia clínica in vivo)<sup>y</sup></b> <b>P-gp: una interacción parece poco probable</b> <b>No inhibe UGT1A1 ni 2B7.</b>
		<b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con dolutegravir:</b> En general, fármacos que puedan aumentar su metabolismo (inductores del CYP3A4) ó que contengan cationes como los antiácidos y sean administrados simultáneamente (debe administrarse dolutegravir 2h antes ó 6h después de los cationes).		
		<b>Antirretrovirales:</b> Etravirina (si no va asociada a IPs) <b>Nota:</b> con inductores como efavirenz, nevirapina ó tipranavir dosificar dolutegravir 50 mg/12h o considerar alternativas. Esta pauta solo se recomienda en ausencia de resistencia a inhibidores de la integrasa. FPV/r: evitar en presencia de resistencia a inhibidores de la integrasa. En ausencia de resistencia no se requiere ajuste de dosis.	<b>VHC:</b> (Nota: dolutegravir puede asociarse a telaprevir y boceprevir sin que se requiera ajuste de dosis)	<b>Otros:</b> Carbamazepina Fenitoína Fenobarbital <i>Hypericum</i> (Hierba de San Juan) Oxcarbazepina Medicamentos que contengan cationes: antiácidos, laxantes, sucralfato, hierro, calcio, administrados simultáneamente. (debe administrarse dolutegravir 2h antes ó 6h después).  <b>Nota:</b> con rifampicina, dosificar dolutegravir 50 mg/12h o considerar alternativas. Esta pauta solo se recomienda en ausencia de resistencia a inhibidores de la integrasa.
	Elvitegravir (ver también cobicistat, que se emplea como potenciador farmacocinético)	<b>CYP3A4 (mayoritario) UGT1A1/1A3 (minoritarios)</b>	<b>Inductor de escasa potencia sobre CYP2C9 y UGT e Inductor débil de CYP3A4</b>	Inhibidor débil de P-gp

Potenciador fármaco-cinético	Cobicistat	<b>CYP3A4 (mayoritario)</b> <b>CYP2D6 (minoritario)</b>  <b>(no es sustrato de UGT)</b>		<b>CYP3A4</b> (potente) <b>CYP2D6</b> (débil) <b>P-gp</b> (potencia similar a RTV) <b>BCRP</b> en intestino <b>OATP1B1 y OATP1B3</b> en hígado
<b>Asociaciones contraindicadas o no recomendadas con elvitegravir/cobicistat:</b> En general, evitar fármacos que puedan reducir su eficacia (inductores del CYP3A4) o los antiácidos (espaciando 4h el antiácido se evita esta interacción). Evitar también fármacos de estrecho margen terapéutico que sean metabolizados mayoritariamente mediante el CYP3A4, que pueden acumularse y presentar toxicidad importante.				
		<b>Antirretrovirales:</b> Stribild® es una combinación de ARV, por lo que no debe asociarse a otros ARV.	<b>VHC: (Nota:</b> elvitegravir puede asociarse a telaprevir sin que se requiera ajuste de dosis; no hay datos con boceprevir)	<b>Otros:</b> Alfuzosina Anticonceptivos orales: utilizar un anticonceptivo hormonal que contenga mínimo 30 µg de etinilestradiol y que contenga norgestimato como progestágeno, o usar un método alternativo fiable. No hay datos con otros progestágenos: evitar. Antiácidos de Al/Mg simultáneamente (espaciar 4 horas) Atorvastatina (evitar o valorar beneficio/riesgo y emplear la mínima dosis posible) Bosentan Carbamacepina Colchicina (si insuf. renal o hepática) Nota: en pacientes con f. renal y hepática normal, puede requerir ajuste de dosis) Derivados de la ergotamina Fenobarbital Fenitoína (Nota: Fluticasona precaución y estrecha monitorización; preferiblemente beclometasona) Hypericum (Hierba de San Juan) Lovastatina Midazolam por vía oral Oxcarbazepina Pimozida Rifabutina Rifampicina Salmeterol Sertindol Sildenafil (en hipertensión pulmonar) Simvastatina Suplementos vitamínicos simultáneamente (espaciar 4 horas) Triazolam Voriconazol (evitar o valorar riesgo/beneficio)

<sup>§</sup> Se indican en **negrita** los datos procedentes de **la ficha técnica del producto**

<sup>¥</sup> Datos procedentes de la ficha técnica americana de los productos

\*Los efectos de TPV/r sobre el CYP3A4 y la P-gp son complejos y diferentes tras la primera dosis o en estado de equilibrio estacionario (dosis múltiples). Tras la primera dosis inhibe de forma leve el CYP1A2 y el CYP2C9, inhibe de forma moderada el CYP3A4/5 hepático, el CYP2D6 y la P-gp intestinal e inhibe de forma potente el CYP3A4 intestinal. En estado de equilibrio inhibe de forma moderada del CYP3A4/5 hepático, inhibe de forma potente el CYP2D6 y el CYP3A4/5 intestinal, induce el CYP1A2 y el CYP2C9 y tiene efecto mínimo inductor sobre la P-gp. El efecto neto de TPV/r sobre las concentraciones plasmáticas de los fármacos que son sustratos del CYP3A4 y de la glicoproteína-P dependerá de la afinidad por los mismos y es difícil de establecer.

\*\* Precaución: datos contradictorios con ritonavir.

\*\*\* Potencia inhibidora inversamente proporcional a la IC<sub>50</sub>: LPV/r 10,3 mcM > NFV 19,9 mcM > RTV 39,6 mcM > ATV 67,8 mcM > SQV 100 mcM > APV/IDV/DRV >100 mcM

**Tabla 10. Fármacos antirretrovirales y embarazo**

Fármaco / Categoría FDA	Toxicidad potencial en la gestación	Comentarios
<b>ITIAN</b> ZDV C D4T C DDI B ABC C 3TC C FTC B TDF B	Mielotoxicidad Toxicidad mitocondrial Reacción de hipersensibilidad Nefrotoxicidad Alteración del metabolismo P/Ca	ZDV: amplia experiencia, su uso es seguro en el embarazo D4T + DDI: incremento del riesgo de muerte materna por acidosis láctica y fallo hepático. ABC: reacción de hipersensibilidad potencialmente grave en presencia de mutación HLA B5701 TDF: Si se opta por TDF, vigilar función renal
<b>ITINN</b> EFV D NVP B ETRV B RPV B	Alteraciones SNC Hepatotoxicidad	EFV: contraindicado por riesgo de anencefalia y defectos del tubo neural en primates y humanos en primer trimestre de la gestación. NVP: amplia experiencia en el empleo durante la gestación; riesgo de hepatotoxicidad grave con CD4 >250 células/μL, especialmente en coinfección por VHB y VHC. Este efecto adverso no es extrapolable en mujeres que ya estaban en TAR con NVP al inicio de la gestación y/o que han tomado NVP previamente.
<b>IP/r</b> RTV B LPV C SQV B ATV B DRV C FPV C TPV C	Hiperglucemia Riesgo de prematuridad	ATV: Riesgo de hiperbilirrubinemia neonatal, aunque parece poco relevante en estudios realizados en embarazadas. SQV y LPV: bien tolerados en el embarazo
<b>Inhibidores de la fusión</b> ENF B		Datos escasos en gestación
<b>Inhibidores integrasa</b> RAL C EVG B DTG B		Datos escasos en gestación Sin datos en gestación Sin datos en gestación
<b>Inhibidores CCR5</b> MVC B		Datos escasos en gestación

**Tabla 11. Manejo de TAR en gestación en distintas situaciones**

	Semana de inicio del TAR	Fármacos	Comentarios
<b>Gestante sin tratamiento y sin indicación de TAR</b>	A partir de las 12-14 semanas <sup>1</sup>	IP/r + 2 ITIAN	En caso de interrupción de TARV con IP + 2 ITIAN, se interrumpirán todos los fármacos a la vez
<b>Gestante sin tratamiento y con indicación de TAR<sup>2</sup></b>	Inicio lo más precoz posible	IP/r + 2 ITIAN o bien NVP + 2 ITIAN (esta última sólo si CD4 <250 células/ $\mu$ L)	En caso de cambio de TARV compuesto por NVP + 2 ITIAN durante la gestación debida a toxicidad o intolerancia, mantener los 2 ITIAN y añadir IP/r a los 7 días <sup>3</sup>
<b>Gestante en TAR</b>	Mantener TAR  Si la gestante interrumpió el TAR reiniciar a las 12-14 semanas <sup>1</sup>	Sustituir fármacos teratogénicos (EFV) Evitar combinaciones con riesgo elevado de toxicidad (D4T+DDI) o menor eficacia (3 ITIAN)  Si está con NVP ,mantener aunque CD4>250 células/ $\mu$ L	En pautas de TAR con LPV/r se debe administrar BID.  Si ATV/r se acompaña de TDF o fármacos anti-H2 aumentar dosis de ATV a 400 mg en el 2º y 3º trimestre
<b>Gestante con indicación de TAR y antecedentes de abandono del TAR<sup>2</sup></b>	Inicio lo más precoz posible	Pauta de TAR según estudio de resistencias y TARV previos Si coinfección por VHB, mantener 3TC o considerar TDF+FTC	Utilizar como primera opción los antirretrovirales con mayor experiencia siempre que sea posible
<b>Gestante con primo-infección por VIH<sup>2</sup></b>	Inicio en el momento del diagnóstico	IP/r +2ITIN. Ajustar en cuanto se conozca el genotipo	Si el diagnóstico es en tercer trimestre, programar cesárea electiva
<b>Gestante con infección por VIH desconocida en el parto</b>	Realizar test rápido para VIH	Si positivo, administrar ZDV i.v. + NVP oral en dosis única y proceder con cesárea electiva	Consultar documento específico para ver tratamiento a administrar al RN y cómo seguir en la madre
<b>Mujer en TAR que desea quedar embarazada</b>	Evitar EFV		Insistir en la adherencia y en mantener la CV indetectable previa al embarazo

1. En mujeres con carga viral elevada o con indicación de TAR por salud materna, debe considerarse iniciar lo más precozmente posible, siempre que se comience con fármacos seguros y que no haya una hiperémesis gravídica incontrolable
2. Cuando en esta situación, la presentación es próxima al parto, se puede valorar también la adición de raltegravir, dado su rápido paso placentario, a dosis de 400 mg/12 horas, aunque la experiencia con este fármaco es escasa; y/o de NVP oral al menos dos horas antes del parto asociada a AZT iv (véase documento específico para ampliar la información)
3. Para minimizar la aparición de resistencias a ITINN al suspender el TAR después del parto, algunos expertos recomiendan seguir con 2 ITIAN y añadir IP a los 7 días y suspender el TAR a las 4 semanas dada la larga vida media de la NVP

**Tabla 12. Recomendaciones de uso de fármacos antirretrovirales en el embarazo**

	Recomendados	Alternativos*	No recomendados (salvo que no haya otra alternativa)	Contraindicados
<b>ITIAN</b>	Zidovudina Lamivudina Abacavir <sup>1</sup> Tenofovir <sup>2</sup> Emtricitabina		Didanosina Estavudina	Didanosina + estavudina <sup>3</sup>
<b>ITINN</b>	Nevirapina <sup>4</sup> , si CD4 <250 células/μL	Efavirenz en segundo y tercer trimestre <sup>5</sup>		Efavirenz en primer trimestre <sup>5</sup>
<b>IP/r</b>	Lopinavir/r, 400/100 BID	Darunavir/r, 600/100 BID  Atazanavir/r <sup>6</sup> 300/100 <sup>7</sup> QD  Saquinavir/r, 1000/100 BID	Fosamprenavir/r	
<b>Inhibidores de la Fusión</b>				
<b>Inhibidores de la Integrasa</b>		Raltegravir (RAL) 400 c/12 h.		

\*Usar cuando no puedan utilizarse los fármacos de 1ª elección. No hay datos para etravirina, rilpivirina, elvitegravir, dolutegravir, tipranavir ni enfuvirtida

1 Si HLA-B 5701 es negativo, aunque con pequeño riesgo de hipersensibilidad

2. Riesgo potencial de alteraciones renales y óseas y alteraciones del metabolismo calcio-fósforo tanto en animales como en pacientes VIH. Debe considerarse especialmente para el tratamiento en pacientes con infección por VHB. Además, datos recientemente publicados sugieren que es un fármaco eficaz y probablemente seguro

3. Riesgo de acidosis láctica grave

4. Mayor riesgo de hepatotoxicidad en gestantes coinfectadas por VHC, VHB o con linfocitos CD4 >250 células/μL

5. Categoría D, potencialmente teratogénico, aunque datos observacionales sugieren la posibilidad de mantenerlo, especialmente si el diagnóstico de embarazo se hace a partir de la 5ª-6ª semana y sobre todo, la posibilidad de utilizarlo electivamente a partir de la 8ª-9ª semana

6. Hiperbilirrubinemia, riesgo potencial de kernicterus. En adultos se ha descrito un aumento de la bilirrubina no conjugada con el uso de este fármaco. Sin embargo, en una pequeña serie de 40 gestantes tratadas con este fármaco no se ha descrito una mayor incidencia de hiperbilirrubinemia en los neonatos con respecto a la población general

7. Cuando se acompaña de TDF en lugar de ZDV, es imprescindible utilizar la dosis de 400/100 mg en el segundo y tercer trimestre, dada la interacción existente entre TDF y ATV y las especificidades farmacocinéticas de la gestación



**Tabla 13. Ajuste de dosis de los antirretrovirales en insuficiencia renal y en hemodiálisis**

Familia	Fármacos	Dosis habituales	Dosis en insuficiencia renal	Dosis en Hemodiálisis/diálisis peritoneal
<b>Inhibidores de la transcriptasa análogos de nucleósidos/nucleótidos</b>	Abacavir (ABC)	300 mg/12h	No requiere ajuste de dosis No administrar Combivir® y Trizivir® en pacientes con CI <50 mL/min (por separado, ajustar dosis adecuadamente)	Dosis habitual. HD: administrar independientemente de la sesión de HD, ya que se elimina mínimamente.
	Didanosina, cápsulas entéricas (ddl)	Peso ≥60kg	≥ 60 Kg	HD/CAPD: 100 mg c/24h; los días de HD administrar post-HD/CAPD (no requiere suplemento).
		400 mg/24h	CI ≥60: 400 mg c/24h CI 30-59: 200 mg c/24h CI 10-29: 150 mg c/24h CI <10: Emplear Videx® polvo para solución pediátrica 100 mg c/24h	
		Peso <60kg 250 mg/24h	<60 kg CI ≥60: 250 mg c/24h CI 30-59: 150 mg c/24h CI 10-29: 100 mg c/24h CI <10: Emplear Videx® polvo para solución pediátrica 75 mg/24h.	
	Estavudina (d4T)	≥ 60 kg: 40 mg/12h	≥ 60 Kg CI ≥50: 40 mg c/12h CI 26-49: 20 mg c/12h CI ≤25: 20 mg c/24h	HD: 20 mg c/24h; los días de HD administrar post-HD
		<60 kg: 30 mg/12h	<60 kg CI ≥50: 30 mg c/12h CI 26-49: 15 mg c/12h CI ≤25: 15 mg c/24h	

Familia	Fármacos	Dosis habituales	Dosis en insuficiencia renal	Dosis en Hemodiálisis/diálisis peritoneal
	Lamivudina (3TC)	150 mg/12h o 300 mg/24h	<p>CI <math>\geq</math> 50: 150 mg c/12h ó 300 mg c/24h</p> <p>CI 30-49: 150 mg c/24h (primera dosis de 150 mg)</p> <p>CI 15-29: 100 mg c/24h (primera dosis 150 mg)</p> <p>CI 5-14: 50 mg c/24h (primera dosis 150 mg)</p> <p>CI <math>&lt;</math>5: 25 mg c/24h (primera dosis 50 mg)</p> <p>No administrar Combivir® y Trizivir® si CI <math>&lt;</math>50 mL/min (administrar los componentes por separado, ajustando dosis adecuadamente)</p>	HD: 25 mg c/24h (primera dosis 50 mg) Los días de la HD, administrar post-HD.
	Emtricitabina (FTC)	200 mg c/24h (cápsulas) 240 mg c/24h (solución oral)	<p>En cápsulas</p> <p>CI <math>&gt;</math>50: 200 mg c/24h</p> <p>CI 30-49: 200 mg c/48h</p> <p>CI 15-29: 200 mg c/72h</p> <p>CI <math>&lt;</math>15: 200 mg c/96h</p> <p>En solución (10 mg/ml)*:</p> <p>CI <math>&gt;</math>50: 240 mg (24 ml) c/24h</p> <p>CI 30-49: 120 mg (12 ml) c/24h</p> <p>CI 15-29: 80 mg (8 ml) c/24h</p> <p>CI <math>&lt;</math>15: 60 mg (6 ml) c/24h</p> <p>Truvada®: no administrar a pacientes con CI <math>&gt;</math>30 mL/min</p>	<p>HD: en comprimidos 200 mg c/96h, en solución (10 mg/ml) 60 mg (6 ml) c/24h.</p> <p>Los días de HD administrar post-HD</p> <p>No se ha estudiado en diálisis peritoneal.</p> <p>Truvada®: no administrar a pacientes en HD (administrar los componentes por separado, ajustando dosis adecuadamente)</p>
	Zidovudina (AZT)	300 mg/12h	<p>Puede acumularse el metabolito glucurónico (GAZT)</p> <p>CI 10-50: 250-300 mg c/12h.</p> <p>CI <math>&lt;</math>10: 300 mg c/24h.</p> <p>No administrar Combivir® y Trizivir® en pacientes con CI <math>&lt;</math>50 mL/min (administrar los componentes por separado, ajustando dosis adecuadamente)</p>	<p>300 mg c/24h.</p> <p>HD/CAPD: no afecta la eliminación de AZT y aumenta la eliminación de GAZT. Por precaución, se recomienda administrar la dosis diaria post-HD/CAPD.</p>

Familia	Fármacos	Dosis habituales	Dosis en insuficiencia renal	Dosis en Hemodiálisis/diálisis peritoneal
	<p>Tenofovir (TDF)</p> <p>Se recomienda valorar riesgo/beneficio del empleo de tenofovir en pacientes con insuficiencia renal.</p> <p>Los ajustes han sido obtenidos mediante modelado de datos farmacocinéticos tras la administración de dosis únicas en sujetos con VIH y VHB con diferentes grados de insuficiencia renal, incluyendo HD. Su eficacia y seguridad no han sido evaluadas clínicamente, por lo que se recomienda una estrecha monitorización.</p>	300 mg/24h	<p>Se recomienda emplear la formulación en gránulos.</p> <p>CI <math>\geq</math> 50: no requiere ajuste de dosis</p> <p>CI 30-49: 132 mg (4 cacitos)/24h</p> <p>CI 20-29: 65 mg (2 cacitos)/24h</p> <p>CI 10-19: 33 mg (1 cacito)/24h</p> <p>No hay recomendaciones disponibles para pacientes con CI &lt;10 sin HD</p> <p>No administrar TDF en coformulaciones a dosis fijas (Truvada<sup>®</sup>, Atripla<sup>®</sup>, Eviplera<sup>®</sup> y Stribild<sup>®</sup>) si CI &lt;50 mL/min (administrar los componentes por separado, ajustando dosis adecuadamente).</p>	HD: 16,5 mg (medio cacito) tras completar cada sesión de HD de 4h.

Familia	Fármacos	Dosis habituales	Dosis en insuficiencia renal	Dosis en Hemodiálisis/diálisis peritoneal
<b>Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos</b>	Efavirenz (EFV)	600 mg/24h	No requiere ajuste de dosis.  Atripla®: en pacientes con Cl <50 ml/min, utilizar los principios activos por separado.	HD: no parece necesario ajustar la dosis.  CAPD: un estudio farmacocinético preliminar indica que no se requiere ajuste de dosis (datos de un solo paciente).
	Etravirina (ETR)	200 mg/12h o 400 mg/24h	NRAD	HD/CAPD: por su elevada unión a proteínas plasmáticas, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD.
	Nevirapina (NVP)	200 mg/12h 400 mg/24h (formulación XR)	No requiere ajuste de dosis.	HD: los días de HD, se recomienda administrar la dosis después de la HD o un suplemento de 200 mg post-hemodiálisis.
	Rilpivirina	25 mg/24h	IR leve-moderada: no requiere ajuste de dosis. IR grave: no hay datos. Emplear con precaución. La combinación de rilpivirina con un inhibidor potente del CYP3A4 como ritonavir o cobicistat únicamente se debe usar en estos pacientes si el beneficio supera el riesgo.	HD/CAPD: por su elevada unión a proteínas plasmáticas, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD.

Familia	Fármacos	Dosis habituales	Dosis en insuficiencia renal	Dosis en Hemodiálisis/diálisis peritoneal
<b>Inhibidores de la proteasa del VIH</b>	Atazanavir (ATV)	300 mg/24h (con 100 mg/24h de RTV) 400 mg/24h (sin RTV)	No requiere ajuste de dosis	HD/CAPD: por su elevada unión a proteínas plasmáticas, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD.  HD: se recomienda su uso potenciado (ATV/r 300/100) para compensar el descenso de concentración de ATV (reducción del 28% en el AUC de ATV los días sin HD y del 42% los días de HD; la eliminación a través de la HD es de sólo el 2%). Monitorizar niveles plasmáticos cuando sea posible.
	Darunavir (DRV)	800 mg/24h (con 100 mg/24h de RTV)	IR leve, moderada o grave: no requiere ajuste de dosis	HD/CAPD: debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD.
	Fosamprenavir (FPV)	700 mg/12h (con 100 mg/12h de RTV)	No requiere ajuste de dosis	HD/CAPD: debido a su elevada unión a proteínas plasmáticas, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD.
	Indinavir (IDV)	800 mg/12h (con 100 mg/12h de RTV) 800 mg/8h (sin RTV)	No requiere ajuste de dosis	HD: probablemente no requiera ajuste de dosis si función hepática conservada (datos de un solo paciente). Se elimina mínimamente a través de la HD.

Familia	Fármacos	Dosis habituales	Dosis en insuficiencia renal	Dosis en Hemodiálisis/diálisis peritoneal
	Lopinavir (LPV/r)	400/100 mg/12h	No requiere ajuste de dosis	<p>HD: El AUC de LPV/r en 13 pacientes en HD fue equivalente a la de pacientes con función renal normal. No ajuste de dosis.</p> <p>CAPD: no hay datos. Debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas de lopinavir y ritonavir, no es de esperar que se elimine en las sesiones de CAPD.</p>
	Ritonavir (RTV)	Potenciador farmacocinético: dosis variable en función del IP al que acompaña.	No requiere ajuste de dosis	HD/CAPD: debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas de ritonavir, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD
	Saquinavir (SQV)	1000 mg/12h (con 100 mg/12h de RTV)	No requiere ajuste de dosis.	HD/CAPD: debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas de ritonavir, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD. Datos de un paciente indican escasa eliminación a través de HD.
	Tipranavir (TPV)	500 mg/12h (con 200 mg/12h de RTV)	No requiere ajuste de dosis.	HD/CAPD: debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas de TPV/RTV, no es de esperar que se eliminen en las sesiones de HD/CAPD.
<b>Inhibidores de la fusión</b>	Enfuvirtida (T-20)	90 mg/12h (vía s.c.)	No requiere ajuste de dosis.	HD: No requiere ajuste de dosis

Familia	Fármacos	Dosis habituales	Dosis en insuficiencia renal	Dosis en Hemodiálisis/diálisis peritoneal
Inhibidores de la integrasa	Raltegravir (RAL)	400 mg/12h	No requiere ajuste de dosis	HD: no es probable que RAL se elimine significativamente a través de la HD. Datos de dos pacientes con ERCA mostraron la ausencia de eliminación de RAL durante una sesión de HD de 4 horas.

Familia	Fármacos	Dosis habituales	Dosis en insuficiencia renal	Dosis en Hemodiálisis/diálisis peritoneal
	Dolutegravir (DTG)	50 mg/24h	No se requiere ajuste de dosis. Se realizó un estudio sobre la farmacocinética de dolutegravir en sujetos con insuficiencia renal grave ( $Cl < 30$ ml/min) emparejados con controles sanos. La exposición a dolutegravir disminuyó aproximadamente un 40% en sujetos con insuficiencia renal grave. Se desconoce el mecanismo. No se considera necesario ningún ajuste de dosis, pero se recomienda precaución en pacientes con IR avanzada y experiencia previa a INI que presenten mutaciones o sospecha de resistencia a estos fármacos. In vitro, dolutegravir inhibe los transportadores renales OCT2 y MATE 1. Aunque in vitro se ha observado inhibición de OAT1B1 y OAT1B3, no parece que in vivo tenga repercusión clínica. <sup>#</sup> Los transportadores OCT2 y MATE1 intervienen en la secreción renal de creatinina, por lo que se ha observado una disminución del aclaramiento de creatinina durante las primeras 4 semanas del 10-14%, sin que ello esté relacionado con un empeoramiento del filtrado glomerular	No se dispone de datos, aunque no se esperan diferencias farmacocinéticas en esta población.
	Elvitegravir (EVG)/cobicistat /TDF/FTC	150/150/200/245 mg	Cobicistat reduce levemente el filtrado glomerular renal estimado de creatinina (aunque no altera el filtrado glomerular real), debido a la inhibición de la secreción tubular de creatinina. La combinación EVG/COBI/TDF/FTC no debe iniciarse en pacientes con $Cl < 70$ ml/min. Si el $Cl$ durante el tratamiento se reduce a $Cl < 70$ ml/min monitorizar estrechamente la función renal (ver ficha técnica de Stribild®), si se reduce a $Cl < 50$ ml/min debe suspenderse, dado que no se puede realizar el ajuste de dosis adecuado para FDF/FTC.	La combinación EVG/COBI7TDF/FTC no debe emplearse si $Cl < 50$ ml/min.



Familia	Fármacos	Dosis habituales	Dosis en insuficiencia renal	Dosis en Hemodiálisis/diálisis peritoneal
Antagonistas del correceptor CCR5	MVR (maraviroc)	Dosis variable en función de los antirretrovirales asociados, consultar ficha técnica. En general. 150 mg/12h siempre que estén presentes inhibidores potentes del CYP3A4 como los IP/r (excepto TPV/r). 300 mg/12h junto con TPV/r, ITIAN, NVP y RAL 600 mg/12h junto con inductores importantes del CYP3A4 como EFV	En ausencia de inhibidores potentes del CYP3A4 no requiere ajuste de dosis. Sólo se recomienda un ajuste de dosis en pacientes con CI <80 ml/min y que están recibiendo inhibidores potentes del CYP3A4, como los IP/r (excepto TPV/r), cobicistat, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, claritromicina, telitromicina, boceprevir o telaprevir: en estos casos administrar 150 mg c/24h. Si el CI es <30 ml/min se recomienda mucha precaución debido al aumento de riesgo de hipotensión postural. Con CI <80 ml/min y en combinación con FPV/r administrar 150 mg c/12h. Con CI <80 ml/min y en combinación con TPV/r no se requiere ajuste de dosis (300 mg c/12h). (Estos ajustes de dosis se recomiendan basándose en los datos de un estudio en insuficiencia renal y simulaciones farmacocinéticas, sin que su seguridad y eficacia hayan sido evaluadas clínicamente, por lo que se recomienda una estrecha monitorización).	HD: en ausencia de inhibidores potentes del CYP3A4 no se requiere ajuste de dosis. En presencia de los mismos, dosificar igual que para CI <80 ml/min (datos limitados) Escasa eliminación a través de la HD.

# Datos procedentes de la ficha técnica americana de Tivicay® Revisada 12/5/2014. Disponible en [http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda\\_docs/label/2014/204790s001lbl.pdf](http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/204790s001lbl.pdf)

\*Las cápsulas y la solución oral de emtricitabina tienen diferente biodisponibilidad, de forma que con 240 mg de la solución oral (24 ml) se alcanzan unas concentraciones plasmáticas similares a las alcanzadas con 200 mg en cápsulas.

CH: cirrosis hepática; CI: aclaramiento de creatinina en ml/min; ERCA: enfermedad renal crónica avanzada; HD: hemodiálisis; IH: insuficiencia hepática; IP/r: inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir; IR: insuficiencia renal; MATE1: transportador de expulsión de toxinas y multifármacos 1; OAT1 y 3: transportadores de aniones orgánicos 1 y 3; OCT2: transportador de cationes orgánicos 2;

**Tabla 14. Interacciones más relevantes desde el punto de vista clínico entre fármacos antirretrovirales y antivirales directos frente al VHC**

	<b>Boceprevir (BOC) 800 mg/QD</b>	<b>Telaprevir (TLV) 750 mg/TID</b>	<b>Simeprevir (SMV) 150 mg/QD</b>	<b>Daclatasvir (DCV) 60 mg/QD</b>	<b>Sofosbuvir (SOFOS) 400 mg/QD</b>
<b>TDF 300 mg/QD</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b> SMV aumenta los niveles de TDF. Vigilar nefrotoxicidad <b>(A-I)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b> TDF: aumenta la C <sub>max</sub> 25%
<b>ATV/r 300/100 mg/QD</b>	Considerar coadministración, controlado la eficacia del TAR <b>(B-I)</b> ATV: C <sub>min</sub> disminuye: 49%	No precisa ajuste de dosis. Vigilar niveles de bilirrubina <b>(A-I)</b> ATV: C <sub>min</sub> aumenta 85%	No recomendado <b>(A-III)</b>	Daclatasvir (DCV), 30 mg/QD <b>(A-I)</b> DCV: C <sub>min</sub> aumenta > 2 veces AUC <sub>GMR</sub> (IC 90% ): 2,10 (1,95-2,26)	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>
<b>DRV/r 800/100 mg/QD</b>	No recomendado <b>(A-I)</b> DRV: C <sub>min</sub> disminuye 59% BOC: C <sub>min</sub> disminuye 35%	No recomendado <b>(A-I)</b> DRV: C <sub>min</sub> disminuye 58% TLV: C <sub>min</sub> disminuye 32%	No recomendado <b>(A-I)</b> DRV: C <sub>min</sub> aumenta 31% SMV: C <sub>min</sub> aumenta 5 veces	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b> AUC <sub>GMR</sub> (IC 90% ): 1,41 (1,32-1,50)	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b> SOFOS: AUC aumenta un 45%
<b>FPV/r 700/100/BID</b>	No recomendado <b>(A-III)</b>	No recomendado <b>(A-I)</b> FPV: C <sub>min</sub> disminuye 56% TLV: C <sub>min</sub> disminuye 30%	No recomendado <b>(A-III)</b>	Interacción no estudiada	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>
<b>LPV/r 400/100 mg/QD</b>	No recomendado <b>(A-I)</b> LPV: C <sub>min</sub> disminuye 43% BOC: C <sub>min</sub> disminuye 57%	No recomendado <b>(A-I)</b> TLV: C <sub>min</sub> disminuye 52%	No recomendado <b>(A-III)</b>	Interacción no estudiada	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>
<b>EFV 600 mg/QD</b>	No recomendado <b>(A-I)</b> BOC: C <sub>min</sub> disminuye 44%	TLV 1125 mg/TID <b>(A-I)</b> TLV: C <sub>min</sub> disminuye 47%	No recomendado <b>(A-I)</b> SMV: C <sub>min</sub> disminuye 91%	DCV 90 mg/QD <b>(A-I)</b> DCV: C <sub>min</sub> disminuye 59% AUC <sub>GMR</sub> (IC 90% ): 0,68 (,68-0,78)	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>
<b>ETV 200mg/BID</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>	No recomendado <b>(A-III)</b>	Interacción no estudiada, no se recomienda su uso	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>
<b>RPV 25 mg/QD</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b> RPV: C <sub>min</sub> aumenta 51%	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b> RPV: C <sub>min</sub> aumenta 1,9 veces	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>
<b>DTV 50 mg/QD</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>
<b>EVG/COBI/FTC/TDF 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg/QD</b>	No recomendado <b>(A-III)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b> EVG: C <sub>min</sub> aumenta 32%	No recomendado <b>(A-III)</b>	DCV 30 mg QD <b>(A-III)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>

<b>RAL</b> <b>400 mg/BID</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-1)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-1)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-I)</b>
<b>MVC</b> <b>300 mg/BID</b>	MVC 150 mg BID <b>(A-1)</b> MVC: $C_{\min}$ aumenta 2,8 veces	MVC 150 mg BID <b>(A-1)</b> MVC: $C_{\min}$ aumenta 10 veces	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>	No precisa ajuste de dosis <b>(A-III)</b>

## 10. CONFLICTOS DE INTERÉS

**Koldo Aguirrebengoa**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Gilead Sciences, y Janssen, participado en ensayos y estudios clínicos de Abbvie, MSD, Gilead, Janssen y ViiV Healthcare, y ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare

**José R. Arribas**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck, Tobira y ViiV Healthcare; ha disfrutado de becas para investigación clínica de Janssen, MSD y Gilead; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare

**Juan Berenguer**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen Cilag, Janssen Therapeutics, Merck y ViiV Health care; ha disfrutado de becas para investigación clínica de Bristol-Myers Squibb, Merck Sharp & Dohme y ViiV Health care; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen Cilag, Merck Sharp & Dohme y ViiV Health care.

**José R. Blanco**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Janssen, Merck y ViiV Healthcare; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Glaxo Smith Kline, Janssen, Merck y ViiV Healthcare, así como pagos por desarrollos de presentaciones educativas para Gilead Sciences y Bristol-Myers Squibb.

**Vicente Boix** ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare y ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare

**José Luis Casado** ha efectuado labores de consultoría para Abbvie y ViiV Healthcare; ha recibido compensaciones económicas por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen-Cilag, Merck Sharp & Dohme y ViiV Healthcare, así como ha disfrutado de becas para investigación clínica de Janssen, Gilead Sciences y ViiV Healthcare.

**Bonaventura Clotet** ha efectuado labores de consultoría o participado en ensayos clínicos o en charlas retribuidas con los siguientes laboratorios farmacéuticos: BMS, Abbvie, Gilead, Janssen, Merck (MSD) and ViiV Healthcare

**Manel Crespo**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare; ha disfrutado de becas para investigación clínica de laboratorios Gilead Sciences y ViiV Healthcare; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare, así como pagos por desarrollos de presentaciones educativas para Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences y ViiV Healthcare.

**Pere Domingo**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen y ViiV Healthcare; ha disfrutado de becas para investigación clínica de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen y ViiV Healthcare, y ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen y ViiV Healthcare

**Vicente Estrada**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Gilead Sciences y Janssen; ha disfrutado de becas para investigación clínica de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences y Janssen, y ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare.

**Federico García**, ha efectuado labores de consultoría y ha recibido compensación económica por charlas en los laboratorios Gilead Sciences, ViiV, Abbvie y Roche Diagnostica

**José M. Gatell**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmith Kline, Merck y ViiV Healthcare; ha disfrutado de becas para investigación clínica de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmith Kline, Merck y ViiV Healthcare; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmith Kline, Merck y ViiV Healthcare.

**Juan González** ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbott Laboratories, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare; ha recibido compensación económica por charlas de Abbott Laboratories, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare.

**Félix Gutiérrez** ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmith Kline, Merck y ViiV Healthcare; y ha recibido compensación económica por charlas y/o preparación de material docente de Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmith Kline, Merck y ViiV Healthcare.

**José Antonio Iribarren**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie y Janssen-Cilag, ha recibido becas de investigación clínica de laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gobierno Vasco, FIPSE y FISS, ayudas para asistencia a Congresos de Abbvie, Gilead, Janssen-Cilag y ViiV y ha participado en actividades educativas, charlas o simposios patrocinados por Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Merck, Novartis Janssen, Pfizer y ViiV.

**Hernando Knobel**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare; ha recibido compensaciones económicas por el desarrollo de presentaciones educativas para Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare.

**Josep M. Llibre** ha efectuado labores de consultoría para Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen-Cilag, Merck Sharp & Dohme, y ViiV Healthcare; ha recibido compensación económica por actividades de formación de Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen-Cilag, Merck Sharp & Dohme y ViiV Healthcare.

**Jaime Locutura** ha efectuado labores de consultoría para Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences y ViiV Healthcare; ha recibido compensaciones económicas por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen-Cilag, Merck Sharp & Dohme y ViiV Healthcare, así como pagos por desarrollo de material educacional para Abbvie, Boehringer Ingelheim y ViiV Healthcare.

**José López Aldeguez** ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen y ViiV Healthcare, ha disfrutado de becas para investigación clínica de Bristol-Myers Squibb y ViiV Healthcare, ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare,

**Juan Carlos López Bernaldo de Quirós** ha efectuado labores de consultoría para Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences, Janssen, Merck-Sharp & Dome, Roche Pharmaceuticals y ViiV Healthcare, y ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences, Jansen, Merck-Sharp & Dome, Roche Pharmaceuticals y ViiV Healthcare. También ha recibido pagos por desarrollo de material educativo para Boehringer Ingelheim Gilead Sciences y ViiV Healthcare.

**Fernando Lozano** ha efectuado labores de consultoría para Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Janssen, Merck-Sharp & Dome, Pfizer, Roche Pharmaceuticals y ViiV Healthcare, y ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Jansen, Merck-Sharp & Dome, Pfizer y ViiV Healthcare.

**José M. Miró**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck, Novartis y Sanofi, ha disfrutado de becas para investigación clínica de Cubist, Gilead, ViiV, Novartis, Merck, Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) del Instituto de Salud Carlos III (Madrid), Fundación para la Investigación y Prevención del Sida en España (FIPSE, Madrid), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI, Madrid), National Institutes of Health (NIH, Bethesda, MA, USA) y NEAT, ha recibido compensación económica por charlas de los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck, Novartis y ViiV Healthcare.

**Santiago Moreno**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y Roche; ha disfrutado de becas para investigación clínica de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y Roche y ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y Roche.

**Juan A. Pineda** ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Glaxo Smith Kline, Gilead Sciences, Janssen, Merck, Pfizer, Shering-Plough y ViiV Healthcare, ha disfrutado de becas para investigación clínica de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Glaxo Smith Kline, Gilead Sciences, Janssen, Merck, Pfizer, Roche, Shering-Plough y ViiV Healthcare y ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Glaxo Smith Kline, Gilead Sciences, Janssen, Merck, Roche, Shering-Plough y ViiV Healthcare

**Daniel Podzamczar** ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare; ha disfrutado de becas para investigación clínica de Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmith Kline, y ViiV Healthcare; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmith Kline, Merck y ViiV Healthcare

**Rosa Polo**, declara no tener conflictos de interés.

**Joaquín Portilla:** ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare, ha disfrutado de becas para investigación clínica de Abbvie, Janssen, Merck y ViiV Healthcare y ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare

**Federico Pulido** , ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare; ha recibido compensación económica por charlas de Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck y ViiV Healthcare.

**Esteban Ribera** ha realizado asesorías o ha recibido ayudas para investigación o docencia en relación con la infección por el VIH de los siguientes laboratorios farmacéuticos: Abbvie, BMS, Ferrer International, Gilead, GSK, Janssen-Cilag, MSD, Pfizer, Roche Farma, Schering Plough y ViiV.

**Melchor Riera** ha recibido ayudas para viajes a reuniones y Congresos de Janssen, y Merck y Gilead Sciences, ha recibido compensación económica por charla de Abbvie y aportaciones económicas al servicio para labores docentes o de Investigación de laboratorios Abbvie y Bristol-Myers Squibb.

**Antonio Rivero**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck (MSD) y ViiV Healthcare; ha disfrutado de becas para investigación clínica de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck (MSD) y ViiV Healthcare; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck (MSD) y ViiV Healthcare.

**Rafael Rubio**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences y Janssen; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck, Roche y ViiV Healthcare.

**Jesús Santos**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences y Janssen; ha recibido compensación económica por charlas de Bristol-Myers Squibb, MSD, Janssen y Gilead Sciences, y como pagos por desarrollos de presentaciones educacionales para Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen y MSD

**José Sanz Moreno**, ha participado en ensayos clínicos promovidos por Bristol-Myers Squibb y ViiV Healthcare; ha desarrollado labores de consultoría e impartido presentaciones con fines docentes, organizadas por Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck Sharp & Dohme y ViiV Healthcare, por las que ha percibido compensación económica.

**Jesús Sanz Sanz**, ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck , ViiV Healthcare y Boehringer Ingelheim; ha recibido compensación económica por charlas de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck , ViiV Healthcare y Boehringer Ingelheim y ha recibido pagos por desarrollo de presentaciones educacionales para ViiV Healthcare .

**Maria Jesús Téllez** ha efectuado labores de consultoría en los laboratorios Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences y Janssen; ha recibido compensación económica por charlas de Gilead Sciences y Janssen

**Montse Tuset**, ha disfrutado de becas para investigación clínica de laboratorios Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck y Janssen; y ha recibido compensación económica por charlas de Janssen, Merck, Gilead y ViiV Healthcare

.