

Casos clínicos SBO

Dr. David Martínez Peña

Caso 1

Consulta en atención primaria la madre de un lactante, masculino, de 10 meses de edad. Con antecedentes de presentar desde los 2 meses de vida, con una frecuencia de cada 1 mes, episodios de bronquitis obstructiva que duran entre 1 a 2 semanas, aunque en 2 oportunidades duró más de un mes. A veces las crisis van acompañadas de fiebre no cuantificada. Las crisis son manejadas con salbutamol. Estos episodios no han alterado su alimentación. Destaca de la historia remota, que siempre que juegan o le hacen le hacen cosquillas al niño, éste termina tosiendo. No presenta otros antecedentes mórbidos personales ni familiares de importancia. No tiene hospitalizaciones.

Consulta hoy, por presentar hace 2 días coriza mucosa y tos seca inicial, que desde la noche anterior se hizo productiva, asociada a fiebre de 38,2° C. Hoy al despertar lo nota respirando “agitado”, motivo por el cual acude a consultar.

Al examen físico, se encuentra un lactante eutrófico, con FR: 52 x minuto, afebril, con retracción subcostal e intercostal, cianosis peribucal con el llanto, con sibilancias audibles a distancia, hipersonoridad torácica a la percusión, en la auscultación pulmonar se encuentran sibilancias inspiratorias y espiratorias y algunas crepitaciones basales bilaterales escasas. Hígado palpable a 2 cm. bajo el reborde costal.

Caso 2

Paciente masculino de siete meses consulta por cuadro de tres días de coriza, fiebre de 38° el primer día. Con tos en aumento desde hace 2 días. Ruido al pecho y retracción de partes blandas.

Al examen presenta T° 36,9 FR 59x' retracción subcostal e intercostal y supraesternal y cianosis peri-oral al llanto, sibilancias inspiratorias y espiratorias con fonendoscopio. Leve deformidad torácica con hiperinsuflación y surcos de Harrison. Peso 5,900 y 62 cm.

Caso 3

Consulta lactante de 1 año 3 meses con historia de tos desde hace una semana con aumento desde los últimos tres días, interfiere con el sueño y es emetizante ocasionalmente. Tiene antecedentes de SBO desde los 4 meses con 2 hospitalizaciones de causa respiratoria, la primera a los cuatro meses en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) por 3 días.